

	England	France	North-Germany	South-Germany	Caucasus		Russian Platform		Greenland	Alaska	Western Interior
Calloviense	<i>S. pagei</i>	<i>S. pagei</i>	<i>S. pagei</i>	<i>S. enodatum</i> a ?			<i>S. pagei</i>				
	<i>S. micans</i>	<i>S. micans</i>					<i>S. micans</i>				
	<i>S. calloviense</i>	<i>S. calloviense</i>	<i>S. calloviense</i>	<i>S. calloviense</i>			<i>S. calloviense</i>		35 <i>S. calloviense</i>	<i>Sigaloceras</i>	
Koenigi	<i>K. koperniki</i> n. sp. MS	<i>K. koperniki</i> n.sp. MS	<i>K. koperniki</i> n.sp. MS	<i>K. koperniki</i> n.sp. MS	<i>K. koperniki</i> n.sp. MS		<i>K. koperniki</i> n. sp. MS				
	<i>K. galilaeii</i>	<i>K. galilaeii</i>	<i>K. galilaeii</i>				<i>K. galilaeii</i>		34 <i>K. galilaeii</i>	<i>Keplerites</i>	
	<i>K. trichophorus</i>		<i>K. hubblei</i> n.sp. MS	<i>K. hubblei</i> n.sp. MS			<i>K. hubblei</i> n. sp. MS		33 <i>K. cf. trichophorus</i>		
	<i>K. indigestus</i> b s. Page	<i>K. densicostatus</i>	<i>K. densicostatus</i>	<i>K. densicostatus</i>			<i>K. densicostatus</i>				
	<i>K. indigestus</i> a s. Page	<i>K. halleyi</i> n. sp. MS	<i>K. halleyi</i> n.sp. MS		<i>K. ex gr. hubblei</i> <i>K. ex gr. halleyi</i>						
	<i>M. bradleyi</i> n. sp. MS	<i>K. besseli</i> n. sp. MS	<i>K. besseli</i> n.sp. MS				<i>K. curtilobus</i> sensu Mitta				
	<i>K. gowerianus</i>	<i>K. aff. gowerianus</i>	<i>K. aff. gowerianus</i>				<i>K. gowerianus</i>		32 <i>K. cf. gowerianus</i> <i>K. cf. metorchus</i>		
	<i>K. metorchus</i>	<i>K. metorchus</i>	<i>K. metorchus</i>	<i>K. metorchus</i>			<i>K. metorchus</i>				
Herveyi		<i>K. toricellii</i>	<i>K. toricellii</i>	<i>K. toricellii</i>			<i>K. russiensis</i>				
			<i>K. hildesheimensis</i>				<i>K. russiensis</i>				
					<i>K. rionensis</i>		<i>K. cf. rionensis</i>			<i>K. ingrahami</i> Imlay 1953, pl. 50/1	
									<i>K. alticostatus</i> (Imlay 1953, pl. 48/11,16) <i>K. ingrahami/abruptus</i> Imlay 1953, 50/2, 51/6, 52/3 <i>K. mcevoyi</i> Imlay 1953, 51/6 <i>K. multus</i> Imlay 1953, 53/1		
	<i>K. kepleri</i>		<i>K. kepleri</i> <i>K. herscheli</i> n. sp.	<i>K. kepleri</i>		<i>K. kepleri</i>		29 - 30 <i>K. aff. traillensis</i>	<i>K. loganianus</i> <i>K. plenus</i>		
Retrocostatum		<i>K. radiatus</i>		<i>K. radiatus</i>	<i>K. radiatus</i>		<i>K. radiatus</i>	Norden- skjoeldi	28 <i>K. aff. traillensis</i>	<i>K. chiskensis</i> Imlay	
				<i>K. radiatus</i>						<i>K. traillensis</i> Imlay 1953, 50/4, 52/6	
				<i>K. traillensis</i>			<i>K. traillensis</i> <i>K. vardekloeftensis</i>	Apertum	27 <i>K. tenuifasciculatus</i>		
				<i>K. aigii</i>			<i>K. aigii</i> <i>K. vardekloeftensis</i>		24-26 <i>K. cf. aff. kepleri</i> <i>K. traillensis</i>		
							<i>K. cf. rosenkrantzi</i> <i>K. svalbardensis</i>	Calyx	23 <i>K. vardekloeftensis</i>		
							<i>K. aff. inflatus</i>		22 <i>K. peramplus</i> <i>K. svalbardensis</i>		<i>K. mclearnii</i> <i>K. rockymontanus</i>
								Variabile	21 <i>K. rosenkrantzi</i>		
								19 - 20 <i>K. inflatus</i>			
								Cra. Variable	18 <i>K. stephanoides</i>		<i>K. costidensus</i>
										<i>C. snugharborensense</i>	<i>C. subitus</i>