ЦНИГР музей

КАТАЛОГ ГОЛОТИПОВ

ПАЛЕОЗОЙ
МЕЗОЗОЙ
КАЙНОЗОЙ

Выпуск III



Committee on Geology and exploitation of Mineral Resourse,
Russian Federation
Central Scientific-Research Geological Exploration
Museum named after Academician F. N. Chernychev
(CNIGR Museum)

CATALOGUE
of holotypes of fauna and flora species stored in CNIGR Museum

Issue 3

Paleosoic, Mezozoic, Cenosoic

SAINT-PETERSBURG, 1996

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР
Центральный научно-исследовательский
геологоразведочный музей
имени акад. Ф. Н. Чернышева

КАТАЛОГ
голотипов видов фауны и флоры, хранящихся в ЦНИГР музее

Выпуск 3

Палеозой, Мезозой, Кайнозой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1996 г.

УДК 56 (031)

Каталог голотипов видов, хранящихся в ЦНИГР музее. ЦНИГР музей, 1996, 354 с.

В Каталог вошли сведения о 419 монографических палеонтологических коллекциях по палеозою и 245 коллекциях по мезозою и кайнозою. Составлены краткие аннотации с указанием описанных в работе и хранящихся в Музее таксонов, перечислены голотипы новых видов с указанием их номеров.

Приложены два указателя авторов коллекций на 144 и 98 фамилий и два указателя голотипов новых видов по группам (раздельно по палеозою и мезо-кайнозою) соответственно на 2983 и 1015 наименований.

Составители: *Н. М. Кадлец, Т. В. Куражева, Т. М. Мальчевская.*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Третий выпуск Каталога голотипов продолжает серию каталогов, составляемых ЦНИГР музеем с целью ознакомления широкого круга геологов и палеонтологов с хранящимися монографически описанными палеонтологическими коллекциями. В каталог включены работы, имеющие описание новых видов, поступивших на хранение в 1978—92 гг., и коллекции прежних лет, ранее не обработанные в соответствии с современными требованиями хранения. Особого внимания потребовали коллекции по строматопоратам. Перед включением в настоящий каталог они были просмотрены и переизучены О. В. Богоявленской с целью выявления голотипов.

Каталог составлен в двух частях (I — Палеозой, II — Мезозой и Кайнозой). В первую часть вошли сведения о 419 коллекциях (кембрий — 40, ордовик — 95, силур — 87, девон — 89, карбон — 46, пермь — 63). Вторая часть содержит сведения о 245 коллекциях (триас — 37, юра — 48, мел — 129, палеоген — 26, неоген — 4). Каталог построен аналогично предыдущим выпускам.

Монографии и статьи размещены по геологическим системам от древних к молодым и расположены в алфавитном порядке по фамилиям авторов. При наличии нескольких работ одного автора коллекции расположены по годам опубликования. В аннотациях указано количество описанных как ранее известных, так и новых таксонов, наличие голотипов в Музее. Даны списки голотипов новых видов, подвидов и вариететов для работ опубликованных до 1960 г. Коллекции пронумерованы в первой и второй части отдельно, начиная с № 1. После каждой части для удобства пользования приведен свой указатель авторов коллекций, соответственно на 144 и 98 фамилий и указатель голотипов новых видов по группам, всего на 2983 и 1015 наименований. Каждое видовое название снабжено номером, под которым коллекция включена в каталог.

Номер, под которым голотип хранится в Музее, представлен дробью, где числителем является номер экземпляра, по описи, а знаменателем — номер коллекции. Голотипы, не переданные на хранение, в списки не включались. Если голотипы автором не указаны, приведены списки синтипов. Неверные номера, указанные в описаниях, поставлены в скобках после действительного номера экземпляра и с момента опубликования настоящего каталога счи-

таются недействительными. Новые таксоны, описанные по единственному экземпляру, но не указанные в качестве голотипов, отмечены знаком (*). В указателях, перед названиями видов оставлен знак «?», поставленный автором при сомнении в принадлежности вида к данному роду, оставлено так же и подродовое название, указанное автором. По группам новые виды распределяются следующим образом: растительные остатки — 318, фораминиферы — 318, радиолярии — 26, губки — 1, строматопораты — 466, сцифозои — 1, коралловые полипы — 278, кольчатые черви — 2, трилобиты — 413, меростомовые — 2, ракообразные — 232, моллюски брюхоногие — 218, лопатоногие — 3, двустворчатые — 385, головоногие — 257, тентакулиты — 12, мшанки — 181, брахиоподы — 505, цистоидеи — 5, криноидеи — 259, эхиноидеи — 9, граптолиты — 68, панцирные рыбы — 1, хрящевые рыбы — 11, костные рыбы — 4, пресмыкающиеся — 11, млекопитающие — 6, проблематика — 6.

Авторы выражают искреннюю благодарность О. В. Богоявленской за помощь в приведении в порядок коллекций по строматопоратам.

Замечания, предложения и отзывы о настоящем выпуске каталога просим присылать по адресу: 199026, Санкт-Петербург, Средний пр., 74, ЦНИГР музей им. акад. Ф. Н. Чернышева.

FOREWORD

The present work is a continuation of a series of catalogues compiles with a view to acquainting geologists and paleontologists with a monographically described paleontological collections kept in CNIGR Museum. Similar to the ferst issue (1979) end second issue (1985), this catalogue also contains only data on holotypes of fauna and flora species, which is caused by a great number of paleontological available at the Museum.

The collections which have been replenished to the Museum mainly in 1978—1992 and more earlier collections which were not worked out according modern reqirement before were included in the third erdition. The special attention were paid to the collections on stromatoroids. They were revised additionally by Dr. O. V. Bogojavlensky writh the purpose of golotypes determination.

The issue is published in two parts (I — Paleozoic, II — Mezozoic, Cenozoic). The first part information on 419 collections (Cambrian — 40, Ordovician — 95, Silurian — 87, Devonian — 89, Carboniferous — 46, Permian — 63). The second part contains information on 245 collections (Triassic — 37, Jurassic — 48, Cretaceous — 129, Paleogene — 26, Neogene — 4). This catalogue is similar in structure to the first ones.

Monographs and articles are arranged according to geological systems from older to younger ones, and according to the names of the authors in the alphabetical order. If there are several works by the same author, they arranged according to years of publication. Brief abstracts are given with the number of the taxa described, both earlier known, and new ones indicated, as well as specifying the specimens kept in the Museum. Lists of holotypes of new spicies, subspecies and varieties for the papers published before 1960 are given. Collections were numberd in the first part and second parts begining of number 1. After the each part there are the index comprise 144 names in the first part and 98 names in the second part and index comprise 2983 and 1015 names of holotypes. The each species name beihg assigned a number under which the paper is listed in the Catalogue.

The museum number of each holotypes is represented by a fraction the numerator of which is the number of the specimen according to the inventory and the denominator, the number of the collection.

Holotypes, not kept in the Museum, hawe not been included into the Catalogue. If holotypes are not distinguished by the author, lists of syntipes are presented. Field numbers as well as erroneous numbers, given by the authors in descriptions, are put in braskets after a real museum number and are regarded invalid after the publication of the present Catalogue. New taxa, described on the basis of a single specimen, but not indicated as holotypes, have an «*» sign.

In case the autor is doubting about the belonging to a certain genus or subgenus, «?» put by the author is retained in the species index before the name of a species. New species are classified in the following way according to their types: plant remains — 318, protozoans — 344, sponges — 1, stromatoporoides — 466, coelenterates — 279, annelides — 2, arthropods — 647, mollusks — 875, bryozoans — 181, brachiopods — 505, echinoderms — 268, hemichordates — 68, chordates — 33, problematics — 6.

The authors express their sincere gratitude to Dr. O. V. Bogojavlensky for her assisstance in compling the Catalogue.

Remarks, suggestions and reviews of the present issue schould be forawarded to the following adress: 199026, Saint-Petersburg, Sredny 74, CNIGR Museum named after akad. F. N. Chernyshev.

Часть I. ПАЛЕОЗОЙ

КЕМБРИЙ

1. АНДРЕЕВА О. Н. (колл. № 12479). Кембрийские замковые брахиоподы. Палеонт. журн. № 4, 1987, с. 31—40, 2 пал. табл.

Описано 5 новых родов и 8 новых видов брахиопод из кембрия Сибирской платформы.

Голотипы:

Turarella alleri Andreeva.
№ 1/12479. Табл. III, фиг. 1
Eoorthis norilensis.
№ 8/12479. Табл. III, фиг. 8
Ocnerorthis lopatini.
№ 16/12479. Табл. III, фиг. 16
Engenella sibirica.
№ 25/12479. Табл. IV, фиг. 1
Engenella amakensis.
№ 20/12479. Табл. III, фиг. 20
Ambardella anabarensis.
№ 34/12479. Табл. IV, фиг. 10
Tcharella amgensis.
№ 40/12479. Табл. IV, фиг. 16
Cambrotrophia turukensis.
№ 45/12479. Табл. IV, фиг. 21

2. ГОРЯНСКИЙ В. Ю. (колл. № 10449). Первая находка остатков губки в нижнем кембрии Восточной Сибири. Ежег. ВПО, т. XX, 1971, с. 274—277, 1 пал. табл.

Новый вид 1.

Голотип:

Lenica unica Gorjansky.
№ 12/10449 (12/10833). Табл., фиг. 1

3. ГОРЯНСКИЙ В. Ю. (колл. № 10933). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 4, 1977, с. 99—102, 1 пал. табл.

Описано 3 новых вида кембрийских брахиопод, отнесенных к новому роду.

Голотипы:

Sibiria magna Gorjansky.
№ 1/10933. Табл. 24, фиг. 2
Sibiria glabra Gorjan.
№ 6/10933. Табл. 24, фиг. 6
Sibiria squamosa.
№ 8/10933. Табл. 24, фиг. 8

4. ЕГОРОВА Л. И., ПЕГЕЛЬ Т. В., ЧЕРНЫШЕВА Н. Е. (колл. № 10112). Майский ярус стратотипической местности (средний кембрий юго-востока Сибирской платформы) АН СССР, Тр. МСК, т. 8, 1982, 148 с., 64 пал. табл.

Дана характеристика стратиграфии и комплексов фауны майского яруса, послойно описан лектостратотип майского яруса и стратотип его нижней границы, приведено палеонтологическое обоснование границ и зональной шкалы. Описано 80 видов трилобитов, из них 42 новых, в коллекции 37, 45 форм с родовым определением, 4 подвида и 20 видов в открытой номенклатуре.

Голотипы:

Tomagnistus clarus Pokrovskaya et Jegorova.
№ 1/10112. Табл. 14, фиг. 8
Linguagnostus sibiricus Pokrovskaya et Pegel.
№ 2/10112. Табл. 61, фиг. 10
Peronopsis bulkurensis.
№ 3/10112. Табл. 56, фиг. 11
Hypagnostus facetus Pokrovskaya et Jegorova.
№ 4/10112. Табл. 42, фиг. 4
Acontheus limbatus Jegorova.
№ 5/10112. Табл. 9, фиг. 12
Anomocarioides novus N. Tchernysheva.
№ 7/10112. Табл.43, фиг. 1
Forchhammeria acuta N. Tchern.
№ 10/10112. Табл. 44, фиг. 13
Forchhammeria normalis Jegorova.
№ 11/10112. Табл. 23, фиг. 9
Irinia fida Pegel.
№ 12/10112. Табл. 57, фиг. 8
Harataspis ? lubrica.
№ 13/10112. Табл. 59, фиг. 10
Coosia ? crassa N. Tchernysheva.
№ 14/10112. Табл. 50, фиг. 7
Formosocephalus savitzkyi Pegel.
№ 15/10112. Табл. 51, фиг. 6

Paraorlovia torosa Jegorova.
№ 16/10112. Табл. 46, фиг. 8
Proasaphiscus ? *insuetus* Pegel.
№ 17/10112. Табл. 60, фиг. 3
Vega lecta Jegorova.
№ 18/10112. Табл. 39, фиг 2
Tankhella aspera Pegel.
№ 19/10112. Табл. 53, фиг. 7
Bonneterrina conica Jegorova.
№ 20/10112. Табл. 38, фиг. 7
Bolaspidina ? *rotunda* N. Tchernysheva.
№ 21/10112. Табл. 48, фиг. 13
Liostracus atlassovi Lermontova.
№ 22/10112. Табл. 5, фиг. 13
Liostracus tenkensis N. Tchernysheva.
№ 23/10112. Табл. 50, фиг. 1
Liostracus burgalensis N. Tchern.
№ 24/10112. Табл.40, фиг. 6
Liostracus suntensis.
№ 25/10112. Табл. 43, фиг. 13
Liostracus suetus Jegorova.
№ 26/10112. Табл. 44, фиг. 8
Liostracus pensus.
№ 27/10112. Табл. 42, фиг. 13
Pseudoliostracus torosus.
№ 28/10112. Табл.10, фиг. 6
Oculeus parvulus.
№ 29/10112. Табл. 37, фиг. 7
Solenopleura elgensis N. Tchernysheva.
№ 30/10112. Табл. 48, фиг. 7
Solenopleura ? *lecta* Jegorova.
№ 31/10112. Табл. 24, фиг. 17
Kuraspis inops.
№ 32/10112. Табл. 48, фиг. 18
Aiaiaspis modesta.
№ 33/10112. Табл. 29, фиг. 3
Caulaspina vera.
№ 34/10112. Табл. 31, фиг. 10
Belovia punctata N. Tchernysheva.
№ 35/10112. Табл. 47, фиг. 7
Pseudonericella pendula Jegorova.
№ 36/10112. Табл. 37, фиг. 1
Sacha alata.
№ 39/10112. Табл. 31, фиг. 2
Kontrastina binodosa.
№ 40/10112. Табл. 38, фиг. 12
Pegelina maja.
№ 41/10112. Табл. 28, фиг. 10

Tchabdania tchupachini.
№ 42/10112. Табл. 26, фиг. 12

5. КОНЕВА С. П., ПОПОВ Л. Е. (колл. № 11991). Некоторые новые лингулиды из верхнего кембрия и нижнего ордовика Малого Каратау. В кн.: «Стратиграфия и палеонтология нижнего палеозоя Казахстана» АН Каз. ССР, 1983, с. 112—123.

Описано 1 новое семейство, 3 новых рода с 3-мя типовыми новыми видами. В колл. 2 новых вида.

Голотипы:

Experilingula divulgata Koneva et Popov.
№ 2/11991 (1199/2). Табл. XXVI, фиг. 9
Mirilingula mutabilis Popov.
№ 26/11991 (11991/26). Табл. XXVIII, фиг. 10

6. КОНЕВА С. П., ПОПОВ Л. Е. (колл. № 12034). Акротретиды (беззамковые брахиоподы) из пограничных отложений кембрия-ордовика хребта Малый Каратау (Южный Казахстан). Ежег. ВПО, т. XXXI, 1988, с. 52—69, 3 пал. табл.

Описано 6 новых видов брахиопод из кембрия и ордовика Казахстана.

Голотипы:

Quadrisonia declivis Koneva et Popov.
№ 4/12034. Табл. I, фиг. 5
Quadrisonia suspensa.
№ 8/12034. Табл. I, фиг. 11
Eurytreta discors.
№ 10/12034. Табл. II, фиг. 1
Eurytreta sublata.
№ 13/12034. Табл. II, фиг. 6
Eurytreta evanda.
№ 20/12034. Табл. III, фиг. 1
Eurytreta (?) *exigua.*
№ 23/12034. Табл. III, фиг. 3

7. ЛАЗАРЕНКО Н. П. (колл. № 8270, 8614). Новые данные о трилобитах рода *Triangulaspis.* Сб. статей по палеонт. и биострат. НИИГА. Вып. 3, 1958, с. 3—17, 1 пал. табл.

Описано 3 новых вида трилобитов одного рода, представители которого во всех разрезах приурочены к определенному стратиграфическому уровню.

Голотипы:

Triangulaspis lermontovae Lazarenko.
№ 59/8270. Табл. I, фиг. 6
Triangulaspis rarus Laz.
№ 76/8270. Табл. I, фиг. 20, 22
Triangulaspis granulosus.
№ 17/8614. Табл. I, фиг. 16—18

8. ЛАЗАРЕНКО Н. П. (колл. № 8615). О находке *Bathynotus* в кембрийских отложениях севера Сибирской платформы. Сб. статей по палеонт. и биострат. НИИГА. Вып. 8, 1958, с. 15—20, 1 пал. табл.

Всего 1 новый вид трилобитов.

Голотип:

Bathynotus anabarensis Lazarenko.
№ 2/8615. Табл. I, фиг. 7

9. ЛАЗАРЕНКО Н. П. (колл. № 8616). Среднекембрийские *Pagetides* севера Сибирской платформы (трилобиты). Сб. статей по палеонт. и биострат. НИИГА. Вып. 14, 1959, с. 5—16, 1 пал. табл.

Описано 2 новых вида и 1 вариетет.

Синтипы:

Pagetides sibiricus Lazarenko.
№ 1/8616. Табл. I, фиг. 1, 2
№ 2/8616. Табл. I, фиг. 3, 4
№ 3/8616. Табл. I, фиг. 5—7
№ 4/8616. Табл. I, фиг. 8
№ 5/8616. Табл. I, фиг. 9
№ 6/8616. Табл. I, фиг. 10, 11

Pagetides sibiricus var. *calvus* Laz.
№ 7/8616. Табл. I, фиг. 12, 13
№ 8/8616. Табл. I, фиг. 14, 15
№ 9/8616. Табл. I, фиг. 16, 17
№ 10/8616. Табл. I, фиг. 18, 19

Pagetides spinosus.
№ 12/8616. Табл. I, фиг. 20, 21
№ 13/8616. Табл. I, фиг. 22, 23
№ 14/8616. Табл. I, фиг. 24, 25
№ 15/8616. Табл. I, фиг. 26
№ 16/8616. Табл. I, фиг. 27
№ 17/8616. Табл. I, фиг. 28, 29
№ 18/8616. Табл. I, фиг. 30, 31

10. ЛАЗАРЕНКО Н. П. (колл. № 8617). Некоторые верхнекембрийские трилобиты Северо-Запада Сибирской платформы. Сб. статей по палеонт. и биострат. НИИГА, вып. 20, 1960, с. 12—44, 4 пал табл.

Описано 10 новых видов трилобитов, 2 новых рода. В коллекции новых видов 9.

Голотипы:

Koldiniella convexa Lazarenko.
№ 1/8617. Табл. I, фиг. 1—3

Kuljumbina grandis Laz.
№ 11/8617. Табл. II, фиг 3—5
Lorenzella (?) *prima.*
№ 15/8617. Табл. II, фиг. 9, 10
Schoriella lata.
№ 19/8617. Табл. II, фиг. 14
Kaninia quadrata.
№ 26/8617. Табл. III, фиг. 1, 2
Catuniella lauta.
№ 33/8617. Табл. III, фиг. 17
Pedinocephalina divulgata.
№ 35/8617. Табл. IV, фиг. 5
Acrocephalina borealica.
№ 35/8617. Табл. III, фиг. 10
Acidaspidina plana.
№ 45/8617. Табл. IV, фиг. 9, 10

11. ЛАЗАРЕНКО Н. П. (колл. № 9089). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР, часть II, 1960, с. 212—255.
Описано 10 новых видов кембрийских трилобитов.

Голотипы:

Judomia tera Lazarenko.
№ 6/9089. Табл. 50, фиг. 16
Corynexochus tersus Laz.
№ 4/9089. Табл. 50, фиг. 10
Doropyge olenekensis.
№ 1/9089. Табл. 50, фиг. 2
Inikanella gracilis.
№ 9/9089. Табл. 51, фиг. 3
Brassicicephalus jakuticus.
№ 15/9089. Табл. 53, фиг. 12
Brassicicephalus planus.
№ 17/9089. Табл. 53, фиг. 14
Pseudonomocarina obunca.
№ 13/9089. Табл. 52, фиг. 13
Liostracus orientalis.
№ 12/9089. Табл. 52, фиг. 10
Aldanaspis venusta.
№ 20/9089. Табл. 53, фиг. 19
Schmalenseeia spinulosa.
№ 19/9089. Табл. 53, фиг. 18

12. ЛАЗАРЕНКО Н. П. (колл. № 8618). Среднекембрийские трилобиты рода *Kounamkites* Lermontova. В сб.: «Палеонтология и биостратиграфия Советской Арктики». Вып. 2, тр. НИИГА, т. 124, 1961, с. 9—26, 6 пал. табл.
Описано 7 видов трилобитов одного рода, из них 4 новые.

Голотипы:

Kounamkites insuetus Lazarenko.
№ 6/8618. Табл. III, фиг. 6
Kounamkites levis Laz.
№ 37/8618. Табл. IV, фиг. 1
Kounamkites aciferus.
№ 42/8618. Табл. IV, фиг. 7
Kounamkites quadratus.
№ 53/8618. Табл. VI, фиг. 1

13. ЛАЗАРЕНКО Н. П. (колл. № 8270). Новые нижнекембрийские трилобиты Советской Арктики. Сб. статей по палеонт. и биострат. Вып. 29, НИИГА, 1962, с. 29—78, 8 пал. табл.

Приведен краткий биостратиграфический очерк, схема расчленения нижнего кембрия Анабарской антиклизы и сопоставление стратиграфических схем нижнего кембрия Сибирской платформы. Описано 5 новых родов и 25 новых видов, для одного вида Е. В. Лермонтовой выбран неотип.

Голотипы:

Neopagetina orbiculata Lazarenko.
№ 22/8270. Табл. I, фиг. 1
Neopagetina venusta Laz.
№ 30/8270. Табл. I, фиг. 8
Hebediscus granulosus.
№ 51/8270. Табл. I, фиг. 14—16
Hebedi cus longus.
№ 54/8270. Табл. I, фиг. 20, 21
Pagetiellus porrectus.
№ 87/8270. Табл. II, фиг. 1, 2
Pagetiellus anabarus.
№ 96/8270. Табл. II, фиг. 9
Pagetiella pervulgatus.
№ 102/8270. Табл. II, фиг. 15, 16
Pagetiellus ultimus.
№ 108/8270. Табл. II, фиг. 21
Judomia mattajensis.
№ 133/8270. Табл. III, фиг. 1
Judomia (?) *spinosa.*
№ 137/8270. Табл. III, фиг. 5
Judomiella heba.
№ 138/8270. Табл. III, фиг. 6
Protolenus jakutensis.
№ 146/8270. Табл. IV, фиг. 3
Lermontovia tumida.
№ 195/8270. Табл. IV, фиг. 11
Lermontova elegans.
№ 197/8270. Табл. V, фиг. 1—3

Charaulaspis prima.
№ 203/8270. Табл. V, фиг. 6, 7
Chorbusulina bella.
№ 213/8270. Табл. VI, фиг. 1
Anabaraspis tenius.
№ 257/8270. Табл. VI, фиг. 6
Jakutus priscus.
№ 265/8270. Табл. VI, фиг. 12, 13
Kootenia moori Lermontova.
№ 294/8270. Табл. VII, фиг. 1 — неотип
Erkelina scita Lazarenko.
№ 316/8270. Табл. VII, фиг. 7, 8
Eoptychoporia manifesta.
№ 320/8270. Табл. VII, фиг. 11, 12
Alokistocare faceta.
№ 329/8270. Табл. VIII, фиг. 12, 13
Botomella sukharichensis.
№ 330/8270. Табл. VIII, фиг. 1, 2
Erbiopsis (?) *parvus.*
№ 334/8270. Табл. VIII, фиг. 7—9
Usumunaspis convexa.
№ 337/8270. Табл. VIII, фиг. 14, 15

14. ЛАЗАРЕНКО Н. П. (колл. № 8763). Некоторые новые среднекембрийские трилобиты севера Средней Сибири. Ученые зап. НИИГА, палеонт. и биострат. Вып. 7, 1965, с. 14—36, 3 пал. табл.

Описано 11 новых видов трилобитов, принадлежащих 8 родам, из которых 2 — новые.

Голотипы:

Acontheus patens Lazarenko.
№ 1/8763. Табл. I, фиг. 1, 2
Cyclolorenzella granulata Laz.
№ 2/8763. Табл. I, фиг. 3—5
Chondranomocare bucculentum.
№ 8/8763. Табл. I, фиг. 11, 12
Buitella buitensis.
№ 15/8763. Табл. II, фиг. 1—4
Buitella olenekensis.
№ 20/8763. Табл. I, фиг. 19—21
Hartshillia pusilla.
№ 26/8763. Табл. II, фиг. 9, 10
Hartshillia clivosa.
№ 29/8763. Табл. II, фиг. 13, 14
Hartshillia taimyrica.
№ 30/8763. Табл. II, фиг. 15—17
Maiaspis spinosa.
№ 31/8763. Табл. III, фиг. 1—5

Aldanaspis recata.
№ 40/8763. Табл. III, фиг. 18, 19
Plakhinella quadrata.
№ 44/8763. Табл. II, фиг. 20, 21

15. ЛАЗАРЕНКО Н. П. (колл. № 8907). Биостратиграфия и некоторые новые трилобиты верхнего кембрия Оленекского поднятия и Хараулахских гор. Ученые зап. НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 11, 1966, с. 33—78, 8 пал. табл.

Описано 19 новых видов трилобитов и 3 новых рода, выделены трилобитовые зоны, позволяющие коррелировать отложения с другими регионами.

Голотипы:

Cyclopagnostus orientalis Lazarenko.
№ 1/8907. Табл. I, фиг. 1
Cyclopagnostus asper Laz.
№ 9/8907. Табл. I, фиг. 11
Agnostus captiosus.
№ 11/8907. Табл. I, фиг. 13
Glyptagnostotes elegans.
№ 24/8907. Табл. II, фиг. 1
Pseudagnostus quadratus.
№ 36/8907. Табл. I, фиг. 24
Cedarellus felix.
№ 44/8907. Табл. III, фиг. 3
Blackwelderia (?) *florens.*
№ 51/8907. Табл. II, фиг. 13
Proceratopyge tenuita.
№ 52/8907. Табл. III, фиг. 10
Proceratopyge portentosa.
№ 59/8907. Табл. IV, фиг. 1
Proceratopyge captiosa.
№ 65/8907. Табл. IV, фиг. 7
Olenus proximus.
№ 69/8907. Табл. V, фиг. 8
Parabolinella (?) *fortunata.*
№ 71/8907. Табл. V, фиг. 1
Parabolinina edita.
№ 86/8907. Табл. VI, фиг. 11
Plicatolina perlata.
№ 95/8907. Табл. VII, фиг. 7
Plicatolina lucida.
№ 104/8907. Табл. VII, фиг. 17
Olentella illustris.
№ 108/8907. Табл. VIII, фиг. 6
Onhonotellus tchecurensis.
№ 111/8907. Табл. VIII, фиг. 1

Acrocephalaspis orientalis.
№ 112/8907. Табл. IV, фиг. 11
Buttsia pinga.
№ 118/8907. Табл. VIII, фиг. 9

16. ЛАЗАРЕНКО Н. П. (колл. № 9654). Новые трилобиты из кембрийских отложений севера Сибири. В сборнике: В. А. Даценко, И. Т. Журавлева и др., «Биостратиграфия и фауна кембрийских отложений северо-запада Сибирской платформы». Тр. НИИГА, т. 155, 1968, с. 176—203.

Описано 19 новых видов трилобитов, 2 из которых принадлежат двум новым родам.

Голотипы:

Aplexura lepida Lazarenko.
№ 1/9654. Табл. XV, фиг. 1, 2
Kazelia norilica Laz.
№ 6/9654. Табл. XV, фиг. 7
Anomocarioides divulgatus.
№ 7/9654. Табл. XV, фиг. 8—10
Metanomocare brussense.
№ 13/9654. Табл. XV, фиг. 18
Catuniella (?) *monstruosa.*
№ 14/9654. Табл. XVI, фиг. 1
Iwayaspis caelata.
№ 18/9654. Табл. XVI, фиг. 6
Iwayaspis curta.
№ 26/9654. Табл. XVI, фиг. 15
Iwayaspis ventosa.
№ 29/9654. Табл. XVI, фиг. 17
Iwayaspis longa.
№ 28/9654. Табл. XVI, фиг. 16
Irvingella norilica.
№ 30/9654. Табл. XVII, фиг. 1, 2
Komaspidella rara.
№ 31/9654. Табл. XVII, фиг. 3
Garbiella urvantzevi.
№ 33/9654. Табл. XVII, фиг. 6
Menomonia asiatica.
№ 39/9654. Табл. XVII, фиг. 14
Hartshillia spinosa.
№ 42/9654. Табл. XVII, фиг. 18—20
Onchondellus conusoides.
№ 43/8654. Табл. XVII, фиг. 21
Idiomesus hantaiensis.
№ 46/9654. Табл. XVIII, фиг. 1
Eoacudasis amplicauda.
№ 49/9654. Табл. XVIII, фиг. 1

Toxotis (?) *venustus.*
№ 53/9654. Табл. XVIII, фиг. 4
Tagenarella eniseica.
№ 59/9654. Табл. XIX, фиг. 1—3

17. МИРОШНИКОВ Л. Д., КРАВЦОВ А. Г. (колл. № 9330). Редкие палеонтологические остатки и следы жизни в отложениях позднего кембрия Северо-Запада Сибирской платформы. Тр. НИИГА, т. 111, палеозоология, 1960, с. 28—47, 1 пал. табл.

Описанная коллекция окаменелостей представлена остатками щетинконогих червей, ракообразных, следами ползания трилобитов, ходами илоедов и проблематичными образованиями. Всего 2 новых вида.

Голотипы:

Opabinia norilica Krawzov et Miroschnikov.
№ 1/9330 (178/449). Рис. 1
Tucolandia vermeticus Krawzov.
№ 4/9330. Рис. 6

18. НИКИТИН И. Ф., ПОПОВ Д. Е. (колл. № 12068). Замковые брахиоподы из верхнего кембрия и нижнего ордовика Малого Каратау. В сб.: «Стратиграфия и палеонт. нижнего палеозоя Казахстана». АН Каз.ССР, 1983, с. 124—135, 3 пал. табл.

Описано 6 видов, из них 4 новых и 1 в открытой номенклатуре, 3 формы с родовым определением.

Голотипы:

Palaeostrophia angulata Nikitin et Popov.
№ 38/12068. Табл. XXXIII, фиг. 3
Palaeostrophia fibrillosa.
№ 27/12068. Табл. XXXIV, фиг. 10
Palaeostrophia tecta.
№ 54/12068. Табл. XXXIII, фиг. 13
Clarkella testudo.
№ 66/12068. Табл. XXXIV, фиг. 14

19. ПОПОВ Л. Е., СОЛОВЬЕВ И. А. (колл. № 11731). Среднекембрийские беззамковые брахиоподы, ханцеллории, кониконхии и трилобиты Западной Антарктиды (хребты Шеклтон и Аргентина). Антарктика, вып. 20. М., «Наука», 1981, с. 64—73.

Описаны с родовыми определениями представители ханцеллорий и кониконхий, 1 новый род с типовым новым видом брахиопод и 2 формы с родовым определением, 3 вида трилобитов.

Голотип:

Natiobolus tennis Popov.
№ 25/11731. Табл. III, фиг. 1

20. ПОПОВ Л. Е. (колл. № 12278). Кембрийские замковые брахиоподы из южного берега губы Грибовой, Южный остров. В сб.: «Новая Земля на ранних этапах геологического развития» ПГО «Севморгеология», 1984, с. 27—35, 1 пал. табл.

Всего 3 вида, из них 1 новый.

Голотип:

Diraphora simplex Popov.
№ 1/12278. Табл. I, фиг. 1

21. ПОПОВ Л. Е. (колл. № 12376). Кембрийские беззамковые брахиоподы из Северо-Западной части Южного острова архипелага Новая Земля. В сб.: «Стратиграфия и фауна палеозоя Новой Земли». ПГО «Севморгеология», 1985, с. 17—30, 2 пал. табл.

Описано 3 вида, из них 1 новый, 1 в открытой номенклатуре и 4 формы с родовым определением.

Голотип:

Prototreta gribovensis Popov.
№ 29/12376. Табл. I, фиг. 20

22. ПОПОВ Л. Е., ТИХОНОВ Ю. А. (колл. № 12589). Раннекембрийские брахиоподы из Южной Киргизии. Палеонт. журн. № 3, 1990, с. 33—45, 2 пал. табл.

Описано 1 новое семейство, 1 новый отряд, 3 новых рода и 5 видов, из них 4 новых.

Голотипы:

Chile mirabilis Popov et Tikhonov.
№ 3/12589. Табл. I, фиг. 1

Naukat proprium.
№ 10/12589. Табл. IV, фиг. 2

Oina rotunda.
№ 14/12589. Табл. III, фиг. 10

Nisusia alaica.
№ 30/12589. Табл. III, фиг. 18

23. ПОПОВ Ю. И. (колл. № 8942). Новая кембрийская сцифомедуза. Палеонт. журн. № 2, 1967, с. 122, 123.

Описан 1 экземпляр, позднее в работе отнесенный автором к новому роду *Eomedusa* Popov, там же изменена орфография видового названия на *datzenkoi.*

Голотип:

Camptostroma datsenkoi Popov.
№ 1/8942, фото в тексте.

24. СОЛОВЬЕВ И. А. (колл. № 8578). Некоторые новые трилобиты из амгинского яруса в Оленекском районе Якутии. Уч. зап. НИИГА, палеонт. и биострат. Вып. 4, 1964, с. 33—55, 1 пал. табл.

Описан 1 новый род, 2 новых вида и 1 подвид трилобитов из кембрийских горючих сланцев Якутии.

Голотипы:

Ladadiscus granulatus I. Solovjev.
№ 1/8578. Табл. I, фиг. 1
Udjanella sibirica I. Solov.
№ 2/8578. Табл. I, фиг. 2
Oryctocephales frischenfeldi arctica.
№ 7/8578. Табл. I, фиг. 7

25. СОЛОВЬЕВ И. А. (колл. № 8628). О среднекембрийском роде *Prohedinia* (трилобиты). Ученые записки НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 14, 1966, с. 15—27, 2 пал. табл.
Дана краткая характеристика семейства *Papyriaspididae*, уточненный и расширенный диагноз рода *Prohedinia* и описано 2 вида этого рода. Новый вид 1.

Голотип:

Prohedinia sibirica I. Solovjev.
№ 1/8628. Табл. I, фиг. 1, 2; рис. 4а

26. СОЛОВЬЕВ И. А. (колл. № 8634). Два новых вида трилобитов из майских отложений северной Якутии. Ученые записки НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 17, 1967, с. 17—26, 1 пал. табл.
Описано 2 новых вида.

Голотипы:

Forchhammeria picta Solovjev.
№ 1/8634. Табл. I, фиг. 1
Centropleura limbata Sol.
№ 8/8634. Табл. I, фиг. 8, 9

27. СОЛОВЬЕВ И. А., ГРИКУРОВ Г. Э. (колл. № 11502). Первые находки среднекембрийских трилобитов в хребте Шеклтон (Антарктида). Антарктика. Докл. комиссии, вып. 17, 1978, с. 187—198, 1 пал. табл.
Описано 3 вида трилобитов, из них 2 новые и 2 новых вариетета.

Голотипы:

Ehmania shackletonia I. Solovjev et Grikurov.
№ 3/11502. Табл. I, фиг. 3
Lyriaspis antarctica.
№ 14/11502. Табл. I, фиг. 14

28. СОЛОВЬЕВ И. А., ГРИКУРОВ Г. Э. (колл. № 11503). Новые данные о распространении кембрийских трилобитов в хребтах Арджентина и Шеклтон. Антарктика. Докл. комиссии, вып. 18, 1979, с. 54—73, 4 пал. табл.

Описано 13 видов трилобитов, из них 1 новый и 2 формы с родовым определением.

Голотип:

Bathynotellus jershovi I. Solovjev.
№ 31/11503. Табл. IV, фиг. 31

29. СОЛОВЬЕВ И. А., ПОПОВ Л. Е., САМСОНОВ В. В. (колл. № 12076). Новые данные о верхнекембрийской фауне гор Элсуэрт и Пенсакола (Западная Антарктида). Антарктика, вып. 23, 1984, с. 46—71, 8 пал. табл.

Описаны остатки спикул губок, 17 видов и 8 подвидов трилобитов, из которых 4 вида и 7 подвидов новые, 10 видов в открытой номенклатуре, 5 форм с родовым определением; 2 рода остатков гастропод и 1 новый вид, и 3 новых рода брахиопод.

Голотипы:

Norwoodia quadrangularis longa I. Solovjev.
№ 84/12076. Табл. III, фиг. 29
Coosia coreanica soholti I. Sol.
№ 54/12076. Табл. II, фиг. 15
Coosia coreanica sulca.
№ 111/12076. Табл. V, фиг. 10
Coosia coreanica angulata.
№ 123/12076. Табл. IV, фиг. 4
? *Coosia ignota.*
№ 53/12076. Табл. II, фиг. 14
Blountia (Mindicrusta) advena antarctica.
№ 148/12076. Табл. VII, фиг. 11
Aphelaspis (Labiostria) antarctica antarctica.
№ 87/12076. Табл. IV, фиг. 1
Aphelaspis (Labiostria) antarctica angulata.
№ 90/12076. Табл. IV, фиг. 4
Aphelaspis (Proaulacopleura) cylindrica.
№ 117/12076. Табл. V, фиг. 16
Aphelaspis (Eugonocare) soholti.
№ 119/12076. Табл. V, фиг. 18
Blandicephalus heritidji.
№ 109/12076. Табл. V, фиг. 8
Dactylotreta solitaria Popov.
№ 27/12076. Табл. I, фиг. 9—11

30. СОЛОВЬЕВ И. А. (колл. № 12310, 12337). Биостратиграфия и трилобиты кембрия Новой Земли. В сб.: «Кембрий Сибири и Средней Азии» СО АН СССР, вып. 720, 1988, с. 134—204, 2 пал. табл.

Описано 8 видов, из них 1 новый и 2 формы в открытой номенклатуре; 4 подвида, из них 2 новых и 7 форм в открытой номенклатуре.

Голотипы:

Protagraulos priscus novozemelica I. Solovjev.
№ 50/12310 (51/12310). Табл. I, фиг. 1; табл. III, фиг. 7

Protagraulos priscus gribovae I. Sol.
№ 52/12310. Табл. XVII, фиг. 13

Protagraulos subpriscus.
№ 53/12310. Табл. XVII, фиг. 12

31. СОЛОВЬЕВ И. А. (колл. № 12495). Новые трилобиты из кембрия севера Сибирской платформы. Палеонт. журн. № 3, 1988, с. 56—63, 1 пал. табл.

Всего 5 новых видов и 1 новый подвид трилобитов, в коллекции 4 новых вида и 1 подвид.

Голотипы:

Aldonaia cylindrica I. Solovjev.
№ 1/12495. Табл. VII, фиг. 1

Paradoxides (Eccaparadoxides) subenormis I. Sol.
№ 2/12495. Табл. VII, фиг. 3

Oryctocephalops frischenfeldi granulatus.
№ 6/12495. Табл. VII, фиг. 2

Forchhammeria dzhelindensis.
№ 8/12495. Табл. VII, фиг 7

Onchonetellus sibigiricus.
№ 13/12495. Табл. VII, фиг. 10

32. ХАЗАНОВИЧ К. К., ПОПОВ Л. Е., МЕЛЬНИКОВА Л. М. (колл. № 11916). Беззамковые брахиоподы, остракоды (брадориниды) и хиолительминты из Саблинской свиты Ленинградской области. Палеонт. журн. № 4, 1984, с. 33—47, 1 пал. табл.

Приводится характеристика двух фаунистических комплексов из верхней части свиты. Описано 2 новых рода и 5 новых видов. В коллекции 4 новых вида.

Голотипы:

Obolus ruchini Khazanovitch et Popov.
№ 5/11916. Табл. III, фиг. 28

Obolus rebrovi.
№ 15/11916. Табл. III, фиг. 16

Oepikites macilentus.
№ 23/11916 (29/11916). Табл. III, фиг. 1

Oepikites koltchanovi.
№ 30/11916. Табл. III, фиг. 10

33. ХРАМОВА А. П. (колл. № 9596). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 4, 1977, с. 67.

Описано 3 новых вида кембрийских трилобитов, в коллекции 1 новый.

Голотип:

Acidaspides entis Khramova.
№ 7/9596. Табл. 15, фиг. 3

34. ЧЕРНЫШЕВА Н. К. (колл. № 8505, 9181). Класс *Trilobita.* Мат. по палеонт. Новые семейства и роды, 1956, с. 145—182.
Всего 7 новых родов и 8 новых видов кембрийских трилобитов.

Голотипы:

Bulaiaspis vologdini Lermontova.
№ 1/8505. Табл. XXVIII, фиг. 1
Kounamkites virgatus N. Tchernysheva.
№ 6/8505. Табл. XXIX, фиг 8
Paraorlovia sequens N. Tchern.
№ 9/8505. Табл. XXXII, фиг. 1
Maiaspis mirabilis.
№ 13/8505. Табл. XXXIII, фиг. 7
Amginouyia elegans.
№ 248/9181. Табл. XXXIII, фиг. 14, 14а
Pseudanomocarina plana.
№ 257/9181. Табл. XXII, фиг. 7
Belovia calva.
№ 20/8505. Табл. XXXII, фиг. 10
Amgaspis medius.
№ 86/9181. Табл. XXXIII, фиг. 1

35. ЧЕРНЫШЕВА Н. Е. (колл. № 9180). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Часть II, 1960, с. 219—255, 4 пал. табл.
Описано 16 новых видов кембрийских трилобитов.

Голотипы:

Oryctocephalites incertus N. Tchernysheva.
№ 1/9180. Табл. 51, фиг. 7
Oryctocara ovata N. Tchern.
№ 2/9180. Табл. 51, фиг. 4
Koldiniella orbiculata.
№ 5/9180. Табл. 50, фиг. 12
Anomocarina obscura.
№ 7/9180. Табл. 52, фиг. 11
Coosia sukhanica.
№ 9/9180. Табл. 52, фиг. 1
Paracoosia pulchra.
№ 11/9180. Табл. 52, фиг. 7
Schoriella optata.
№ 14/9180. Табл. 52, фиг. 4
Ptychoparia magna.
№ 17/9180. Табл. 51, фиг. 10

Elrathia alexandrovi.
№ 19/9180. Табл. 51, фиг. 8
Bolaspidina insignis Lermontova.
№ 21/9180. Табл. 53, фиг. 8
Pesaia (?) *perfida* N. Tchern.
№ 24/9180. Табл. 53, фиг. 16
Maiaspis inflata.
№ 26/9180. Табл. 52, фиг. 16
Lonchocephalus (?) *vetus.*
№ 28/9180. Табл. 53, фиг. 11
Kuraspis obscura.
№ 29/9180. Табл. 53, фиг. 4
Kuraspis similis.
№ 31/9180. Табл. 53, фиг. 2
Acidaspides borealis.
№ 34/9180. Табл. 53, фиг. 9

36. ЧЕРНЫШЕВА Н. Е. (колл. № 9181). Стратиграфия кембрия алданской антиклизы и палеонтологическое обоснование выделения амгинского яруса. Биострат. палеозоя Сиб. платформы, Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 49, 1961, 282 с., 30 пал. табл.

Изучение комплекса трилобитов позволило уточнить границу между нижне- и среднекембрийскими отложениями, выделить фаунистические зоны, построить схемы предполагаемых филогенетических отношений родов и видов. Описано 58 видов, 5 форм, 1 вариетет, 2 вида с родовым определением. Новых видов 39.

Голотипы:

Schistocephalus antiquus M. Tchernysheva.
№ 35/9181. Табл. III, фиг. 2
Schistocephalus juvenis N. Tchern.
№ 44/9181/ Табл. IV, фиг. 1
Jakutus exiguus.
№ 57/9181. Табл. V, фиг. 13
Bathyuriscellus quadratus.
№ 58/9181. Табл. VII, фиг. 4
Parapoliella sulcata.
№ 72/9181. Табл. VI, фиг. 2
Amphoton longus.
№ 82/9181. Табл. VII, фиг. 9
Amgaspis brevis.
№ 96/9181. Табл. VIII, фиг. 11
Amgaspis rudis.
№ 97/9181. Табл. IX, фиг. 9
Amgaspidella elongata.
№ 103/9181. Табл. IX, фиг. 1
Amgaspidella limbata.
№ 109/9181. Табл. IX, фиг. 7

Edelsteinaspis plana.
№ 115/9181. Табл. X, фиг. 5а, б
Kooteniella mutabilis.
№ 137/9181. Табл. XII, фиг. 1
Kooteniella acuta.
№ 148/9181. Табл. XIII, фиг. 2
Kootenia ontoensis.
№ 159/9181. Табл. Табл. XIV, фиг. 1
Kootenia amgensis.
№ 166/9181. Табл. XIV, фиг. 8а, б
Olenoides laevigatus.
№ 198/9181. Табл. XVI, фиг. 6
Pseudoeteraspis aldanensis.
№ 205/9181. Табл. XVII, фиг. 5
Chondragraulos angustus.
№ 227/9181. Табл. XIX, фиг. 2
Chondragraulos granulatus.
№ 229/9181. Табл. XX, фиг. 1
Chondragraulos (Antagmopleura) flerovae Lermontova.
№ 236/9181. Табл. XXI, фиг. 2
Chondragraulos (Atagmopleura) arcuata N. Tchern.
№ 240/9181. Табл. XXI, фиг. 6а, б
Chondragraulos (Antagmopleura) convexa.
№ 242/9181. Табл. XXI, фиг. 8
Namanoia incerta.
№ 251/9181. Табл. XX, фиг. 7
Pseudanomocarina aojiformis.
№ 267/9181. Табл. XXIII, фиг. 10
Pseudanomocarina parva.
№ 274/9181. Табл. XXIII, фиг. 6
Pseudanomocarina horrida.
№ 279/9181. Табл. XXIII, фиг. 2
Chondranomocare eminens.
№ 294/9181. Табл. XXV, фиг. 7
Chondranomocare tenuis.
№ 300/9181. Табл. XXV, фиг. 2
Kolpura aculeata.
№ 301/9181. Табл. XXV, фиг. 12
Koptura lata.
№ 305/9181. Табл. XXIV, фиг. 10
Koptura oblonga.
№ 306/9181. Табл. XXIV, фиг. 11
Tankhella devexa.
№ 313/9181. Табл. XXVI, фиг. 7
Granularia grandis Lermontova.
№ 321/9181. Табл. XXVII, фиг. 2
Gaphuraspis inflata N. Tchern.
№ 333/9181. Табл. XXVIII, фиг. 10

Gaphuraspis (?) *levis.*
№ 340/9181. Табл. XXVIII, фиг. 5
Kounamkites (?) *tuberculatus.*
№ 348/9181. Табл. XXVIII, фиг. 4
Ontoella triangulata.
№ 349/9181. Табл. XXIX, фиг. 10
Eospencia amgensis.
№ 351/9181. Табл. XXIX, фиг. 1
Binodaspis rara.
№ 363/9181. Табл. VII, фиг. 1

37. ЧЕРНЫШЕВА Н. К. (колл. № 8662). В статье: Л. Г. Заварзин, Н. Е. Чернышева. Новые данные о кембрии Енисейского кряжа. Геол. и Геофизика № 3, СО АН СССР, 1965, с. 148—151.
Описан 1 новый вид кембрийских трилобитов.

Голотип:

Pseudoeteraspis plana N. Tchernysheva.
№ 1/8662. Рис. 1 в тексте.

38. ЧЕРНЫШЕВА Н. Е. (колл. № 8992). Среднекембрийские трилобиты Северного Кавказа. Палеонт. журн. № 1, 1968, с. 71—80, 1 пал. табл.
Анализ изученных трилобитов позволил автору сопоставить кембрийские отложения Северного Кавказа с сибирскими. Новых видов 5.

Голотипы:

Orloviella caucasica N. Tchernysheva.
№ 5/8992. Табл. XI, фиг. 5
Orloviella (?) *trapezoidalis* N. Tchern.
№ 10/8992. Табл. XI, фиг. 10
Solenopleura raduginiformis.
№ 13/8992. Табл. XI, фиг. 13
Rina longa.
№ 17/8992. Табл. XI, фиг. 17
Bonneterrina (?) *convexa.*
№ 19/8992. Табл. XI, фиг. 19

39. ЧЕРНЫШЕВА Н. Е. (колл. № 9934). Новый вид *Irvingella* (кембрийский трилобит). В сб.: «Биостратиграфия и фауна кембрийских отложений Северо-Запада Сибирской платформы». В. А. Даценко, И. Т. Журавлева, Н. П. Лазаренко и др. Тр. НИИГА, т. 155, 1968, с. 203—211, 1 пал. табл.

Новый вид 1.

Голотип:

Irvingella perfecta N. Tchernysheva.
№ 2/9934. Табл. XXII, фиг. 2

40. ЯВОРСКИЙ А. И. (YAWORSKY, колл. № 4070). Ein Stromatoporenfund im Cambrium. Sonder-Abdruck aus dem Centralbaltt f. Min etc. Jahrg., Abt. B, No 12, 1932, S. 613—616.

Описано 2 новых вида строматопорат из отложений кембрия Сибири. В коллекции 1 новый вид.

Голотип:

Clathrodictyon sajanicum Yavorsky.
№ 2а, в/4070. Fig. 4, *5*

ОРДОВИК

41. АБУШИК А. Ф., САРВ Л. (колл. № 11412). Остракоды молодовского горизонта Подолии. В кн.: «Палеонтология древнего палеозоя Прибалтики и Подолии». Таллин, 1983, с. 101—134, 10 пал. табл.

Изученная коллекция позволила предположить, что субочские слои молодовского горизонта сопоставимы с отложениями набалаского горизонта ордовика Прибалтики. Описано: 31 вид, из них 10 новых, 7 форм с родовым определением, 2 вида в открытой номенклатуре и 1 новый род.

Голотипы:

Sigmobolbina ? cuneata Abushik.
№ 11/11412. Табл. II, фиг. 6
Podolibolbina podolica.
№ 14/11412. Табл. II, фиг. 9, 10
Oecematobolbina porrecta.
№ 21/11412. Табл. III, фиг. 1
Easchmidtella flexilis.
№ 32/11412. Табл. IV, фиг. 1, 2
Longiscula obliqua.
№ 47/11412. Табл. V, фиг. 13—15
Silenis ? trapeziformis.
№ 50/11412. Табл. V, фиг. 1—3
Medianella turgida.
№ 56/11412. Табл. VII, фиг. 15—18
Pullvillites laevis.
№ 61/11412. Табл. IX, фиг. 1—4
Pullvillites planolateralis.
№ 64/11412. Табл. X, фиг. 1—4
Rectella ? proposita.
№ 70/11412. Табл. VI, фиг. 5—7

42. АНДРЕЕВА О. Н. (колл. № 9073). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Часть 1, 1960, с. 286—298, 3 пал. табл.

Описано 8 новых видов ордовикских брахиопод Урала и Мугоджар, 1 новый подвид и 3 новых рода.

Голотипы:

Iphidella alimbetica Andreeva.
№ 1/9073. Табл. 72, фиг. 1
Billingsella akbulakensis Andr.
№ 2/9073. Табл. 72, фиг. 2
Altorthis kinderlensis.
№ 13/9073. Табл. 73, фиг. 1
Archaeorthis (?) *puerulus.*
№ 20/9073. Табл. 73, фиг. 8
Tritoechia lermontovae (Lessnikova).
№ 8/9073. Табл. 72, фиг. 8
Alimbella armata Andreeva.
№ 33/9073. Табл. 74, фиг. 1
Alimbella armata pagaensis.
№ 45/9073. Табл. 74, фиг. 13
Medessia uralica.
№ 23/9073. Табл. 73, фиг. 11
Imbricata lessnikovae.
№ 50/9073. Табл. 74, фиг. 18

43. АНДРЕЕВА О. Н. (колл. № 11865). Среднеордовикские брахиоподы Тувы и Алтая. Палеонт. журн. № 2, 1982, с. 52—61, 2 пал. табл.

Описано 6 новых видов, 2 из которых типовые виды 2-х новых родов.

Голотипы:

Orthambonites tuvensis Andreeva.
№ 1/11865. Табл. III, фиг. 1
Orthambonites tuloica And.
№ 9/11865. Табл. III, фиг. 6
Malinella tavelensis.
№ 20/11865. Табл. III, фиг. 15
Tuvinia radiata.
№ 30/11865. Табл. III, фиг. 20
Paurorthis altaica.
№ 40/11865. Табл. IV, фиг. 2
Oxoplecia njukensis.
№ 54/11865. Табл. IV, фиг. 14

44. АНДРЕЕВА О. Н. (колл. № 11865). Среднеордовикские брахиоподы и трилобиты Тувы и Алтая. Палеонт. журн. № 2, 1985, с. 38—61, 2 пал. табл.

Описано 9 видов брахиопод, из которых 8 новых и 2 новых рода.

Голотипы:

Isophragma orientale Andreeva.
№ 63/11865. Табл. IV, фиг. 1
Ujukites altaicus And.
№ 70/11865. Табл. IV, фиг. 7
Ujukites tarlykensis.
№ 78/11865. Табл. IV, фиг. 13
Ingria malinovensis.
№ 85/11865. Табл. IV, фиг. 20
Carolinites spinosus.
№ 91/11865. Табл. V, фиг. 1
Lonchodomas eximius.
№ 97/11865. Табл. V, фиг. 6
Ampyxella clavata.
№ 101/11865. Табл. V, фиг. 10
Malinaspis tuvaensis.
№ 107/11865. Табл. V, фиг. 14

45. БАЛАШОВ З. Г. (колл. № 9134). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Часть II, 1960, с. 123—136, 7 пал. табл.

Описано 10 новых видов ордовикских головоногих, 6 из которых относятся к новому роду.

Голотипы:

Talassoceras kumyschtagense Balaschov.
№ 10/9134. Табл. 29, фиг. 1
Eothinoceras marchense Bal.
№ 7/9134. Табл. 26, фиг. 1
Anthoceras angarense.
№ 9/9134. Табл. 26, фиг. 2
Anthoceras bajkitense.
№ 8/9134. Табл. 27, фиг. 1
Tallinoceras lasnamaense.
№ 19/9134 (7/9134). Табл. 31, фиг. 1
Intejoceras angarense.
№ 12/9134. Табл. 27, фиг. 2
Evencoceras angarense.
№ 3/9134. Табл. 28, фиг. 1
Evencoceras rozhcovense.
№ 5/9134. Табл. 32, фиг. 3
Padunoceras rugosaeforme.
№ 16/9134. Табл. 30, фиг. 1, 2
Ellinoceras septicurvatum.
№ 1/9134. Табл. 32, фиг. 1

46. БАЛАШОВ З. Г. (колл. № 9135). Наутилоидеи ордовика Сибирской платформы. ЛГУ, 1962, 205 с., 52 пал. табл.

Рассмотрено 3 основных комплекса головоногих из трех отделов ордовика, дана таблица распределения видов по ярусам, отмечено, что по изученному комплексу наутилоидей Сибирская платформа близка к Тихоокеанской палеозоогеографической провинции. Описано 98 видов, из них 7 в открытой номенклатуре и 63 новых, 1 новый подвид и 5 новых родов.

Голотипы:

Ellesmeroceras tchunense Balaschov.
№ 2/9135 (889/9135). Табл. II, фиг. 6
Albertoceras amplicameratum Bal.
№ 10/9135 (879/9135). Табл. III, фиг. 5
Clarkoceras angarense.
№ 14/9135 (769/9135). Табл. V, фиг. 6
Protocycloceras krivolukense.
№ 22/9135 (918/9135). Табл. XXXIX, фиг. 5
Protocycloceras mancum.
№ 23/9135 (916/9135). Табл. XXXIX, фиг. 1
Catoraphiceras carpyschevi.
№ 25/9135 (816/9135). Табл. III, фиг. 4
Proterocameroceras bajkitense.
№ 34/9135 (783/9135). Табл. V, фиг. 4
Proterocameroceras delgejense.
№ 36/9135 (787/9135). Табл. I, фиг. 1
Proterocameroceras vichorevense.
№ 38/9135 (898/9135). Табл. VII, фиг. 2
Proterocameroceras tunguskense.
№ 40/9135 (897/9135). Табл. VII, фиг. 1
Anthoceras sibiricum.
№ 41/9135 (799/9135). Табл. III, фиг. 1
Lobendoceras asiaticum.
№ 42/9135 (613/9135). Табл. III, фиг. 2
Mcqueenoceras ? chantajkense.
№ 49/9135 (792/9135). Табл. V, фиг. 11
Manchuroceras asiaticum.
№ 51/9135 (840/9135). Табл. X, фиг. 1
Kotoceras stolbovense.
№ 57/9135 (418/9135). Табл. XXVII, фиг. 2
Kawasakiceras boreale.
№ 59/9135 (408/9135). Табл. XXIII, фиг. 5
Vaginoceras sibiricum.
№ 62/9135 (912/9135). Табл. IX, фиг. 3
Vaginoceras ventrolobatum.
№ 63/9135 (757/9135). Табл. XL, фиг. 2
Endoceras kulumbekense.
№ 70/9135 (810/9135). Табл. XLIV, фиг. 1
Endoceras rozhkovense.
№ 71/9135 (870/9135). Табл. XL, фиг. 1

Endoceras viluense.
№ 72/9135 (835/9135). Табл. XLVIII, фиг. 4
Endoceras njuense.
№ 78/9135 (954/9135). Табл. XII, фиг. 3
Endoceras tytchanense.
№ 80/9135 (843/9135). Табл. XII, фиг. 1
Endoceras angarense.
№ 82/9135 (865/9135). Табл. VIII, фиг. 2
Endoceras mangaseense.
№ 84/9135 (850/9135). Табл. XVI, фиг. 1
Rossicoceras njuense.
№ 87/9135 (828/9135). Табл. VIII, фиг. 1
Cyclendoceras viluense.
№ 88/9135 (916/9135). Табл. LII, фиг. 1
Kutorgoceras compressum.
№ 90/9135 (747/9135). Табл. XIX, фиг. 1
Bajkaloceras angarense.
№ 92/9135 (657/9135). Табл. L, фиг. 2
Bajkaloceras centrale.
№ 93/9135 (861/9135). Табл. IX, фиг. 1
Bajkaloceras rozhkovense.
№ 95/9135 (872/9135). Табл. LI, фиг. 2
Ackinoceras kusmovkense.
№ 99/9135 (101/9135). Табл. XVII, фиг. 1
Actinoceras ? problematicum.
№ 100/9135 (226/9135). Табл. XXI, фиг. 1
Actinoceras arbakuntchense.
№ 101/9135 (233/9135). Табл. XXXI, фиг. 1
Metactinoceras tchunense.
№ 111/9135 (265/9135). Табл. XLII, фиг. 1
Metactinoceras conditum.
№ 113/9135 (754/9135). Табл. XIV, фиг. 1
Metactinoceras boreale.
№ 115/9135 (231/9135). Табл. XXVIII, фиг. 1
Metactivoceras enisseense.
№ 117/9135 (236/9135). Табл. XXXIV, фиг. 1
Metactinoceras siphoexcentricum.
№ 119/9135 (749/9135). Табл. XIV, фиг. 2
Ormoceras kusmovkense.
№ 129/9135 (189/9135). Табл. XXXVI, фиг. 3
Ormoceras anomalum.
№ 130/9135 (269/9135). Табл. XXXVI, фиг. 2
Ormoceras tunguskense.
№ 131/9135 (152/9135). Табл. XLII, фиг. 2
Tunguskoceras stolbovense.
№ 139/9135 (13/9135). Табл. XXXI, фиг. 4
Tunguskoceras centrale.
№ 140/9135 (8/9135). Табл. XXXIII, фиг. 4

Tunguskoceras sifoexcentricum.
№ 141/9135 (755/9135). Табл. XIII, фиг. 4
Tunguskoceras viluense.
№ 142/9135 (882/9135). Табл. XIII, фиг. 1
Kokujoceras simmetricum.
№ 145/9135 (66/9135). табл. XXII, фиг. 1
Kokujoceras anomalum.
№ 151/9135 (76^{а}/9135). Табл. XXIII, фиг. 2
Kokujoceras depressum.
№ 153/9135 (76^{б}/9135). Табл. XXII, фиг. 5
Stolbovoceras boreale.
№ 156/9135 (25/9135). Табл. XXIV, фиг. 4
Armenoceras evenkense.
№ 163/9135 (307/9135). Табл. XXIX, фиг. 2
Armenoceras gurjevskense.
№ 166/9135 (226/9135). Табл. XXI, фиг. 2
Armenoceras solenense.
№ 168/9135 (268/9135). Табл. XXV, фиг. 1
Armenoceras lenaense.
№ 169/9135 (294/9135). Табл. XXIV, фиг. 1
Armenoceras sibiricum.
№ 171/9135 (83/9135). Табл. XIII, фиг. 5
Armenoceras stolbovense.
№ 177/9135 (228/9135). Табл. XXXVII, фиг. 1
Sactoceras stolbovense.
№ 184/9135 (919/9135). Табл. XXXIX, фиг. 6
Sactoceras artassense.
№ 187/9135 (285/9135). Табл. XXXVIII, фиг. 1
Mysterioceras tunguskense.
№ 194/9135 (138/9135). Табл. XXVII, фиг. 3
Tofangoceras tunguskense.
№ 196/9135 (214/9135). Табл. XXXI, фиг. 2
Richardsonoceras nikiforovae.
№ 199/9135 (807/9135). Табл. XLVI, фиг. 5
Hemibeloitoceras ellipsoidale.
№ 200/9135 (132/9135). Табл. XVIII, фиг. 1
Hemibeloitoceras ellipsoidale nujense.
№ 201/9135 (133/9135). Табл. XVIII, фиг. 2
Tarphyceras (?) *excentricum.*
№ 205/9135 (458/9135). Табл. XLVI, фиг. 4

47. БАЛАШОВ З. Г. (колл. № 8718). Некоторые наутилоидеи, эндоцератоидеи и актиноцератоидеи ордовика северо-востока СССР. Уч. зап. НИИГА, вып. 6, 1964, с. 12—71, 6 пал. табл.
Описано 33 рода, из них 10 в открытой номенклатуре и 1 вариетет. Новых видов 12 и 1 новый род.

Голотипы:

Kotoceras indigirkense Balaschov.
№ 5/8718. Табл. II, фиг. 6
Rossicoceras kolymense Bal.
№ 6/8718. Табл. III, фиг. 1
Cyrtactinoceras kolymense.
№ 21/8718. Табл. II, фиг. 1
Deiroceras kolymense.
№ 25/8718. Табл. V, фиг. 3
Magadanoceras yasatschnense.
№ 26/8718. Табл. V, фиг. 4
Michelinoceras omulevskense.
№ 31/8718. Табл. I, фиг. 8
Stereoplasmocerina pseudoseptata.
№ 37/8718. Табл. I, фиг. 12
Tofangocerina kolymika.
№ 41/8718. Табл. IV, фиг. 14
Tofangocerina submarginale.
№ 43/8718. Табл. IV, фиг. 5
Tofangocerina omulevka.
№ 44/8718. Табл. IV, фиг. 2
Valcouroceras yasatschnense.
№ 47/8718. Табл. VI, фиг. 2
Trochoceras ? *chekandiense.*
№ 48/8718. Табл. III, фиг. 2

48 БАЛАШОВА Е. А. (колл. № 8153). Средне- и верхнеордовикские и нижнесилурийские трилобиты Восточного Таймыра и их стратиграфическое значение. Сб. статей по палеонт. и биострат., вып. 14, НИИГА, 1959, с. 17—47, 6 пал. табл.

Статья содержит описание трилобитов 4-х семейств и является первой из серии статей с продолжением описаний единой коллекции. Всего описан 1 новый род, 9 видов, из них 6 новых, 3 вариетета, из них 2 новых, 2 формы в открытой номенклатуре и 2 с родовыми определениями.

Голотипы:

Taimyraspis taimyrica Balashova.
№ 5/8153. Табл. VI, фиг. 5
Caphyra (?) *kluevkaensis.*
№ 13/8153. Табл. I, фиг. 1
Isoteloides homalonotoides var. *taimyrica.*
№ 22/8153. Табл. II, фиг. 4
Isoteloides kimmswickensis var. *nordica.*
№ 23/8153. Табл. II, фиг. 14
Homotelus taimyricus.
№ 27/8153. Табл. II, фиг. 18

Homotelus pregradnicus.
№ 30/8153. Табл. II, фиг. 10
Vogdesia nordica.
№ 32/8153. Табл. II, фиг. 32

49. БАЛАШОВА Е. А. (колл. № 8153). Средне- и верхнеордовикские и нижнесилурийские трилобиты Восточного Таймыра и их стратиграфическое значение. Сб. статей по палеонт. и биострат., вып. 15, НИИГА, 1959, с. 27—55.

В работе описано 1 новое подсемейство, 1 новый род, 14 видов, из них 8 новых, 1 новый вариетет и 1 форма с родовым определением.

Голотипы и синтипы:

Scutellum taimyricum Balashova.
№ 36/8153. Табл. I, фиг. 10
Bronteopsis nannus.
№ 42/8153. Табл. V, фиг. 18
Goldillaenoides taimyricus.
№ 43/8153. Табл. I, фиг. 8
Stenopareia borealica.
№ 63/8153. Табл. III, фиг. 17
Bumastus holei var. *taimyrica.*
№ 66/8153. Табл. III, фиг. 20
№ 67/8153. Табл. III, фиг. 21
№ 68/8153. Табл. III, фиг. 22
Bumastus nordicus.
№ 69/8153. Табл. III, фиг. 30
Bumastus taimyricus.
№ 70/8153. Табл. III, фиг. 23
Tetralichas taimyricus.
№ 77/8153. Табл. I, фиг. 5
Calymene taimyrica.
№ 79/8153. Табл. I, фиг. 11

50. БАЛАШОВА Е. А. (колл. № 8153). Средне- и верхнеордовикские и нижнесилурийские трилобиты Восточного Таймыра и их стратиграфическое значение. Сб. статей по палеонт. и биострат., вып. 17, НИИГА, 1959, 40 с.

В продолжении ранее опубликованных работ содержится описание трилобитов 6 семейств. Всего 26 видов, из них 19 новых и 2 вариетета, голотипы которых не выделены.

Голотипы и синтипы:

Calliops taimyricus Balashova.
№ 83/8153. Табл. V, фиг. 9
Monorakos (?) *nordicus.*
№ 89/8153. Табл. IV, фиг. 3
Monorakos zlobini.
№ 91/8153. Табл. IV, фиг. 1

Evenkaspis norilskiensis.
№ 95/8153. Табл. IV, фиг. 17
Ceratevenkaspis parnaicus.
№ 96/8153. Табл. IV, фиг. 14
Ceratevenkaspis pentagonus.
№ 97/8153. Табл. IV, фиг. 7
Ceratevenkaspis taimyricus.
№ 99/8153. Табл. IV, фиг. 9
Ceratevenkaspis borealicus.
№ 103/8153. Табл. IV, фиг. 12
Carinopyge spinifera.
№ 104/8153. Табл. IV, фиг. 18
Ceraurinus nordicus.
№ 107/8153. Табл. V, фиг. 2
Ceraurunus borealicus.
№ 108/8153. Табл. III, фиг. 31; табл. V, фиг. 22
Ceraurinus taimyricus.
№ 109/8153. Табл. V, фиг. 3
Ceraurinus kluevkaensis.
№ 112/8153. Табл. V, фиг. 7
Sphaerexochus taimyricus.
№ 115/8153. Табл. V, фиг. 8
Aristoharpes taimyricus.
№ 116/8153. Табл. V, фиг. 20
Lonchodomas rostratus var. *taimyrica.*
№ 118/8153. Табл. VI, фиг. 6
№ 119/8153. Табл. VI, фиг. 7
Ampyx depressus var. *otradnica.*
№ 120/8153. Табл. I, фиг. 20
№ 121/8153. Табл. I, фиг. 21
№ 122/8153. Табл. I, фиг. 22
№ 123/8153. Табл. I, фиг. 23
Ampyx nordicus.
№ 124/8153. Табл. VI, фиг. 1
Ampyx borealicus.
№ 129/8153. Табл. VI, фиг. 8
Ampyxina taimyrica.
№ 131/8153. Табл. VI, фиг. 10
Raymondella nordica.
№ 136/8153. Табл. VI, фиг. 15

51. БЕРГЕР А. Я. (колл. № 10080). И. Ф. НИКИТИН, А. Я. БЕРГЕР. О находке остатков крупных тентакулид в отложениях верхнего ордовика Казахстана. Ежег. ВПО, т. XXXII, 1989, с. 299—302, 1 пал. табл.
Всего 1 новый вид тентакулид.

Голотип:

Costatulites magnus Berger.
№ 1/10080. Табл. I, фиг. 1

52. БОНДАРЕВ В. И., БУРСКИЙ А. З., КОЛОСКОВ К. Н., НЕХОРОШЕВА Л. В. (колл. № 8864). Раннеордовикская фауна юга Новой Земли и севера Пай-Хоя и ее стратиграфическое значение. Ученые зап. НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 10, 1966, с. 15—64.

Описано 10 видов брахиопод, из них 6 новых, 6 видов трилобитов и 1 форма с родовым определением, 1 вид мшанок. В коллекции 1 новый вид мшанок, трилобитов и 5 видов брахиопод.

Голотипы:

Nicholsonella nelidovi L. Nekhorosheva.
№ 75а, б/8864. Табл. II, фиг. 1
Angarella laevis Koloskov.
№ 18/8864. Табл. VI, фиг. 6
Angarella plana.
№ 9/8864. Табл. V, фиг. 1
Polytoechia planidorsata V. Bondarev.
№ 20/8864. Табл. VII, фиг. 2
Clarkella sokolyna V. Bond.
№ 37/8864 (38/8864). Табл. VIII, фиг. 4
Triseptata nelidovi.
№ 28/8864. Табл. VII, фиг. 10
Plimeroides defensus Burskyi.
№ 60/8864. Табл. X, фиг. 2

53. БОНДАРЕВ В. И. (колл. № 9719). Стратиграфия и характерные брахиоподы ордовикских отложений юга Новой Земли, острова Вайгач и Северного Пай-Хоя. В сб.: «Стратиграфия, условия осадконакопления и фауна ордовикских и нижнедевонских отложений Новой Земли, Вайгача и Пай-Хоя». Тр. НИИГА, т. 157, 1968, с. 3—122, 13 пал. табл.

Описано 22 вида, из них 2 в открытой номенклатуре, 1 форма с родовым определением, 3 подвида. Новых видов 12, в коллекции 11. Проведенные исследования позволили составить фаунистически обоснованную стратиграфическую схему ордовикских отложений.

Голотипы:

Platystrophia pseudocostata V. Bondarev.
№ 8/9719. Табл. I, фиг. 1
Platystrophia dentata trigonalis V. Bond.
№ 12/9719. Табл. II, фиг 6
Platystrophia rhynchonelliformis polaris.
№ 15/9719. Табл. II, фиг. 5

Platystrophia lynx jugorensis.
№ 16/9719. Табл. II, фиг. 9
Orthambonites plana.
№ 21/9719. Табл. I, фиг. 1
Vellamo antiqua.
№ 29/9719. Табл. III, фиг. 7
Vellamo medina.
№ 32/9719. Табл. IV, фиг. 2
Vellamo (?) *summa.*
№ 40/9719. Табл. IV, фиг. 9
Stenocamara djakonovi.
№ 49/9719. Табл. VI, фиг. 12
Oxoplecia acutangula.
№ 56/9719. Табл. XIII, фиг. 3
Bimuria longa.
№ 106/9719. Табл. XI, фиг. 5

54. БОРИСЯК М. А. (колл. № 9131). Материалы по палеонтологии. Новые семейства и роды. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., вып. 12, 1956, с. 50—52.

Описан 1 новый вид брахиопод, относящийся к новому роду из верхнего ордовика Казахстана.

Голотип:

Kassinella globosa M. Borissiak.
№ 1/9131. Табл. XII, фиг. 1

55. БУРСКИЙ А. З. (колл. № 8938). Семейство *Remopleurididae* из ордовика севера Пай-Хоя, острова Вайгач и юга Новой Земли. Ученые зап. НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 12, 1966, с. 30—45, 2 пал. табл.

Описано 4 вида трилобитов, принадлежащих одному семейству. Новых вида 2.

Голотипы:

Eorobergia inferius Burskyi.
№ 9/8938. Табл. I, фиг. 1
Eorobergia summa.
№ 14/8938. Табл. II, фиг 1

56. БУРСКИЙ А. З. (колл. № 8939). *Encrinuridae* из ордовикских отложений севера Пай-Хоя и острова Вайгач. Ученые зап. НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 11, 1966, с. 79—84, 1 пал. табл.

Описаны остатки головных и хвостовых щитов трилобитов двух видов, один из них новый.

Голотип:

Encrinuroides waigatschensis Burskyi.
№ 1/8939. Табл. I, фиг. 5

57. БУРСКИЙ А. З. (колл. № 9603). Семейство *Lichidae* из ордовикских отложений Вайгача и Северного Пай-Хоя. Уч. зап. НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 13, 1966, с. 43—66, 4 пал. табл.

Описано 5 видов трилобитов и 1 форма с родовым определением. Новый вид 1.

Голотип:

Conolichas acerbigranum Burskyi.
№ 9/9603. Табл. II, фиг. 5

58. БУРСКИЙ А. З. (колл. № 9649). Семейство *Raphiophoridae* и *Pterygometopidae* из ордовикских отложений севера Пай-Хоя и острова Вайгач. Ученые зап. НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 16, 1996, с. 8—21, 2 пал. табл.

Описано 4 вида трилобитов, из них 3 новых и 1 в открытой номенклатуре, 2 формы с родовым определением.

Голотипы:

Lonchodomas triangulum Burskyi.
№ 5/9649. Табл. I, фиг. 12, 13
Lonchodomas parvulus.
№ 10/9649. Табл. I, фиг. 19
Calyptaulax breviocolus.
№ 17/9649. Табл. II, фиг. 7

59. БУРСКИЙ А. З. (колл. № 9751). Трилобиты югорского горизонта (средний ордовик) севера Пай-Хоя и Вайгача. Ученые записки НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 17, 1967, с. 27—51, 2 пал. табл.

Описано 4 вида трилобитов и 11 форм с родовым определением. Новых видов 2.

Голотипы:

Glaphurina trapezialis Burskyi.
№ 1/9751. Табл. I, фиг. 1—3
Stenopareia jugorskii.
№ 4/9751. Табл. I, фиг. 12, 13

60. ВОСТОКОВА В. А. (колл. № 9334). Ордовикские и силурийские гастроподы Сибирской платформы. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 75: «Биостратиграфия палеозоя Сибирской платформы. Ордовик и силур». Вып. 4, 1962, с. 3—45, 5 пал. табл.

Описано 22 вида, из них 17 в открытой номенклатуре, 2 вариетета, 8 форм в открытой номенклатуре. Новый вид 1.

Голотип:

Bellerophon sibiricum Vostokova.
№ 11/9334. Табл. V, фиг. 9

61. ВОСТОКОВА В. А. (колл. № 8719). Гастроподы ордовикских отложений Северо-Востока СССР. Ученые записки НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 5, 1964, с. 57—77, 4 пал. табл.

Описано 15 видов, из них 11 в открытой номенклатуре, 2 вариетета, 2 формы с родовым определением. Новых вида 3 и 2 новых рода.

Голотипы:

Omulevia oradovskaiae Vostokova.
№ 8/8719. Табл. I, фиг. 4
Raramaclurites ovalis.
№ 13/8719. Табл. III, фиг. 1
Paramaclurites gravis.
№ 14/8719. Табл. IV, фиг. 1

62. ЕЛТЫШЕВА Р. С., СТУКАЛИНА Г. А. (колл. № 8444). Стебли ордовикских и нижнесилурийских криноидей Центрального Таймыра, Новой Земли и Вайгача. Уч. зап. НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 2, 1963, с. 23—62, 4 пал. табл.

Анализ стратиграфического распределения криноидей позволил авторам наметить определенные комплексы для горизонтов среднего и верхнего ордовика и нижнего силура. Описано 22 вида, из них 12 новых, 1 новое семейство и 2 новых рода.

Голотипы:

Obuticrinus bullosus Yeltyschèva et Stukalina.
№ 10/8444. Табл. II, фиг. 10
Pentagonopentagonalis tscherkesovae.
№ 22/8444. Табл. II, фиг. 24
Pentagonopentagonalis quindecemlobatus.
№ 24/8444. Табл. I, фиг. 20
Pentagonopentagonalis ramosus.
№ 25/8444. Табл. I, фиг. 4
Pentagonopentagonalis concinnus.
№ 27/8444. Табл. I, фиг. 1
Pentagonopentagonalis hrustalnjensis.
№ 30/8444. Табл. I, фиг. 8
Pentagonopentagonalis bondarewi.
№ 31/8444. Табл. I, фиг. 13
Pentagonopentagonalis proximus.
№ 38/8444. Табл. III, фиг. 4
Pentagonocyclicus tenuitas.
№ 42/8444. Табл. IV, фиг. 4
Pentagonocyclicus tajmirensis.
№ 45/8444. Табл. I, фиг. 6
Tetragonotetragonalis quadrihamatus.
№ 47/8444. Табл. II, фиг. 22
Trigonocyclicus vajgatschensis.
№ 49/8444. Табл. II, фиг. 20

63. ЕЛТЫШЕВА Р. С. (колл. № 11695). Стебли палеозойских морских лилий Прибалтики (верхний ордовик). Вопр. палеонт., т. VIII, 1979, с. 94—106, 2 пал. табл.
Описано 23 вида, из них 20 новых.

Голотипы:

Iocrinus vostokovae Yeltyscheva.
№ 1/11695. Табл. II, фиг. 3
Iocrinus männili Yelt.
№ 3/11695. Табл. II, фиг. 1
Iocrinus wesenbergensis.
№ 4/11695. Табл. I, фиг. 1
Desmidocrinus piriensis.
№ 7/11695. Табл. II, фиг. 15
Bystrowicrinus primarius.
№ 8/11695. Табл. I, фиг. 5
Bystrowicrinus parvirugosus.
№ 9/11695. Табл. I, фиг. 4
Dentiferocrinus visendus.
№ 10/11695. Табл. I, фиг. 17
Dentiferocrinus vermiculatus.
№ 11/11695. Табл. I, фиг. 15
Dentiferocrinus pirguensis.
№ 13/11695. Табл. II, фиг. 12
Dentiferocrinus wychmaensis.
№ 14/11695. Табл. I, фиг. 3, 6
Cyclopagoda anulata.
№ 15/11695. Табл. I, фиг. 13
Cyclopagoda alikhovae.
№ 16/11695. Табл. II, фиг. 10
Cyclopagoda tubuliforma.
№ 18/11695. Табл. II, фиг. 14
Cyclomonile denticulata.
№ 22/11695. Табл. II, фиг. 5
Apiastrum unicum.
№ 24/11695. Табл. I, фиг. 16
Acanthodocrinus rakverensis.
№ 25/11695. Табл. I, фиг. 6
Acanthodocrinus magnispinosus.
№ 27/11695. Табл. I, фиг. 12
Porcunicrinus probatus.
№ 28/11695. Табл. I, фиг. 8
Dwortsowaecrinus tapaensis.
№ 29/11695. Табл. I, фиг. 9
Malovicrinus janischewskii.
№ 32/11695. Табл. II, фиг. 9

64. ЕЛТЫШЕВА Р. С. (колл. № 11018). Криноидеи пограничных слоев ордовика Подолии (*Columnas* — стебли морских лилий).

Вопр. палеонтол., т. VII, «Фауна пограничных отложений О—S Подолии» ЛГУ, 1975, с. 124—142, 2 пал. табл.

Описано 12 видов криноидей, из них 11 новых, в коллекции 10 и 1 новый подвид.

Голотипы:

Desmidocrinus turgidus Yeltyscheva.
№ 2/11018. Табл. II, фиг. 10
Gliptocrinus elegans jaani Yelt.
№ 11/11018. Табл. II, фиг. 4
Exaesiodiscus molodovensis.
№ 17/11018. Табл. I, фиг. 12
Kstutocrinus primus.
№ 18/11018. Табл. II, фиг. 16
Dentiferocrinus coronoideus.
№ 26/11018. Табл. I, фиг. 8
Dentiferocrinus miscellus.
№ 28/11018. Табл. I, фиг. 3
Pentagonocyclicus subhelenae.
№ 31/11018. Табл. I, фиг. 25
*Cyclocyclicus raikk*ülaensis.
№ 35/11018. Табл. I, фиг. 15
Tarticrinus verrucosus.
№ 36/11018. Табл. II, фиг. 22
Particrinus demshinensis.
№ 38/11018. Табл. II, фиг. 24
Cyclocyclicus fastigatus.
№ 40/11018. Табл. II, фиг. 9

65. ЕРИНА М. В. (колл. № 10472). Ругозы. В сб.: «Пограничные слои ордовика и силура Алтае-Саянской области и Тянь-Шаня». Тр. Сиб. отд. АН СССР, вып. 397, 1978, с. 64—74.

Описано 12 видов ругоз, из них 6 новых, один из которых отнесен к новому роду.

Голотипы:

Crassilasma digitiforme Erina.
№ 7а—в/10472. Табл. VIII, фиг. 2
Sogdianophyllum crassiseptatus.
№ 10а—г/10472. Табл. IX, фиг. 2
Calostylis laevis.
№ 14а/10472. Табл. IX, фиг. 6
Sumsarophyllum ellipsoidum.
№ 16а, б/10472. Табл. X, фиг. 1
Cantrillia archalykia.
№ 17а/10472. Табл. X, фиг. 2
Lamellophyllum bitecum.
№ 20а, б/10472. Табл. XI, фиг. 1

66. ЖИЖИНА М. С. (колл. № 8960). Некоторые ордовикские табуляты Восточного Таймыра. Сб. статей по геологии Арктики. Вып. 6, Тр. НИИГА, т. 89, 1956, с. 91—116, 10 пал. табл.

Приведены сведения о распространении ордовика на В. Таймыре и найденных здесь кораллах, описано 8 видов и 2 вариетета. Новых видов 5, 1 новый вариетет.

Голотипы:

Palaeohalysites tollinoides Zhizhina.
№ 15/8960. Табл. V, фиг. 1; табл. VI, фиг. 2
Palaeohalysites parallelus var *minor.*
№ 17/8960. Табл. VII, фиг. 2
Palaeohalysites tarejensiformis.
№ 18/8960. Табл. VII, фиг. 1
Tetradium subapertum.
№ 19/8960. Табл. VIII, фиг. 1
Tetradium quadratum.
№ 20/8960. Табл. IX, фиг. 1
Tetradium elegans.
№ 23/8960. Табл. IV, фиг. 2

67. ЖИЖИНА М. С. (колл. № 8742). Новый вид *Cyrtophyllum* из верхнего ордовика Таймыра. Уч. зап. НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 7, 1965, с. 37—39, 1 пал. табл.

Описан 1 новый вид табулят, характеризующийся присутствием пузырчатой ткани внутри кораллитов.

Голотип:

Cyrtophyllum anomalus Zhizhina.
№ 2, 2а, б/8742. Табл. I, фиг. 1

68. ЖИЖИНА М. С. (колл. № 8742). Табуляты ордовика Таймыра. Уч. записки НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 10, 1965, с. 64—78, 4 пал. табл.

Описано 8 видов одного рода, из них 6 новых; приведена схема сопоставления комплексов табулят из отложений ряда районов Таймыра.

Голотипы:

Nyctopora canaliculata Zhizhina.
№ 5, 5а, б/8742. Табл. II, фиг. 2
Nyctopora convexotabulata.
№ 6, 6а, б/8742. Табл. III, фиг. 1
Nyctopora concavotabulata.
№ 7, 7а, б/8742. Табл. III, фиг. 2
Nyctopora costata.
№ 8, 8а, б/8742. Табл. III, фиг. 3; табл. IV, фиг. 1
Nyctopora granulomuralis.
№ 9, 9а, б/8742. Табл. IV, фиг. 2

Nyctopora vulgaris.
№ 10а, б/8742. Табл. I, фиг. 2

69. ЖИЖИНА М. С. (колл. № 8742). Тетрадииды Вайгача и Таймыра. Уч. записки НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 13, 1966, с. 5—16, 3 пал. табл.
Описано 7 видов табулят одного рода, из них 4 вида новых и для 1 вида новая форма.

Голотипы:

Rhabdotetradium vaigatschensis Zhizhina.
№ 16а, б/8742. Табл. I, фиг. 4
Rhabdotetradium rhomboidalis.
№ 17, 17а/8742. Табл. I, фиг. 2
Rhabdotetradium ? tessulatus.
№ 20, 20а—г/8742. Табл. II, фиг. 1
Rhabdotetradium ? tessulatiformis.
№ 21, 21а, б/8742. Табл. II, фиг. 2

70. КОВАЛЕВСКИЙ О. П. (колл. № 8257, 9316). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. II, ч. II, 1968, с. 11—13.
Описано 3 новых вида табулят и гелиолитид.

Голотипы:

Lyopora nikitini Kovalevsky.
№ 1/8257. Табл. 2, фиг. 1
Proheliolites koskolensis Koval.
№ 2/8257. Табл. 3, фиг. 1
Propora obrutschewi.
№ 103/9316. Табл. 3, фиг. 2

71. КОВАЛЕВСКИЙ О. П. (колл. № 12083). Род *Kolymopora (Tabulata)* в Казахстане. Ежег. ВПО, т. XXVI, 1983, с. 71—76, 1 пал. табл.
Описан 1 новый вид рода *Kolymopora Preobr.*, представители которого ранее известны только из позднего ордовика р. Колымы.

Голотип:

Kolymopora antiqua Kovalevsky.
№ 1/12083. Табл. I, фиг. 1

72. КОЛОБОВА И. М. (колл. № 10542). Трилобиты. В сб.: Пограничные слои ордовика и силура Алтае-Саянской области и Тянь-Шаня. Тр. Сиб. отд. АН СССР, вып. 397, «Наука», 1978, с. 126—144.
Описано 17 видов, из них 8 новых.

Голотипы:

Otarion simplex Kolobova.
№ 18/10542. Табл. XXIV, фиг. 11

Pseudosphaerexochus asiaticus.
№ 11/10542 (41/10542). Табл. XXV, фиг. 10
Synchomalonotus sulcatus.
№ 60/10542. Табл. XXVI, фиг. 11
Calymenia whittingtoni.
№ 65/10542. Табл. XXVII, фиг. 1
Pharostoma inermis.
№ 72/10542. Табл. XXVII, фиг. 10
Calliops kimi.
№ 81/10542. Табл. XXVIII, фиг. 1
Uralichas schachriomonica.
№ 94/10542. Табл. XXVIII, фиг. 9
Dicranopeltis eopolytomus.
№ 111/10542. Табл. XXIX, фиг. 1

73. КОЛОБОВА И. М. (колл. № 10098). *Granulatagnostus* — новый род трилобитов из ордовика Казахстана. Ежег. ВПО, т. XXIV, 1981, с. 257—260.
Описан 1 новый вид трилобитов, отнесенный к новому роду.

Голотип:

Granulatagnostus granulatus Kolobova.
№ 1/10098. Рис. 1

74. КОЛОБОВА И. М. (колл. № 12301). О новом рафиороридном роде трилобитов из среднего ордовика Казахстана. Ежег. ВПО, т. XXVIII, 1985, с. 168—175, 1 пал. табл.
Описан 1 новый вид трилобитов, отнесенный к новому роду.

Голотип:

Čaganaspis unica Kolobova.
№ 1/12301. Табл. I, фиг. 1

75. КОЛОБОВА И. М. (колл. № 12722). КЛИШЕВИЧ В. Л., КОЛОБОВА И. М. К обоснованию возраста толукской серии (Северный Тянь-Шань). Ежег. ВПО, т. XXXIII, 1990, с. 219—235, 3 пал. табл.
Описано 3 вида трилобитов, из них 2 новых и 1 форма с родовым определением. Приведена подробная литологическая и палеонтологическая характеристика выделенных подразделений.

Голотипы:

Porterfieldia spinosa Kolobova.
№ 18/12722 (12722/18). Табл. III, фиг. 3
Porterfieldia delicata.
№ 8/12722 (12722/8). Табл. II, фиг. 1

76. КОРЕНЬ Т. Н. (колл. № 11565). *Pacificograptus* — новый род позднеордовикских диплограптид. Палеонт. журн. № 1, 1979, с. 69—75, 1 пал. табл.

Описан новый род с типовым видом и 2 подвида, из них 1 новый.

Голотип:

Pacificograptus pacificus kimi Koren.
№ 1/11565. Табл. VIII, фиг. 1

77. КОРЕНЬ Т. Н., МИХАЙЛОВА Н. Ф., ЦАЙ Д. Т. (колл. № 11568). Класс *Graptolothina*. Граптолиты. В сб.: Граница ордовика и силура в Казахстане. Алма-Ата, «Наука» Каз.ССР, 1980, с. 121—169, 21 пал. табл.

Описан 21 вид, из них 6 в открытой номенклатуре и 8 новых видов; 11 подвидов, из них 3 новых и 3 формы с родовым определением.

Голотипы:

Diplograptus modestus primus Mikhaylova.
№ 7/11568 (11568/7). Табл. 33, фиг. 4
Pacificograptus pacificus affinis Koren et Tzaj.
№ 27/11568 (11568/27). Табл. 35, фиг. 1
Climacograptus acceptus Koren et Mikhaylova.
№ 36/11568 (11568/36). Табл. 36, фиг. 1
Climacograptus jideliensis.
№ 51/11568 (11568/51). Табл. 37, фиг. 8
Glyptograptus madernii.
№ 86/11568 (11568/86). Табл. 40, фиг. 7
Glyptograptus ? *ojsuensis.*
№ 106/11568 (11568/106). Рис. 43а — паратип [1)]
Glyptograptus posterus Koren et Tzaj.
№ 152/11568 (11568/152). Табл. 48, фиг. 6
Orthograptus illustris Koren et Mikhaylova.
№ 168/11568 (11568/11). Табл. 51, фиг. 1
Pseudoclimacograptus (Metaclimacograptus) fidus.
№ 178/11568 (11568/178). Табл. 52, фиг. 2
Pseudoclimacograptus (Metaclimacograptus) pictus.
№ 191/11568 (11568/191). Табл. 53, фиг. 1
Plegmatograptus nebula lautus Koren et Tzaj.
№ 197/11568 (11568/197). Табл. 53, фиг. 3

78. ЛЕСОВАЯ А. И. (колл. № 10473). Строматопораты. В сб.: Пограничные слои ордовика и силура Алтае-Саянской области и Тянь-Шаня. Тр. Сиб. отд. АН СССР, вып. 397, 1978, с. 52—57.

Описано 8 видов стропатопорат, из них 1 новый.

[1)] Голотип утерян, паратип выбран авторами.

Голотип:

Ecclimadictyon schachriomonum Lessovaja.
№ 8а/10473. Табл. III, фиг. 1

79. МАКСИМОВА З. А. (колл. № 9202). Класс *Trilobita* — трилобиты. «Полевой Атлас ордовикской и силурийской фауны Сибирской платформы». ВСЕГЕИ, 1955, с. 117—135, 2 пал. табл.

Описано 30 видов трилобитов и 4 формы с родовым определением. Новых видов 14, но для 2-х из них голотипы выделены в работе 1962 г.

Голотипы:

Biolgina brevis Z. Maximova.
№ 135/9202. Табл. VIII, фиг. 2
Homotelus lenaensis Z. Max.
№ 261/9202. Табл. XXI, фиг. 7
Basilicus khamrensis.
№ 222/9202. Табл. XXI, фиг 11
Proetus enodus.
№ 204/9202. Табл. LX, фиг. 6
Ceraurinus biformis.
№ 703/9202. Табл. XXI, фиг. 1
Pliomerops weberi.
№ 681/9202. Табл. VII, фиг. 11
Pliomerops unguis.
№ 678/9202. Табл. VII, фиг. 6
Isalaux bifolius.
№ 551/9202. Табл. XXX, фиг. 3
Carinopyre obscica.
№ 668/9202. Табл. XXX, фиг. 4
Carinopyge fracta.
№ 654/9202. Табл. XXXI, фиг. 3
Carinopyge ensifera.
№ 672/9202. Табл. XXX, фиг. 5
Ermanella unicornis.
№ 155/9202. Табл. XXI, фиг. 12

80. МАКСИМОВА З. А. (колл. № 9202). Трилобиты ордовика и силура Сибирской платформы. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 76, «Биострат. палеозоя Сибирской платформы. Ордовик и силур». Вып. 5, 1962, 176 с., 18 пал. табл.

Рассмотрено значение остатков трилобитов для обоснования отложений, приведен анализ фауны и новые данные по морфологии организмов. Описано 60 видов, из них 7 в открытой номенклатуре, 15 форм с родовым определением. Новых видов 20, в колл. 19.

Голотипы:

Plethopeltides magnus Z. Maximova.
№ 1/9202. Табл. I, фиг. 1

Pseudoacrocephalites ilgaensis Z. Max.
№ 42/9202. Табл. II, фиг. 8
Pseudoacrocephalites viluensis.
№ 73/9202. Табл. II, фиг. 2
Diceratocephalina miranda.
№ 77/9202. Табл. I, фиг. 14
Biolgina sibirica.
№ 105/9202. Табл. III, фиг. 1
Pseudoproetus bellus.
№ 179/9202. Табл. IV, фиг. 11
Pseudoproetus tertius.
№ 200/9202. Табл. IV, фиг. 16
Isotelus maximus sibiricus.
№ 235/9202. Табл. VI, фиг. 5
Eobronteus norilskensis.
№ 319/9202. Табл. VIII, фиг. 2
Stenopareia angulata.
№ 341/9202. Табл. VIII, фиг. 7
Bumastus sibiricus.
№ 367/9202. Табл. IX, фиг. 8
Phacops ? macropygus.
№ 419/9202. Табл. XI, фиг. 3
Eophacops nanus.
№ 497/9202. Табл. XI, фиг. 4
Monorakos morkokensis.
№ 570/9202. Табл. XIV, фиг. 8
Evenkaspis nikiforovae.
№ 614/9202. Табл. XV, фиг. 9
Evenkaspis tchunensis.
№ 637/9202. Табл. XVI, фиг. 9
Parapliomera njuensis.
№ 684/9202. Табл. XVII, фиг. 12
Cybele andreevae.
№ 745/9202. Табл. XVIII, фиг. 6
Encrinurus globosus.
№ 751/9202. Табл. XVIII, фиг. 9
Encrinurus creber.
№ 755/9202. Табл. XVIII, фиг. 12

81. МИРОНОВА М. Г. (колл. № 11668). Позднеордовикские беллерофонтацеи (гастроподы) Казахстана. Вопр. палеонт., т. VIII, 1979, с. 83—94, 2 пал. табл.
Описано 9 видов, из них 5 новых.

Голотипы:

Tremanotus akdombaki Mironova.
№ 7/11668. Табл. I, фиг. 7
Modestospira (?) *plicata* Miron.
№ 9/11668. Табл. I, фиг. 9

Tropidodiscus pseudosecans.
№ 11/11668. Табл. I, фиг. 10
Tetranota dulankarensis.
№ 19/11668. Табл. II, фиг. 9
Kokenospira kasachstanica.
№ 23/11668. Табл. II, фиг. 10

82. МОДЗАЛЕВСКАЯ Е. А. (колл. № 12129). Тропостоматы ордовика Прибалтики и их стратиграфическое значение. Тр. ВНИГРИ, нов. сер., вып. 78, 1953, с. 91—167, 14 пал. табл.
Описано 22 вида, из них 20 новых и 9 новых вариететов. В коллекции 19 новых видов и 4 новых вариетета.

Голотипы:

Prasopora insularis ver. *esthonica.*
№ 1а, б/12129. Табл. I, фиг. 1, 2
Monticuliporella lessnikowae.
№ 2а, б/12129. Табл. I, фиг. 3, 5
Mesotrypa excentrica.
№ 6а/12129. Табл. IV, фиг. 2
Mesotrypa bystrowi.
№ 8а, б/12129. Табл. II, фиг. 1
Mesotrypa bystrowi var. *tuberculata.*
№ 10а, б/12129. Табл. II, фиг. 3, 4
Mesotrypa volchovensis.
№ 13а, б/12129. Табл. III, фиг. 2
Mesotrypa volchovensis var. *torosa.*
№ 15а/12129. Табл. III, фиг. 3, 4
Nekhorosheviella cribrosa.
№ 17а, б/12129. Табл. IV, фиг. 5, 6
Nicholsonella papillaris.
№ 18а—в/12129. Табл. V, фиг. 3
Nicholsonella rotundicellularis.
№ 20а, б/12129. Табл. V, фиг. 4
Nicholsonella rotundicellularis var. *duplex.*
№ 22а, б/12129. Рис. 14
Nicholsonella arborea.
№ 23а—г/12129. Табл. V, фиг. 1—3
Dianulites maculatus.
№ 24а, б/12129. Табл. VII, фиг. 3, 4
Dianulites janischewskyi.
№ 28а—д/12129. Табл. VII, фиг. 5, 6
Dainulites multimesoporicus.
№ 29а, б/12129. Табл. VIII, фиг. 5, 6
Dianulites magnicellularis.
№ 30а—д/12129. Табл. IX, фиг. 1
Esthoniopora clivosa.
№ 32а—в/12129. Табл. X, фиг. 3—5

Esthenioporella crassimuralis.
№ 33а, б/12129. Табл. X, фиг. 1, 2
Lioclema spineum var. *orbicularis.*
№ 34а—в/12129. Табл. IX, фиг. 4—6
Hallopora abnormis.
№ 35а/12129. Табл. VI, фиг. 5
Anaphragma vetustum.
№ 36а—д/12129. Табл. XI, фиг. 1, 2
Diplotrypa petropolitana.
№ 38а, б/12129. Табл. XII, фиг. 3
Dittopora ramosa.
№ 40а—г/12129. Табл. XIII, фиг. 5—7
Monotrypa helenae.
№ 45а, б/12129. Табл. XIV, фиг. 6, 7

83. МОДЗАЛЕВСКАЯ Е. А. (колл. № 10969). *Monticuliporidae* и *Dittoporidae* ордовика Тувы (мшанки). Ежег. ВПО, т. XXIII, 1980, с. 92—105, 4 пал. табл.
Описано 8 видов мшанок, из них 7 новых и 1 новый подвид.

Голотипы:

Monticulipora elata Modzalevskaja.
№ 1а—в/10969. Табл. I, фиг. 1
Homotrypa certa Modz.
№ 3а—в/10969. Табл. II, фиг. 1
Homotrypa dissimilaris.
№ 4а—в/10969. Табл. II, фиг. 2
Homotrypa egregia.
№ 2а—в/10969. Табл. I, фиг. 2
Homotrypella tumulosa mugurica.
№ 5а—в/10969. Табл. III, фиг. 1
Homotrypella elenae.
№ 8а, б/10969. Табл. IV, фиг. 1
Homotrypella (?) *flexuosa.*
№ 9а, б/10969. Табл. IV, фиг. 2
Hemiphragma subnonnulum.
№ 10а, б/10969. Табл. IV, фиг. 3

84. МОДЗАЛЕВСКАЯ Е. А. (колл. № 12016). Позднеордовикские мшанки Юго-Западного Алтая. Ежег. ВПО, т. XXV, 1982, с. 80—97, 1 пал. табл.
Описано 12 видов, из них 2 новых и 3 в открытой номенклатуре, 1 подвид.

Голотипы:

Fistulipora altaja Modzalevskaja.
№ 5/12016. Табл. I, фиг. 1
Stigmatella buchtarmensis Modz.
№ 45/12016. Табл. I, фиг. 2

85. НЕХОРОШЕВА Л. В. (колл. № 8868). Ордовикские мшанки (отряд *Trepostomata*) Таймыра. Ученые зап. НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 9, 1965, с. 41—78, 9 пал. табл.

Работа является частью монографического описания ордовикских мшанок Таймыра. Описано 14 видов, из них 3 в открытой номенклатуре и 3 новых.

Голотипы:

Eridotrypa bondarevi L. Nekhorosheva.
№ 20а—в/8868. Табл. VII, фиг. 4
Hemiphragma ? tuberculata.
№ 22а—в/8868. Табл. VIII, фиг. 2—4
Orbipora hexagonalis.
№ 25а, б/8868. Табл. IX, фиг. 1

86. НЕХОРОШЕВА Л. В. (колл. № 8908). Среднеордовикские ринидиктииды Таймыра. Ученые зап. НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 12, 1966, с. 9—29, 5 пал. табл.

Всего 8 видов, из них 2 новых.

Голотипы:

Rhinidictya alata L. Nekhorosheva.
№ 1а, б/8908. Табл. I, фиг. 1
Rhinidictya maculata L. Nekhor.
№ 2, 2а—в/8908. Табл. II, фиг. 1

87. НЕХОРОШЕВА Л. В. (колл. № 8948). Ордовикские птилодиктииды Таймыра. Ученые зап. НИИГА, палеонтол. и биострат., вып. 13, 1966, с. 22—37, 3 пал. табл.

Описано 7 видов мшанок, из них 1 в открытой номенклатуре и 1 форма с родовым определением. Новых вида 2.

Голотипы:

Phaenopora kljuevskensis L. Nekhorosheva.
№ 1а, б/8948. Табл. I, фиг. 3
Phaenopora minutissimaeformis L. Nekh.
№ 3а/8948. Табл. I, фиг. 2

88. НЕХОРОШЕВА Л. В. (колл. № 8949). О находке мшанки рода *Chasmatoporella* в среднем ордовике Таймыра. Ученые зап. НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 13, 1966, с. 17—37, 1 пал. табл.

Описан 1 новый вид мшанок.

Голотип:

Chasmatoporella tolmatchovensis L. Nekhorosheva.
№ 1а/8949. Табл. I, фиг. 1в

89. НЕХОРОШЕВА Л. В. (колл. № 9868). Новый представитель мшанки рода *Hexaporites* из югорского горизонта (средний

ордовик) Пай-Хоя. Уч. зап. НИИГА, палеонт. и биострат, вып. 20, 1967, с. 48—51, 1 пал. табл.

Описан 1 новый вид мшанок.

Голотип:

Hexaporites constellariformis L. Nekhorosheva.
№ 1, 1а, б/9868. Табл. I, фиг. 2

90. НЕХОРОШЕВА Л. В. (колл. № 12238). Новая среднеордовикская *Strictoporella* (мшанки) Центрального Таймыра. Ежег. ВПО, т. XXVIII, 1985, с 264—269, 1 пал. табл.

Описан 1 новый подвид мшанок.

Голотип:

Strictoporella rigida tajmyrica L. Nekhorosheva.
№ 1а/12238. Табл. I, фиг. 3

91. НЕХОРОШЕВА Л. В. (колл. № 12536). Новый представитель диаспорид (мшанки) из среднего ордовика о-ва Вайгач. Ежег. ВПО, т. XXXIII, 1990, с. 256—265, 1 пал. табл.

Описан новый вид, типовой для нового рода.

Голотип:

Mitoclemina rhombica L. Nekhorosheva.
№ 1а/12536. Табл. I, фиг. 1

92. НИКИТИН И. Ф., ПОПОВ Л. Е. (колл. № 11909). Среднеордовикские ортацеи и плектамбонитацеи Северного Приишимья и бассейна реки Акжар в Центральном Казахстане (брахиоподы). Ежег. ВПО, т. XXVI, 1983, с. 228—244, 3 пал. табл.

Описан 1 новый род, 6 видов, из них 5 новых и 1 форма с родовым определением.

Голотипы:

Plectorthis numerosa Nikitin et Popov.
№ 1/11990. Табл. I, фиг. 2
Plectorthis akzarica.
№ 10/11990. Табл. I, фиг. 11
Leptellina seletensis.
№ 26/11990. Табл. III, фиг. 9
Shlyginia declivis.
№ 31/11990. Табл. III, фиг 1
Sowerbyella verecunda.
№ 40/11990. Табл. III, фиг. 12

93. НИКИТИН И. Ф., ПОПОВ Л. Е. (колл. № 12095). Брахиоподы Бестамакской и Саргалдакской свит (средний ордовик). В сб.: Брахиоподы и биостратиграфия среднего и верхнего ордовика хребта Чингиз. АН Каз.ССР, 1984, с. 126—166.

Описано 27 видов, из них 17 новых и 1 в открытой номенклатуре, 6 форм с родовым определением и 1 подвид; 1 новое семейство и 4 новых рода.

Голотипы:

Ussunia uncredibilis Nikitin et Popov.
№ 1/12095 (12095/1). Табл. XIII, фиг. 1
Palaeotrimerella superba.
№ 12/12095 (12095/12). Табл. XIV, фиг. 13
Ovidiella plana.
№ 16/12095 (12095/15). Табл. XIV, фиг. 16
Eodolmanella subita.
№ 33/12095 (12095/33). Табл. XV, фиг. 9
Archaeorthis opima.
№ 41/12095 (12095/41). Табл. XV, фиг. 18
Glyptorthis (?) *bestamaki.*
№ 208/12095 (12095/208). Табл. XVI, фиг. 1
Camerella praestens.
№ 79/12095 (12095/79). Табл. XIX, фиг. 6
Eoanastrophia extenuata.
№ 91/12095 (12095/91). Табл. XIX, фиг. 2
Kajnaria derupta.
№ 108/12095 (12095/108). Табл. XVIII, фиг. 14
Shlyginia solida.
№ 113/12095 (12095/113). Табл. XVI, фиг. 13
Anoptambonites aktasensis.
№ 123/12095 (12095/123). Табл. XVIII, фиг. 20
Aulie convexa.
№ 99/12095 (12095/99). Табл. XVII, фиг. 1
Bumuria triquetra.
№ 147/12095 (12095/146). Табл. XVIII, фиг. 8
Bajanhongorella variabilis.
№ 175/12095 (12095/175). Табл. XVIII, фиг. 9
Dorytrera insignis.
№ 189/12095 (12095/189). Табл. XX, фиг. 11
Oligorhyncha (?) *mica.*
№ 197/12095 (12095/197). Табл. XX, фиг. 5
Qilianotryma praecursor.
№ 204/12095 (12095/204). Табл. XX, фиг. 16

94. НИКИТИН И. Ф., ПОПОВ Л. Е. (колл. № 12209). Ордовикские строфомениды (брахиоподы) Северного Приишимья (Центральный Казахстан). Ежег. ВПО, т. XXVIII, 1985, с. 34—49, 3 пал. табл.
Описан 1 новый род, 4 вида, из них 1 новый.

Голотипы:

Strophomena digna Nikitin et Popov.
№ 1/12209. Табл. I, фиг. 7
Esilia tchetvericovae.
№ 14/12209. Табл. III, фиг. 5

Triplesia globosa.
№ 23/12209. Табл. II, фиг. 2

95. НИКИТИНА О. И. (колл. № 12093). Новая брахиоподовая ассоциация из среднего ордовика Южного Казахстана. Палеонт. журн. № 4, 1985, с. 21—29, 1 пал. табл.

Всего 6 новых видов брахиопод.

Голотипы:

Orthambonites rgaitensis Nikitina.
№ 5/12093. Табл. I, фиг. 5
Scaphorthus recurva.
№ 8/12093. Табл. I, фиг. 8
Acculina villosa.
№ 16/12093 (6/12093). Табл. I, фиг. 16
Oepikina rugosa.
№ 22/12093. Табл. I, фиг. 22
Macrocoelia insolita.
№ 28/12093. Табл. II, фиг. 4
Strophomena rukavishnikovae.
№ 32/12093. Табл. II, фиг. 8

96. НИКИФОРОВА О. И. (колл. № 10532). Брахиоподы чашманкалонских, арчалыкских и минкучарских слоев. В сб.: Пограничные слои ордовика и силура Алтае-Саянской области и Тянь-Шаня. Тр. Сиб отд. АН СССР, вып. 397, 1978, с. 102—125.

Описано 15 видов, из них 6 в открытой номенклатуре и 4 новых; 1 новый подвид и 9 форм в открытой номенклатуре.

Голотипы:

Eodinobolus transversus Gorjansky.
№ 1/10532. Табл. XVIII, фиг. 1
Dolerorthis intermedius Nikiforova.
№ 2/10532. Табл. XVIII, фиг. 2
Sowerbyella intricata Nikif.
№ 25/10532. Табл. XIX, фиг. 12
Schachriomonia schachriomonica.
№ 49/10532. Табл. XXII, фиг. 8
Meifodia recta alia.
№ 68/10532. Табл. XXIII, фиг. 14

97. НИКИФОРОВА О. И. и РОЗОВ С. Н. (колл. № 11667). Проблематика из ордовикских отложений Сибирской платформы. Палеонт. журн. АН СССР, № 4, 1979, с. 96—100, 1 пал. табл.

Описаны раковины проблематичных беспозвоночных, отнесенных к новому роду и виду.

Голотип:

Moyeronia belostotzkayae Nikiforova et Rosov.
№ 1/11667. Табл. X, фиг. 1

98. НИКИФОРОВА О. И., ПОПОВ Л. Е. (колл. № 11774). Новые данные об ордовикских ринхонеллидах Казахстана и Средней Азии. Палеонт. журн. № 1, 1981, с. 54—67, 2 пал. табл.

Описано 2 новых рода брахиопод и 4 вида, из них 3 новых.

Голотипы:

Ancistrorhyncha modesta Popov.
№ 1/11774. Табл. VII, фиг. 4
Ancistrorhyncha prisca.
№ 20/11774. Табл. VII, фиг. 7
Paraoligorhyncha reducta.
№ 60/11774. Табл. VII, фиг. 16

99. НИКИФОРОВА О. И., ОРАДОВСКАЯ М. М., ПОПОВ Л. Е. (колл. № 11943). Новые ордовикские атрипиды (Brachiopoda) Северо-Востока СССР, Таймыра и Казахстана. Палеонт. журн. № 3, 1982, с. 62—69, 1 пал. табл.

Описан новый род позднеордовикских брахиопод и 3 новых вида.

Голотипы:

Euroatrypa kolymica Oradovskaya.
№ 1/11943. Табл. VI, фиг. 8
Euroatrypa tajmyrica Nikiforova.
№ 10/11943. Табл. VI, фиг. 1, 3
Euroatrypa suspecta Popov.
№ 25/11943. Табл. VI, фиг. 9

100. НИКИФОРОВА О. И. (колл. № 11882). Позднеордовикские ортиды (брахиоподы) Центрального Таймыра. Ежег. ВПО, т. XXVIII, 1985, с. 69—80, 1 пал. табл.

Описано 2 вида, из них 1 новый, 1 в открытой номенклатуре, 1 новый подвид и 4 формы с родовым определением.

Голотипы:

Ptychopleurella alata Nikiforova.
№ 11/11882. Табл. I, фиг. 2
Howellites wesenbergensis aenigmus.
№ 22/11882. Табл. I, фиг. 13

101. ОБУТ А. М., СОБОЛЕВСКАЯ Р. Ф. (колл. № 8310). Граптолиты раннего ордовика на Таймыре. В сб.: «Проблемы нефтегазоносности Советской Арктики». Тр. НИИГА, т. 127, палеонт. и биострат., вып. 3, 1962, с. 65—85, 5 пал. табл.

Описан разрез бассейна р. Коралловой, откуда собран монографически обработанный материал. Всего описано 19 видов, из них 5 новых и 2 новых рода.

Голотипы:

Dictyonema tajmyrense Obut et Sobolevskaya.
№ 4/8310. Табл. I, фиг. 4

Sagenograptus gagarini.
№ 5/8310. Табл. I, фиг. 5
Aletograptus hyperboreus.
№ 9/8310. Табл. II, фиг. 6, 7
Clonograptus limatus.
№ 10/8310. Табл. II, фиг. 8
Didymograptus tenuiramis.
№ 24/8310. Табл. V, фиг. 3

102. ОБУТ А. М., СОБОЛЕВСКАЯ Р. Ф. (колл. № 8705). Граптолиты ордовика Таймыра. М., «Наука», 1964, 92 с., 16 пал. табл.

Рассмотрены ордовикские отложения северо-западной фациальной зоны Таймыра, даны таблицы зонального распространения граптолитов. Описано 68 видов, из них 7 в открытой номенклатуре, 4 подвида и 4 формы с родовым определением. Новых видов 22.

Голотипы:

Tetragraptus (Eotetragraptus) fragilis Obut et Sobolevskaya.
№ 2/8705. Табл. I, фиг. 2
Trigonograptus tenvis.
№ 8/8705. Табл. I, фиг. 6
Expansograptus tajmyrensis.
№ 10/8705. Табл. I, фиг. 9
Corymbograptus v-fragosus.
№ 11/8705. Табл. II, фиг. 1
Isograptus schrenki.
№ 17/8705. Табл. II, фиг. 7
Dicellograptus bondarevi.
№ 26/8705. Табл. IV, фиг. 2
Dicellograptus middendorfi.
№ 35/8705. Табл. V, фиг. 7
Dicellograptus parallelus.
№ 37/8705. Табл. VI, фиг. 1
Dicranograptus bungei.
№ 48/8705. Табл. VII, фиг. 1
Climacograptus membraniferus.
№ 75/8705. Табл. XI, фиг. 2
Climacograptus praesupernus.
№ 79/8705. Табл. XI, фиг. 1
Glyptograptus plurithecatus.
№ 93/8705. Табл. XII, фиг. 8
Diplograptus multithecatus.
№ 100/8705. Табл. XIII, фиг. 1
Diplograptus praemultidens.
№ 102/8705. Табл. XIII, фиг. 3
Diplograptus pulcher.
№ 103/8705. Табл. XIII, фиг. 4

Orthograptus nanus.
№ 106/8705. Табл. XIII, фиг. 8
Rectograptus barcovaensis.
№ 108/8705. Табл. XIII, фиг. 10
Rectograptus insuetus.
№ 110/8705. Табл. XIII, фиг. 9
Rectograptus longissimus.
№ 111/8705. Табл. XIV, фиг. 1
Cryptograptus arcticus.
№ 114/8705. Табл. XIV, фиг. 6
Glossograptus barbatulus.
№ 117/8705. Табл. XV, фиг. 3
Glossograptus engelgardti.
№ 118/8705. Табл. XV, фиг. 4

103. ОРАДОВСКАЯ М. М. (колл. № 10196). Брахиоподы среднего ордовика Чукотского полуострова. В сб.: «Стратиграфия и фауна ордовика и силура Чукотского полуострова». Тр. ИГиГ, вып. 351, СО АН СССР, 1977, с. 87—102.

Описано 5 видов, из них 1 новый, 2 новых подвида и 1 форма с родовым определением.

Голотипы:

Mimella panna tchukotica Oradovskaya.
№ 1/10196. Табл. I, фиг. 1
Vellamo putukuniensis Orad.
№ 57/10196. Табл. III, фиг. 5
Strophomena medialis tchegitunica.
№ 29/10196 (60/10196). Табл. VI, фиг. 1

104. ОРАДОВСКАЯ М. М. (колл. № 11993). Замковые брахиоподы. В сб.: «Граница ордовика и силура на Северо-Востоке СССР». Корень Т. Н., Орадовская М. М., Пылма Л. Я. и др. Л., «Наука», 1983, с. 35—73.

Описано 26 видов, из них 5 новых и 8 в открытой номенклатуре, 2 подвида, из них 1 новый и 14 форм с родовыми определениями.

Голотипы:

Eoplectodonta nesnakomkaensis Oradovskaya.
№ 66/11993. Табл. VI, фиг. 1
Eostropheodonta hirnantensis lucavica Orad.
№ 96/11993 (24/11431). Табл. V, фиг. 2
Parastrophinella gracilis.
№ 50/11993. Табл. X, фиг. 4
Plectothyrella mirnyensis.
№ 108/11993. Табл. XIV, фиг. 8
Zygospira taskanensis.
№ 128/11993. Табл. XIV, фиг. 1

Protozouga insueta.
№ 158/11993. Табл. XV, фиг. 16

105. ПОПОВ Л. Е. (колл. № 11098). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 5, 1980, с. 54—57.
Описано 3 новых вида брахиопод из ордовика Северного Казахстана.

Голотипы:

Isophragma princeps Popov.
№ 1/11098. Табл. XVII, фиг. 1
Craspidelia tata.
№ 8/11098. Табл. XVII, фиг. 9
Christiania tortuosa.
№ 11/11098. Табл. XVII, фиг. 10

106. ПОПОВ Л. Е. (колл. № 11352). В сб.: Стратиграфия и фауна кремнисто-карбонатных толщ ордовика Казахстана. Б. Б. Назаров, Л. Е. Попов. Тр. ГИН, вып. 331. М., «Наука», 1980, с. 81—142, 14 пал. табл.
Описано 33 вида беззамковых брахиопод, из них 20 видов новых и 9 в открытой номенклатуре; 6 форм с родовым определением, 2 новых подвида и 7 новых родов.

Голотипы:

Apatobolus plicatus Popov.
№ 3/11352. Табл. XVIII, фиг. 5
Westonia pupyshevi.
№ 20/11352. Табл. XX, фиг. 1
Rowellella balchashensis.
№ 25/11352. Табл. XVIII, фиг. 14
Conotreta apicalis monstrata.
№ 49/11352 (46/11352). Табл. XXI, фиг. 9
Cristicoma sincera.
№ 60/11352. Табл. XXIII, фиг. 17
Euritreta kendyktassica.
№ 70/11352. Табл. XXXII, фиг. 11
Fascicoma obscura.
№ 80/11352. Табл. XXIII, фиг. 6
Paratreta retracta.
№ 90/11352. Табл. XXIV, фиг. 9
Phyzotreta rugosa.
№ 110/11352. Табл. XXV, фиг. 1
Spondylotreta parva orientalis.
№ 285/11352 (240/11352). Табл. XXII, фиг. 5
Lurgiticoma singularis.
№ 120/11352. Табл. XXVIII, фиг. 4
Munericoma electa.
№ 130/11352. Табл. XXVIII, фиг. 9

Munericoma ornata.
№ 140/11352. Табл. XXVIII, фиг. 14
Issedonia spinosa.
№ 150/11352. Табл. XXVII, фиг. 6
Issedonia procera.
№ 155/11352. Табл. XXIV, фиг. 10
Polylasma subsciduum.
№ 160/11352. Табл. XXVII, фиг. 10
Scaphelasma pusilla.
№ 190/11352. Табл. XXVI, фиг. 14
Rhysotreta prisca.
№ 200/11352. Табл. XXVI, фиг. 10
Schizotreta triangularis.
№ 225/11352. Табл. XXXI, фиг. 8
Siphonotreta mamatensis.
№ 235/11352. Табл. XXIX, фиг. 5
Multispinula parvula.
№ 241/11352. Табл. XXIX, фиг. 8
Pseudocrania karatalensis.
№ 251/11352. Табл. XXX, фиг. 6

107. ПОПОВ Л. Е. (колл. № 11522)[1]. Новые виды брахиопод среднего ордовика Чу-Илийских гор. Ежег. ВПО, т. XXIII, 1980, с. 139—158, 2 пал. табл.
Описано 7 новых видов брахиопод.

Голотипы:

Ectenoglossa sorbulakensis Popov.
№ 1/11522. Табл. I, фиг. 1
Dolerorthis expressa.
№ 11/11522. Табл. I, фиг. 5
Palaeostrophomena necopina.
№ 15/11522. Табл. I, фиг. 11
Isophragma imperator.
№ 25/11522. Табл. II, фиг. 8
Anoptambonites orientalis.
№ 30/11522. Табл. II, фиг. 14
Sowerbyella rukavishnikovae.
№ 40/11522. Табл. II, фиг. 3
Glyptomena onerosa.
№ 50/11522. Табл. II, фиг. 5

108. ПОПОВ Л. Е., НИКИТИН И. Ф., РУКАВИШНИКОВА Т. Б. (колл. № 11678). Класс *Inarticulata.* Беззамковые брахиоподы. Класс *Articulata.* Замковые брахиоподы. В сб.: «Граница ордовика и силура в Казахстане». Алма-Ата, «Наука», Каз.ССР, 1980, с. 35—73, 12 пал. табл.

[1] Ошибочно опубликована под № 11523

Описано 32 вида брахиопод, из них 11 в открытой номенклатуре, 8 новых; 2 подвида и 20 форм с родовым определением.

Голотипы:

Dalmanella cicatrica Nikitin.
№ 110/11678 (11678/110). Табл. XI, фиг. 8
Anisopleurella novemcostata.
№ 68/11678 (11678/68а). Табл. XIII, фиг. 15
Aegiromena durbenensis.
№ 1/11678 (11678/1). Табл. XIII, фиг. 17
Eoatropheodonta bublitschenki.
№ 30/11678 (11678/30). Табл. XVIII, фиг. 10
Coolinia iliensis.
№ 54, 54а/11678 (11678/54, 54а). Табл. XIX, фиг. 4
Zygospiraella dominanta Rukavischnikova.
№ 275/11678 (11678/275). Табл. XX, фиг. 16
Spirigerina plana Rukav.
№ 288/11678 (11678/288). Табл. XXI, фиг. 5
Iliella minima.
№ 257/11678 (11678/257). Табл. XXI, фиг. 15

109. ПОПОВ Л. Е. (колл. № 11989). Брахиоподы андеркенского горизонта Чу-Илийских гор (Казахстан). Ежег. ВПО, т. XXVIII, 1985, с. 50—68, 3 пал. табл.
Описано 7 видов, из них 6 новых.

Голотипы:

Phragmorthis conciliata Popov.
№ 10/11989. Табл. I, фиг. 9
Eodalmanella extera.
№ 4/11989. Табл. I, фиг. 4
Leptellina (?) *conferta.*
№ 17/11989. Табл. II, фиг. 3
Strophomena lanx.
№ 30/11989. Табл. I, фиг. 13
Christiania egregia.
№ 25/11989. Табл. II, фиг. 11
Bicuspina attrita.
№ 32/11989. Табл. III, фиг. 2

110. ПОПОВ Л. Е., РУКАВИШНИКОВА Т. Б. (колл. № 11544). Новое семейство гигантских беззамковых брахиопод из верхнего ордовика Южного Казахстана. Палеонт. журн. АН СССР, № 1, 1986, с. 56—60, 1 пал. табл.
Описан 1 новый род и вид брахиопод.

Голотип:

Adensu monstratum Popov et Rukavischnikova.
№ 1/11544. Табл. VI, фиг. 5

111. РОЗМАН Х. С. (колл. № 11700). Позднеордовикские брахиоподы Сибирской платформы. Палеонт. журн. № 3, 1969, с. 84—108, 2 пал. табл.

Описано 1 новое подсемейство, 1 новый род, 6 новых видов и 1 новый подвид.

Голотипы и синтипы:

Oxoplecia asiatica Rozman.
№ 29/11700 (3596/143). Табл. V, фиг. 8

Bellimurina sibirica.
№ 2/11700 (3573/307). Табл. V, фиг. 2

Bellimurina ? paucicostata.
№ 22/11700 (3596/306). Табл. V, фиг. 6
№ 23/11700 (3596/307). Табл. V, фиг. 5

Rostricellula burensis.
№ 33/11700 (3596/197). Табл. V, фиг. 12; табл. VI, фиг. 8

Evenkorhynchia dulkumensis.
№ 72/11700 (3596/172). Табл. VI, фиг. 1

Evenkorhynchia dichotomians evenkensis.
№ 78/11700 (3573/370). Табл. VI, фиг. 4

Evenkorhynchia tenuicostata.
№ 101/11700 (3596/201). Табл. VI, фиг. 6

112. РОЗМАН Х. С. (колл. № 11699). О брахиоподах рода *Maakina.* Палеонт. журн. № 2, 1972, с. 82—93, 2 пал. табл.

Описано 5 видов и 1 подвид ордовикских брахиопод, отнесенных к одному роду. Новых видов 2 и 1 новый подвид. В коллекции 2 новых вида.

Голотипы:

Maakina paucirugosa Rozman.
№ 38/11699. Табл. XIII, фиг. 12

Maakina viluensis.
№ 78/11699. Табл. XIV, фиг. 8

113. РОЗМАН Х. С. (колл. № 10454). Брахиоподы обикалонских слоев. В сб.: Пограничные слои ордовика и силура Алтае-Саянской области и Тянь-Шаня. Тр. Сиб. отд. АН СССР, вып. 397, 1978, с. 75—101.

Описано 12 видов, из них 6 новых и 3 в открытой номенклатуре; 3 новых подвида и 4 формы с родовым определением.

Голотипы:

Nicolella strasburgensis alata Rozman.
№ 1/10454. Табл. XII, фиг. 1

Saukrodictya thuanshanica.
№ 14/10454. Табл. XII, фиг. 11

Reuschella asiatica.
№ 23/10454. Табл. XIII, фиг. 1

Admixtella orientalis.
№ 28/10454. Табл. XIII, фиг. 5
Ishimia sumsarica.
№ 46/10454. Табл. XIV, фиг. 10
Eoplectodonta (Eoplectodonta) semirugata paucicostellata.
№ 69/10454. Табл. XV, фиг. 6
Strophomena lebediensis septata.
№ 71/10454. Табл. XV, фиг. 11
Günnarella gigantea.
№ 78/10454. Табл. XVI, фиг. 1
Eoanastophia primordialis.
№ 97/10454. Табл. XVII, фиг. 10

114. РОЗМАН Х. С. (колл. № 11700). Новые *Parastrophina* и *Brevilamnulella (Brachiopoda)* из верхнего ордовика и нижнего силура Средней Сибири. Палеонт. журн. № 2, 1978, с. 45—50, 1 пал. табл.

Описан 1 новый вид и 1 подвид брахиопод из ордовика и силура.

Голотипы:

Parastrophina plena sibirica Rozman.
№ 114/11700 (3596/563). Табл. VII, фиг. 1
Brevilamnulella undatiformis.
№ 119/11700 (3533/254). Табл. VII, фиг. 4

115. РОЗМАН Х. С. (колл. № 11701). Описание и анализ фауны верхнего ордовика Средней Сибири. I. Брахиоподы (*Phynchonellacea*) Мангазейского и Долборского горизонтов. В сб.: «Фауна ордовика Средней Сибири». Тр. ГИН, вып. 330. М., «Наука», 1979, с. 37—79.

Описано 4 вида брахиопод, из них 2 новые и 6 подвидов, из них 4 новых.

Голотипы:

Rostricellula sibirica Rozman.
№ 28/11701. Табл. III, фиг. 4
Rostricellula subrostrata stabilis.
№ 103/11701. Табл. X, фиг. 10
Rostricellula subrostrata acuticostata.
№ 44/11701. Табл. IV, фиг. 9, 10
Lepidocycloides nana.
№ 127/11701. Табл. XI, фиг. 14
Lepidocycloides indivisus indivisus.
№ 159/11701. Табл. XIII, фиг. 4
Lepidocycloides indivisus striatus.
№ 148/11701. Табл. XII, фиг. 4

116. САПЕЛЬНИКОВ В. П., ОРАДОВСКАЯ М. М. (колл. № 11293). Новый вид карадокских стрикландиацей Северо-

Востока СССР и некоторые дополнения к диагнозу семейства *Vagidae*. В сб.: «Мат. по палеонт. среднего палеозоя Урала и Сибири». Тр. ИГиГ АН СССР, вып. 126, 1977, с. 24—31, 1 пал. табл.

Описан 1 новый вид ордовикских брахиопод.

Голотип:

Didymelasma? *incerta* Sapelnikov et Oradovskaja.
№ 4/11293. Табл. 1, фиг. 4

117. СОКОЛОВ Б. С. (колл. № 8122). Силурийские кораллы запада Сибирской платформы. Вопр. палеонт., т. 1, 1950, с. 211—242, 8 пал. табл.

Изучение коллекции табулят и ругоз позволило автору выделить 2 комплекса фауны: ордовикский и силурийский. Всего описано 19 видов табулят, из них 8 новых; 8 вариететов, из них 5 новых и 1 вид в открытой номенклатуре. Ругоз описано 4 вида, из них 1 новый и 1 новый вариетет. В коллекции 7 новых видов, 5 новых вариететов.

Голотипы:

Favosites favosus var. *multiporosus* Sokolov.
№ 8, 8а, б/8122. Табл. I, фиг. 7, 8
Palaeofavosites turukhanicus Sok.
№ 13, 13а, б/8122. Табл. III, фиг. 3, 4
Palaeofavosites turukhanicus var. *multitabulatus*.
№ 14, 14а, б/8122. Табл. III, фиг. 5, 6
Palaeofavosites elegans.
№ 15, 15а, б/8122. Табл. III, фиг. 7, 8
Syringopora tungusica.
№ 17, 17а, б/8122. Табл. IV, фиг. 3, 4
Propora conferta var. *tunicata*.
№ 22/8122[1)]
Propora conferta var. *vetula*.
№ 23, 23а, б/8122. Табл. IV, фиг. 6, 7
Propora concellatiformis.
№ 24, 24а, б/8122. Табл. VII, фиг. 3, 4
Cyrtophyllum lambeiformis.
№ 26, 26а, б/8122. Табл. VIII, фиг. 5, 6
Cyrtophyllum orthis.
№ 27, 27а, б/8122. Табл. VIII, фиг. 7, 8
Cyrtophyllum laxum.
№ 28а, б/8122 не изображен
Columnaria septosa var. *major*.
№ 29, 29а, б/8122. Табл. III, фиг. 10.

[1)] Шлифы утеряны автором.

118. СТРЕЛЬНИКОВ С. И. (колл. № 8714). Ордовикские и силурийские ругозы островов Вайгач и Долгого. Уч. зап. НИИГА, палеонт. и стратиграфия, вып. 8, 1965, с. 24—57, 7 пал. табл.

Описано 13 видов ругоз, из них 3 новых, 1 форма с родовым определением, рассмотрено географическое и стратиграфическое распространение видов, определены комплексы видов, характеризующие отдельные части разреза.

Голотипы:

Axolasma implicatum Strelnikov.
№ 7/8714. Табл. II, фиг. 2
Kodonophyllum angustum Streln.
№ 20/8714. Табл. V, фиг. 2
Cystilasma arcticum.
№ 24/8714. Табл. VI, фиг. 3; табл. VII, фиг. 1

119. СТУКАЛИНА Г. А. (колл. № 10447). Цистоидеи и морские лилии. В сб.: «Пограничные слои ордовика и силура Алтае-Саянской области и Тянь-Шаня». Тр. Сиб. отд. АН СССР, вып. 397, 1978, с. 145—164.

Описано 16 видов, из них 7 видов новых, 3 в открытой номенклатуре, 7 форм с родовым определением, 4 новых рода и 1 новое семейство.

Голотипы:

Cheirocrinus ? tumefactus Stukalina.
№ 1/10447. Табл. XXXI, фиг. 1
Sumsaricystis radiatus Stuk.
№ 17/10447. Табл. XXXII, фиг. 7
Xenocrinus ? quadriangulatus.
№ 47/10447. Табл. XXXV, фиг. 6
Fascicrinus costatus.
№ 49/10447. Табл. XXXV, фиг. 8
Kitabicrinus longus.
№ 57/10447. Табл. XXXV, фиг. 16
Pentalobatocrinus simplex.
№ 58/10447. Табл. XXXV, фиг. 17
Ferulacrinus rugidus.
№ 59/10447. Табл. XXXV, фиг. 18

120. СТУКАЛИНА Г. А. (кол. № 11508). III. Криноидеи криволуцкого, мангазейского, долборского и кетского горизонтов. В сб.: «Фауна ордовика Средней Сибири». Тр. ГИН, вып. 330, 1979, с. 131—158, 2 пал. табл.

Описано 16 видов, из них 7 новых; 7 новых семейств и 8 новых родов.

Голотипы:

Squameocrinus tchunensis Stukalina.
№ 1/11508. Табл. XXX, фиг. 2

Sidericrinus asperum Stuk.
№ 2/11508. Табл. XXX, фиг. 3
Fascicrinus ordinarius.
№ 3/11508. Табл. XXX, фиг. 4
Fascicrinus stolbovensis.
№ 4/11508. Табл. XXX, фиг. 5
Ramosocrinus clivosus.
№ 5/11508. Табл. XXX, фиг. 6
Parvicrinus parnus.
№ 6/11508. Табл. XXX, фиг. 9
Nirundacrinus nirundaensis.
Табл. XXXI, фиг. 17

121. СТУКАЛИНА Г. А. (колл. № 11607). *Weberichinadae* — новое семейство ордовикских криноидей Казахстана. Ежег. ВПО, т. XXII, 1979, с. 158—162.
Описан 1 новый вид, отнесенный к новому роду, нового семейства.

Голотип:

Webericrinus variabilis Stukalina.
№ 1/11607. Рис. 3, фиг. 1

122. СТУКАЛИНА Г. А. (колл. № 11720). Новое семейство ордовикских криноидей. Палеонт. журн. № 4, 1979, с. 89—95.
Представители рассматриваемого семейства ранее относились или к мезозойскому роду или к сборным родовым категориям. Описано 2 новых рода и новый вид.

Голотип:

Baltocrinus kazakhstanensis Stukalina.
№ 2/11720. Рис. 2.

123. СТУКАЛИНА Г. А. (колл. № 11487). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 5, 1980, с. 95—114.
Описано 9 новых семейств, 9 новых родов и 23 новых вида цистоидей и криноидей из ордовика и нижнего силура Центрального Казахстана и Северной Киргизии.

Голотипы:

Communicystis communis Stukalina.
№ 1/11487. Табл. XXI, фиг. 14
Clivosocystis clivosus Stuk.
№ 3/11487. Табл. XXI, фиг. 16
Clivosocystis tuberculatus.
№ 5/11487. Табл. XXI, фиг. 18
Sidericrinus giganteus.
№ 8/11487. Табл. XXII, фиг. 1
Laticrinus latus.
№ 11/11487. Табл. XXI, фиг. 22

Fascicrinus fasciculus.
№ 12/11487. Табл. XXII, фиг. 3
Fascicrinus concavus.
№ 15/11487. Табл. XXII, фиг. 6
Fascicrinus lentiformis.
№ 21/11487. Табл. XXII, фиг. 12
Fascicrinus inflatus.
№ 23/11487. Табл. XXII, фиг. 14
Malovicrinus quinpergulatus Stukalina et Tujutjan.
№ 25/11487. Табл. XXII, фиг. 16
Ramosocrinus tumsjikensus Stuk.
№ 27/11487. Табл. XXII, фиг. 18
Catagraphiocrinus accolensis.
№ 31/11487. Табл. XXII, фиг. 22
Catagraphiocrinus altus.
№ 32/11487. Табл. XXII, фиг. 23
Caragachicrinus quinguepartitus.
№ 33/11487. Табл. XXII, фиг. 1
Caragachicrinus minutus.
№ 34/11487. Табл. XXIII, фиг. 2
Cordonicrinus petaloideus.
№ 35/11487. Табл. XXIII, фиг. 3
Sigillatocrinus sigillatus.
№ 36/11487. Табл. XXIII, фиг. 4
Angusticrinus excisus.
№ 39/11487. Табл. XXIII, фиг. 7
Lunaricrinus notus.
№ 40/11487. Табл. XXIII, фиг. 8
Rosulicrinus rosulus.
№ 41/11487. Табл. XXIII, фиг. 9
Otaricrinus otaricus.
№ 44/11487. Табл. XXIII, фиг. 12
Sibiricrinus disjunctus.
№ 47/11487. Табл. XXIII, фиг. 15
Maltifidocrinus multifidus.
№ 52/11487. Табл. XXIII, фиг. 20

124. СТУКАЛИНА Г. А. (колл. № 11564). Класс *Crinoidea.* Криноидеи. В сб.: Граница ордовика и силура в Казахстане. Алма-Ата, «Наука», КазССР, 1980, с. 170—173, 1 пал. табл.
Описано 2 новых рода и 3 новых вида. В коллекции 2.

Голотипы:

Xenocrinus dentatus Stukalina.
№ 4/11564 (11564/4). Табл. XXXII, фиг. 3
Lunaricrinus lunaris Stuk.
№ 7/11564 (11564/7). Табл. XXXII, фиг. 6

125. СТУКАЛИНА Г. А. (колл. № 11746). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 5, 1980, с. 88—95, 1 пал. табл.

Описано 2 новых семейства, 2 новых рода и 10 новых видов криноидей из ордовика Казахстана, Урала и Восточно-Европейской платформы.

Голотипы:

Dwortsowaecrinus antiquus Stukalina et Tujutjan.
№ 1/11746. Табл. XXI, фиг. 1
Dwortsowaecrinus korjikensis Stuk.
№ 2/11746. Табл. XXI, фиг. 2
Dwortsowaecrinus simplex.
№ 4/11746. Табл. XXI, фиг. 4
Dwortsowaecrinus sculptus.
№ 6/11746. Табл. XXI, фиг. 6
Tatjanicrinus cruciformis.
№ 7/11746. Табл. XXI, фиг. 7
Tatjanicrinus kozhimensis.
№ 8/11746. Табл. XXI, фиг. 8
Xenocrinus? quadrilobatus Stukalina et Chints.
№ 9/11746. Табл. XXI, фиг. 9
Xenocrinus? lobus Stuk.
№ 10/11746. Табл. XXI, фиг. 10
Xenocrinus? corruptus.
№ 11/11746. Табл. XXI, фиг. 11
Xenocrinus explicatus.
№ 12/11746. Табл. XXI, фиг. 12

126. СТУКАЛИНА Г. А. (колл. № 11747). Новые данные об ордовикских криноидеях Центрального Казахстана. Ежег. ВПО, т. XXIII, 1980, с. 216—249, 2 пал. табл.

Работа посвящена стабилизации номенклатуры ряда новых видов и родов. Описано 3 новых семейства, 2 новых рода и 20 новых видов.

Голотипы:

Ristnacrinus pusillus Stukalin.
№ 1/11747. Табл. I, фиг. 1
Rustnacrinus bifidus Stuk.
№ 2/11747. Табл. I, фиг. 2
Ristnacrinus tuberculatus.
№ 5/11747. Табл. I, фиг. 5
Ristnacrinus kulunbulakensis.
№ 8/11747. Табл. I, фиг. 8
Digiticrinus digitus.
№ 10/11747. Табл. I, фиг. 10
Digiticrinus bellus.
№ 14/11747. Табл. I, фиг. 14

Digiticrinus levis.
№ 16/11747. Табл. I, фиг. 16
Digiticrinus baculiformis.
№ 18/11747. Табл. I, фиг. 18
Conspectocrinus simplex.
№ 19/11747. Табл. I, фиг. 19
Conspectocrinus malkeldensis.
№ 23/11747. Табл. I, фиг. 23
Conspectocrinus dulancarensis.
№ 26/11747. Табл. II, фиг. 2
Sellicrinus selliformis.
№ 30/11747. Табл. II, фиг. 6
Decemicrinus decilobatus.
№ 31/11747. Табл. II, фиг. 7
Mirabilicrinus lidievensis.
№ 32/11747. Табл. II, фиг. 8
Bilbocrinus bacillaris.
№ 33/11747. Табл. II, фиг. 9
Schizocrinus radiatus.
№ 35/11747. Табл. II, фиг. 11
Vallaticrinus vallatus.
№ 38/11747. Табл. II, фиг. 14
Cuboidicrinus cuboides.
№ 39/11747. Табл. II, фиг. 15
Divisicrinus divisus.
№ 41/11747. Табл. II, фиг. 17
Ordinaricrinus ordinarius.
№ 42/11747. Табл. II, фиг. 18

127. СТУКАЛИНА Г. А. (колл. № 11730). К характеристике иглокожих биогермных фаций ордовика Центрального Казахстана. Ежег. ВПО, т. XXVIII, 1985, с. 176—198, 3 пал. табл.

Описано 4 новых рода и 16 новых видов остатков криноидей и цистоидей.

Голотипы:

Oanducystis levis Stukalina.
№ 4/11730. Табл. I, фиг. 4
Tenuicystis tenuis Stuk.
№ 7/11730. Табл. I, фиг. 7
Dwortsowaecrinus nanus.
№ 8/11730. Табл. I, фиг. 8
Fascicrinus umbonatus.
№ 11/11730. Табл. I, фиг. 11
Laticrinus incomptus.
№ 20/11730. Табл. II, фиг. 5
Excisocrinus excisus.
№ 22/11730. Табл. II, фиг. 7

Anderkenicrinus antiquus.
№ 25/11730. Табл. II, фиг. 10
Malovicrinus incrustatus.
№ 32/11730 (32/11370). Табл. II, фиг. 17
Ramosocrinus convexus.
№ 34/11730. Табл. II, фиг. 19
Kellericrinus angularis.
№ 36/11730. Табл. III, фиг. 1
Kellericrinus torosus.
№ 37/11730. Табл. III, фиг. 2
Particrinus grumosus.
№ 38/11730. Табл. III, фиг. 3
Babanicrinus tumefactus.
№ 44/11730. Табл. III, фиг. 9
Multifidocrinus tenuicostatus.
№ 46/11730. Табл. III, фиг. 11
Granulosocrinus granulosus.
№ 48/11730. Табл. III, фиг. 13
Sartanicrinus sartanensis.
№ 50/11730. Табл. III, фиг. 15

128. СЫТОВА В. А. (колл. № 11581). IV. Ругозы мангазейского, долборского и кетского горизонтов. В сб.: «Фауна ордовика Средней Сибири». Тр. ГИН, вып. 330, 1979, с. 159—184, 5 пал. табл.

Описано 13 видов, из них 6 новых и 2 новых рода ругоз.

Голотипы:

Cantrillia andreevae Sytova.
№ 3/11581. Табл. XXXII, фиг. 2а, б
Streprelasma tesakovi Syt.
№ 12/11581. Табл. XXXII, фиг. 3а—в
Reimanelasma elegans.
№ 16/11581. Табл. XXXIII, фиг. 1а—в
Kenelasma sibiricum.
№ 50/11581. Табл. XXXIV, фиг. 4
Dinelasma gratum.
№ 76/11581. Табл. XXXIII, фиг. 2а—г
Favistina rozmanae.
№ 211/11581. Табл. XXXVI, фиг. 3а, б

129. ЧУГАЕВА М. Н. (колл. № 12032). Трилобиты. В сб.: «Граница ордовика и силура на Северо-Востоке СССР». Корень Т. Н., Орадовская М. М., Пылма Л. Я. и др. Л., «Наука», 1983, с. 73—97.

Описано 8 видов, из них 2 новых и 4 в открытой номенклатуре, 1 подвид и 14 форм с родовым определением.

Голотипы:

Mucranaspis ? *kolymica* Tschugaeva.
№ 32/12032. Табл. XXII, фиг. 1
Dicranogmus gregalis Tschug.
№ 46/12032. Табл. XXIII, фиг. 5

130. ЯВОРСКИЙ В. И. (колл. № 7351) Stromatoporoidea Советского Союза. Часть первая. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 8, 1955, 173 с, 89 пал. табл.

В первой части обобщающей работы по страматопороидеям, собранным на территории СССР, дано описание 177 видов, 16 вариететов, 2 форм с родовым определением. Новых видов 137, новых вариететов 13. В коллекции 136 новых видов и 13 вариететов. Часть форм позднее переизучена автором и в последующих частях отнесена к другим родам и видам.

Голотипы [1] и синтипы:

Actinostroma laskarevi Yavorsky.
№ 1, 1а, б/7351. Табл. I, фиг. 1; табл. II, фиг. 1*
Actinostroma malevskii Yavor.
№ 2, 2а, б/7351. Табл. II, фиг. 2, 3 *
Actinostroma inopinatum.
№ 3, 3а, б/7351. Табл. II, фиг. 4, 5; табл. IV, фиг. 3 *
Actinostroma jurmanense.
№ 7, 7а, б/7351. Табл. III, фиг. 7, 8 *
Actinostroma rugosum.
№ 8, 8а, б/7351. Табл. IV, фиг. 1, 2 *
Actinostroma kuzbassicum.
№ 10, 10а, б/7351. Табл. V, фиг. 1, 2, 4
Actinostroma krekovi.
№ 11, 11а, б/7351. Табл. V, фиг. 6; табл. VI, фиг. 1 *
Actinostroma toschemkense.
№ 13, 13а, б/7351. Табл. VI, фиг. 4, 7
Actinostroma moldavancevi.
№ 15, 15а, б/7351. Табл. VII, фиг. 1—3
Actinostroma labechiiforme var. *uralica.*
№ 17, 17а—в/7351. Табл. VII, фиг. 5, 8, 9
Actinostroma egregium.
№ 21, 21а, б/7351. Табл. VIII, фиг. 5, 6; табл. LIX, фиг. 4, 5 *
Actinostroma tenaicolumnum.
№ 23, 23а, б/7351. Табл. IX, фиг. 1, 2
№ 24/24а, б/7351. Табл. IX, фиг. 3, 4

[1] Голотипы выделены О. В. Богоявленской.

Actinostroma regulare.
№ 25, 25а, б/7351. Табл. IX, фиг. 5—7 *
Actinostroma mamontovi var. *plana.*
№ 26, 26а, б/7351. Табл. XXIII, фиг. 6—8 *
Actinostroma samskiense.
№ 28, 28а, б/7351. Табл. X, фиг. 2, 3 *
Gerronostroma tomiense.
№ 31, 31а, б/7351. Табл. XI, фиг. 6—8 *
Gerronostroma uralicium.
№ 32, 32а, б/7351. Табл. XI, фиг. 3—5 *
Gerronostroma batschatense var. *salairica.*
№ 33, 33а, б/7351. Табл. XII, фиг. 1—3 *
Gerronostroma boutovi.
№ 34, 34а, б/7351. Табл. XII, фиг. 4, 5 *
Gerronostroma juresanense.
№ 35, 35а, б/7351. Табл. XII, фиг. 6—8 *
Clathrocoilona solida.
№ 36, 36а, б/7351. Табл. XIII, фиг. 1, 2
№ 39, 39а, б/7351. Табл. XIII, фиг. 6, 7
Clathrodictyon nikiforovae.
№ 51, 51а—в/7351. Табл. XVI, фиг. 1, 4, 5
№ 52, 52а, б/7351. Табл. XVI, фиг. 2, 3
Clathrodictyon sibiricum.
№ 53, 53а, б/7351. Табл. XVI, фиг. 6, 7
Clathrodictyon burmantovskiense.
№ 55, 55а, б/7351. Табл. XVII, фиг. 3, 4 *
Clathrodictyon primordium.
№ 56, 56а—в/7351. Табл. XVII, фиг. 1, 2 *
Clathrodictyon kotuiense.
№ 57, 57а, б/7351. Табл. XVII, фиг. 5—8 *
Clathrodictyon cylindricum.
№ 59, 59а, б/7351. Табл. XVIII, фиг. 1, 4, 5
Clathrodictyon uralicum.
№ 61, 61а, б/7351. Табл. XIX, фиг. 1—4 *
Clathrodictyon krekovi.
№ 62, 62а, б/7351. Табл. XIX, фиг. 5, 6 *
Clathrodictyon compactum.
№ 63, 63а—в/7351. Табл. XIX, фиг. 7, 8 *
Clathrodictyon lazutkini.
№ 64, 64а, б/7351. Табл. XX, фиг. 1—3 *
Clathrodictyon obscurum.
№ 65, 65а—в/7351. Табл. XX, фиг. 4—6 *
Clathrodictyon ussvense.
№ 67, 67а, б/7351. Табл. XXI, фиг. 1, 2 *
Clathrodictyon lozvense.
№ 68, 68а—г/7351. Табл. XXI, фиг. 6—8 *
Clathrodictyon argentovskyi.
№ 69, 69а, б/7351. Табл. XXI, фиг. 3—5 *

Clathrodictyon artyschtense.
№ 70, 70а, б/7351. Табл. XXII, фиг. 1, 2
№ 71, 71а, б/7351. Табл. XXII, фиг. 3, 4
Clathrodictyon tyžnovi.
№ 72, 72а, б/7351. Табл. XXII, фиг. 5, 6 *
Clathrodictyon nicholsoni.
№ 75, 75а, б/7351. Табл. XXIII, фиг. 4, 5 *
Clathrodictyon teplovkense.
№ 76, 76а, б/7351. Табл. XXIII, фиг. 2, 3 *
Labechia sibirica.
№ 78, 78а, б/7351. Табл. XXIV, фиг. 6, 7 *
Labechia fusta.
№ 80, 80а—в/7351. Табл. XXV, фиг. 1, 2, 4, 5; табл. XXVI, фиг. 1
Labechia tumulosa.
№ 81, 81а—в/7351. Табл. XXVI, фиг. 3—6; табл. XXII, фиг. 1, 2
Labechia yakovlevi var. *tungusskana.*
№ 83, 83а—в/7351. Табл. XXVII, фиг. 5—7 *
Labechia venusta.
№ 85, 85а, б/7351. Табл. XXVIII, фиг. 3, 4 *
Labechia obscura.
№ 86, 86а—г/7351. Табл. XXVIII, фиг. 5—7 *
Labechia condensa.
№ 87, 87а, б/7351. Табл. XLI, фиг. 3, 4 *
Pseudolabechia tuberculata.
№ 88, 88а—в/7351. Табл. XXIX, фиг. 1—6; табл. XXXI, фиг. 1 *
Rosenella mogudjarica.
№ 89, 89а—г/7351. Табл. XXX, фиг. 1—3 *
Cryptophrugmus gracilis.
№ 91, 91а, б/7351. Табл. XXXI, фиг. 2, 3; табл. XXXII, фиг. 2
Beatricea undulatadirecta.
№ 98, 98а—г/7351. Табл. XXXV, фиг. 2—5; табл. XXXVI, фиг. 1, 2 *
Beatricea conica.
№ 99, 99а, б/7351. Табл. XXXVI, фиг. 3, 4; табл. XXXVII, фиг. 1; табл. XXXIX, фиг. 2, 3*
Beatricea sibirica.
№ 103, 103а—в/7351. Табл. XXXVIII, фиг. 1, 4, 5; табл. XXXIX, фиг. 1
№ 104, 104а/7351. Табл. XXXVIII, фиг. 2, 3
№ 105а/7351. Табл. XXXVIII, фиг. 6
Beatricea conosimilis.
№ 107, 107а, б/7351. Табл. XL, фиг. 1 *
Beatricea tenuipunctata.
№ 108, 108а, б/7351. Табл. XL, фиг. 3, 5, 6

№ 110, 110а, б/7351. Табл. XL, фиг. 2, 4; табл. XXXIII, фиг. 3

Beatricea bacula.

№ 111, 111а, б/7351. Табл. XLI, фиг. 1, 2 *

Stromatopora obrutschevi.

№ 112, 112а, б/7351. Табл. XLIII, фиг. 1

№ 113, 113а, б/7351. Табл. XLIII, фиг. 2

№ 114, 114а, б/7351. Табл. XLII, фиг. 6

Stromatopora ržonsnickii.

№ 115, 115а, б/7351. Табл. XLII, фиг. 2

№ 116, 116а, б/7351. Табл. XLII, фиг. 3, 4

Stromatopora lenensis.

№ 117, 117а—е/7351. Табл. XLIII, фиг. 3—7 *

Stromatopora ivanovi.

№ 118, 118а, б/7351. Табл. XLIV, фиг. 1, 2 *

Stromatopora fedorovi.

№ 119, 119а—д/7351. Табл. XLIV, фиг. 3—7 *

Stromatopora typica var. *dnestrensis.*

№ 120, 120а, б/7351. Табл. XLV, фиг. 1, 2 *

Stromatopora czekanowskii.

№ 125, 125а, б/7351. Табл. XLVI, фиг. 3, 4 *

Stromatopora dybowskii.

№ 127, 127а, б/7351. Табл. XLVII, фиг. 2, 4

Stromatopora compacta.

№ 130, 130а, б/7351. Табл. XLVIII, фиг. 3, 4

Stromatopora pellucida

№ 132, 132а, б/7351. Табл. XLVIII, фиг. 5, 6

Stromatopora adleri.

№ 134, 134а, б/7351. Табл. XLIX, фиг. 1, 2

№ 135, 135а, б/7351. Табл. XLIX, фиг. 3, 4; табл. LIX, фиг. 6

Stromatopora nices

№ 136, 136а—в/7351. Табл. XLIX, фиг. 5, 6 *

Stromatopora concentrica var. *minima.*

№ 137, 137а, б/7351. Табл. XLIX, фиг. 7, 8 *

Stromatopora tenuitextilis.

№ 140, 140а, б/7351. Табл. L, фиг. 4, 5 *

Stromatopora tcherskii.

№ 141, 141а, б/7351. Табл. L, фиг. 6—8 *

Stromatopora fortuita.

№ 142а, б/7351. Табл. LI, фиг. 1, 2 *

Stromatopora socialis.

№ 143, 143а, б/7351. Табл. LI, фиг. 3, 4 *

Stromatopora ramulosa.

№ 144, 144а, б/7351. Табл. LI, фиг. 5, 6 *

Stromatopora tenuilacunosa.

№ 145, 145а—в/7351. Табл. XLVII, фиг. 5, 6[1)]
Stromatopora artyschtensis.
№ 146, 146а—в/7351. Табл. LII, фиг. 7, 8 *
Stromatopora sternuntura.
№ 147, 147а, б/7351. Табл. XLV, фиг. 5—7; табл. XXXII, фиг. 4 *
Stromatopora pellucida var. *artyschtensis.*
№ 133/7351 (шл. нет)
Stromatopora tchihatcheffi.
№ 148, 148а, б/7351. Табл. LII, фиг. 3, 4 *
Stromatopora pulchra.
№ 149, 149а, б/7351. Табл. LIII, фиг. 1—3 *
Stromatopora baskuskanensis.
№ 151, 151а, б/7351. Табл. LIII, фиг. 7, 8 *
Stromatopora tumulus.
№ 152, 152а—в/7351. Табл. LIV, фиг. 1—3
Stromatopora schelomensis.
№ 154, 154а, б/7351. Табл. LIV, фиг. 5, 6
Stromatopora minima.
№ 155, 155а, б/7351. Табл. LIV, фиг. 7, 8 *
Stromatopora flexuosa.
№ 157, 157а, б/7351. Табл. LV, фиг. 3, 4, 5
Stromatopora tynijaensis.
№ 162, 162а—г/7351. Табл. LVII, фиг. 3—6 *
Stromatopora carteri var. *devonica.*
№ 163, 163а, б/7351. Табл. LXVII, фиг. 7, 8 *
Ferestromatopora krupennikovi.
№ 165, 165а, б/7351. Табл. LVIII, фиг. 2—5
Ferestromatopora krupennikovi var. *talovensis.*
№ 167, 167а—г/7351. Табл. LVIII, фиг. 8; табл. LIX, фиг. 1
Ferestromatopora tyrganensis.
№ 168, 168а, б/7351. Табл. LIX, фиг. 2, 3 *
Stromatoporella kiritschenkoi.
№ 169а, б/7351. Табл. LXIV, фиг. 6, 7 *
Stromatoporella annularis.
№ 170, 170а—в/7351. Табл. LX, фиг. 1—3 *
Stromatoporella compostia.
№ 172, 172а/7351. Табл. LX, фиг. 7 *
Stromatoporella tuberosa.
№ 173, 173а, б/7351. Табл. LXI, фиг. 1, 2; табл. LX, фиг. 8 *
Stromatoporella artyschtensis.
№ 174, 174а, б/7351. Табл. LXI, фиг. 3, 4 *
Stromatoporella loutouguini var. *uralensis.*
№ 176, 176а, б/7351. Табл. LXI, фиг. 7, 8 *

[1)] Экземпляр отнесен автором к роду *Trupetostroma* после публикации.

Stromatoporella tschernensis.
№ 178, 178а, б/7351. Табл. LXII, фиг. 3, 4 *
Stromatoporella brylkini.
№ 180, 180а, б/7351. Табл. LXIII, фиг. 1, 2
№ 181, 181а, б/7351. Табл. LXIII, фиг. 3, 4
№ 182, 182а, б/7351. Табл. LXIII, фиг. 5, 6
№ 184, 184а, б/7351. Табл. LXIII, фиг. 8, 9
Stromatoporella mirabilis.
№ 186, 186а, б/7351. Табл. LXIV, фиг. 2—5 *
Stromatoporella strelensis.
№ 187, 187а, б/7351. Табл. LXV, фиг. 1—4 *
Stromatoporella mamontoviensis.
№ 188, 188а, б/7351. Табл. LXV, фиг. 7, 8 *
Stromatoporella bractealis.
№ 189, 189а, б/7351. Табл. LV, фиг. 7; табл. LXV, фиг. 5, 6 *
Stromatoporella irregularis.
№ 192, 192а, б/7351. Табл. LXVI, фиг. 5, 6 *
Stromatoporella redrini.
№ 193, 193а, б/7351. Табл. LXVI, фиг. 7, 8 *
Stromatoporella conpulata.
№ 194, 194а, б/7351. Табл. LXVII, фиг. 1, 2 *
Stromatoporella kinensis.
№ 195, 195а, б/7351. Табл. LXVII, фиг. 3, 4 *
Stromatoporella ivdeliensis.
№ 196, 196а, б/7351. Табл. LXVII, фиг. 5, 6 *
Stromatoporella tortuosa.
№ 197, 197а, б/7351. Табл. LXXXIX, фиг. 1—4*
Syringostroma sibiricum.
№ 198, 198а, б/7351. Табл. LXVIII, фиг. 1, 2 *
Syringostroma sibiricum var. *secunda.*
№ 199, 199а, б/7351. Табл. LXVIII, фиг. 5, 6 *
Syringostroma sibiricum var. *prima.*
№ 200, 200а, б/7351. Табл. LXVIII, фиг. 3, 4 *
Syringostroma devonicum.
№ 202, 202а—г/7351. Табл. LXIX, фиг. 2—4 *
Syringostroma padalkoi.
№ 203, 203а, б/7351. Табл. LXIX, фиг. 5—8 *
Syringostroma tyrganense.
№ 204, 204а—в/7351. Табл. LXX, фиг. 1—3 *
Syringostroma singulare.
№ 205, 205а, б/7351. Табл. LXX, фиг. 4—7 *
Syringostroma salairense.
№ 206, 206а, б/7351. Табл. LXXI, фиг. 1, 2 *
Syringostroma foveolatum var. *sibirica.*
№ 207, 207а, б/7351. Табл. LXXI, фиг. 3—6 *
Syringostroma kielzeense.

№ 208, 208а—д/7351. Табл. LXXI, фиг. 7, 8 *; табл. LXXII, фиг. 1, 2 *

Idiostroma uralicum.

№ 209, 209а—в/7351. Табл. LXXIII, фиг. 1—5 *

Idiostroma cumulus.

№ 210, 210а—в/7351. Табл. LXXIV, фиг. 1—4 *

Idiostroma concinum.

№ 212, 212а, б/7351. Табл. LXXVI, фиг. 1, 2

№ 213, 213а—в/7351. Табл. LXXVI, фиг. 3—5

Hermatostroma stellagerum.

№ 214, 214а, б/7351. Табл. LXXVI, фиг. 6—8 *

Hermatostroma tschernyschevi.

№ 215, 215а, б/7351. Табл. LXXVII, фиг. 1, 2 *

Hermatostroma bonum.

№ 216, 216а, б/7351. Табл. LXXVII, фиг. 3—6*

Hermatostroma vulgares.

№ 217, 217а, б/7351. Табл. LXXVII, фиг. 7, 8 *

Hermatostroma latum.

№ 218, 218а, б/7351. Табл. LXXVIII, фиг. 3, 4 *

Hermatostroma rectum.

№ 219, 219а, б/7351. Табл. LXXVIII, фиг. 5, 6 *

Hermatostroma kumpani.

№ 220, 220а, б/7351. Табл. LXXVIII, фиг. 1, 2*

Hermatostroma flexuosum.

№ 221, 221а, б/7351. Табл. LXXVIII, фиг. 7—9 *

Hermatostroma mamelonse.

№ 222, 222а, б/7351. Табл. LXXIX, фиг. 1, 2 *

Hermatostroma safonovi.

№ 223, 223а, б/7351. Табл. LXXIX, фиг. 3, 4 *

Hermatostroma undulatum.

№ 224, 224а, б/7351. Табл. LXXIX, фиг. 5, 6 *

Hermatostroma roullieri.

№ 225, 225а—г/7351. Табл. LXXII, фиг. 3; табл. LXXIX, фиг. 7

Hermatostroma tikhii.

№ 226, 226а, б/7351. Табл. LXXII, фиг. 4—6 *

Amphipora alaiskiensis.

№ 229, 229а, б/7351. Табл. LXXXI, фиг. 1—3 *

Amphipora messerschmidti.

№ 230а/7351. Табл. LXXXI, фиг. 4—8 *

Amphipora krekovi.

№ 235, 235а, б/7351. Табл. LXXXIII, фиг. 4—9 *

Amphipora batschatensis.
№ 175а/7351. Табл. LXXXIV, фиг. 1, 2 *
Paramphipora mirabilis.
№ 236, 236а, б/7351. Табл. LXXXIV, фиг. 3, 4*
Paramphipora minuta.
№ 177/7351. Табл. LXXXIV, фиг. 5, 6 *
Paramphipora vesiculosa.
№ 179/7351. Табл. LXXXIV, фиг. 10—13 *
Paramphipora raritatis.
№ 237, 237а, б/7351. Табл. LXXXV, фиг. 2—8*
Paramphipora raris.
№ 238, 238а, б/7351. Табл. LXXXV, фиг. 9, 11, 13, 14 *
Paramphipora rasilis.
№ 239, 239а, б/7351. Табл. LXXXV, фиг. 18—20 *
Paramphipora humulis.
№ 240а/7351. Табл. LXXXV, фиг. 15—17 *
Paramphipora levis.
№ 241, 241а/7351. Табл. LXXXVI, фиг. 1—3 *
Paramphipora facies.
№ 242, 242а, б/7351. Табл. LXXXVI, фиг. 4—7*
Paramphipora blokhini.
№ 243, 243а—в/7351. Табл. LXXXVI, фиг. 10, 11, 13, 15
Paramphipora recta.
№ 245, 245а, б/7351. Табл. LXXXVI, фиг. 16, 17
Paramphipora tschussovensis.
№ 247, 247а, б/7351. Табл. LXXXVI, фиг. 8, 9; табл. LXXXVII, фиг. 3—5
№ 248, 248а, б/7351. Табл. LXXXVIII, фиг. 1—4

131. ЯВОРСКИЙ В. И. (колл. № 7351). *Stromatoporoidea* Советского Союза. Часть вторая. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 18, 1957, 78 с., 43 пал. табл.

Вторая часть монографии является продолжением обобщающей сводки по строматопороидеям из отложений O, S, D, I и K. Для родов, описание которых не вошло в первую часть, приведена характеристика родовых признаков. Всего описано 88 видов, из них 74 новые и 7 новых вариететов. В коллекции новых видов 65, вариететов 7.

Голотипы и синтипы:

Actinostroma colymense Yavorsky.
№ 249, 249а, б/7351. Табл. I, фиг. 1, 2; табл. IV, фиг. 2 *
Actinostroma ignotum.
№ 251, 251а—в/7351. Табл. I, фиг. 5—7 *

Actinostroma mirum.
№ 252, 252а, б/7351. Табл. II, фиг. 1, 2 *
Gerronostroma pesteriovense.
№ 255, 255а, б/7351. Табл. III, фиг. 4—6 *
Gerronostroma uralense.
№ 256, 256а, б/7351. Табл. III, фиг. 7, 8 *
Gerronostroma opimum.
№ 257, 257а, б/7351. Табл. III, фиг. 9; табл. IV, фиг. 1 *
Gerronostroma obliquum var. *recta.*
№ 258а, б/7351. Табл. IV, фиг. 3, 4 *
Gerronostroma gromotuchense.
№ 259, 259а, б/7351. Табл. IV, фиг. 7; табл. V, фиг. 1, 2 *
Gerronostroma obliquum.
№ 260, 260а, б/7351. Табл. IV, фиг. 5, 6 *
Gerronostroma solomenense.
№ 261а, б/7351. Табл. V, фиг. 3, 4
Gerronostroma schelonense.
№ 263, 263а, б/7351. Табл. V, фиг. 6, 7 *
Gerronostroma porkhovense.
№ 264, 264а, б/7351. Табл. VI, фиг. 1, 2 *
Clathrodictyon tunguskanum.
№ 265, 265а, б/7351. Табл. VI, фиг. 3—5 *
Clathrodictyon voronovi.
№ 266, 266а, б/7351. Табл. VI, фиг. 6, 7 *
Clathrodictyon tenerum.
№ 267, 267а, б/7351. Табл. VII, фиг. 1—3 *
Clathrodictyon pustulatum.
№ 268, 268а, б/7351. Табл. XLII, фиг. 4—6 *
Clathrodictyon composirum.
№ 269, 269а, б/7351. Табл. VII, фиг. 4—7 *
Clathrodictyon primordium var. *grandis.*
№ 270, 270а—в/7351. Табл. VII, фиг. 1, 4
№ 271, 271а, б/7351. Табл. VII, фиг. 2, 3
Clathrodictyon spissum.
№ 272, 272а, б/7351. Табл. VIII, фиг. 5, 8 *
Clathrodictyon izylense.
№ 273, 273а, б/7351. Табл. IX, фиг. 1, 4
№ 274а, б/7351. Табл. IX, фиг. 2, 3
Clathrodictyon glubokense.
№ 276, 276а, б/7351. Табл. IX, фиг. 6, 8, 9
Clathrodictyon tumulosum.
№ 278, 278а, б/7351. Табл. X, фиг. 1, 2 *
Clathrodictyon tortuosum.
№ 280, 280а, б/7351. Табл. X, фиг. 3, 4; табл. XX, фиг. 9 *

Clathrodictyon boutovi.
№ 281, 281а, б/7351. Табл. X, фиг. 6, 7; табл. XI, фиг. 1, 2 *
Clathrodictyon livenskense.
№ 282, 282а, б/7351. Табл. XI, фиг. 3—6 *
Burgundia barremensis.
№ 284а, б/7351. Табл. XII, фиг. 2, 3
Stylodictyon vaigatschense.
№ 285, 285а, б/7351. Табл. XII, фиг. 4, 5 *
Labechia regularis var. *kotuensis.*
№ 286а, б/7351. Табл. XIII, фиг. 1, 2 *
Labechia regularis var. *tuvensis.*
№ 287, 287а, б/7351. Табл. XLIII, фиг. 1—3 *
Labechia cumularis.
№ 289а, б/7351. Табл. XIII, фиг. 5—7 *
Labechia astroites.
№ 290, 290а, б/7351. Табл. XIII, фиг. 8; табл. XIV, фиг. 1 *
Labechia golikovensis.
№ 291, 291а, б/7351. Табл. XIV, фиг. 2—5 *
Labechia vodorezovi.
№ 297, 297а, б/7351. Табл. XV, фиг. 6, 8
Labechia modica.
№ 298, 298а, б/7351. Табл. XVI, фиг. 2, 3
№ 299, 299а, б/7351. Табл. XVI, фиг. 1, 4
Labechia radiosa.
№ 301, 301а, б/7351. Табл. XVI, фиг. 7; табл. XVII, фиг. 1, 2 *
Pseudolabechia convexa.
№ 302, 302а—в/7351. Табл. XVII, фиг. 3; табл. XVIII, фиг. 1, 3
Pseudolabechia monstrum.
№ 304а, б/7351. Табл. XVIII, фиг. 4, 5; табл. XXXII, фиг. 10 *
Pseudolabechia caucasica.
№ 305, 305а, б/7351. Табл. XVIII, фиг. 6—8 *
Pseudolabechia gracilis.
№ 306, 306а, б/7351. Табл. XIX, фиг. 1—3 *
Rosenella irregularis.
№ 308, 308а, б/7351. Табл. XX, фиг. 4—6 *
Rosenella uralensis.
№ 310а, б/7351. Табл. XXI, фиг. 1, 2 *
Stromatocerium kouliki.
№ 311, 311а, б/7351. Табл. XXI, фиг. 3—5 *
Chalazodes sibiricum.
№ 312, 312а, б/7351. Табл. XXI, фиг. 6—9 *
Beatricea vulgaris.
№ 313, 313а, б/7351. Табл. XXII, фиг. 1, 2 *

Stromatopora membrosa.
№ 315, 315а, б/7351. Табл. XXIII, фиг. 2—4 *
Stromatopora ržonsnickii var. *njuilensis.*
№ 317, 317а—в/7351. Табл. XXIV, фиг. 2—4 *
Stromatopora tenuitextilis.
№ 318, 318а, б/7351. Табл. XXIV, фиг. 5, 6 *
Stromatopora cylindrica.
№ 319, 319а, б/7351. Табл. XXV, фиг. 1, 2 *
Stromatopora sequanensis.
№ 322а, б/7351. Табл. XXVI, фиг. 1—4
Stromatoporella tomiensis.
№ 325, 325а—в/7351. Табл. XXVII, фиг. 1—3 *
Stromatoporella izylensis.
№ 327, 327а, б/7351. Табл. XXVII, фиг. 7, 8; табл. XXVIII, фиг. 1, 2 *
Syringostroma rugosum.
№ 328, 328а, б/7351. Табл. XXVIII, фиг. 3—5 *
Hermatostroma omulevskense.
№ 330, 330а, б/7351. Табл. XXIX, фиг. 3, 4
Hermatostroma usitatum.
№ 331, 331а, б/7351. Табл. XXIX, фиг. 5—7 *
Hermatostroma abense.
№ 332, 332а, б/7351. Табл. XXIX, фиг. 8; табл. XXX, фиг. 1 *
Hermatostroma porkhovense.
№ 333, 333а, б/7351. Табл. XXX, фиг. 2—4 *
Stachyodes gracilis var. *kurnetskensis.*
№ 334, 334а—в/7351. Табл. XXX, фиг. 5—8; табл. XXXI, фиг. 1—4 *
Stachyodes tomiensis.
№ 335а, б/7351. Табл. XXXI, фиг. 5—7; табл. XXXII, фиг. 1 *
Stachyodes glubokensis.
№ 336, 336а—в/7351. Табл. XXXII, фиг. 2—5 *
Stachyodes odinekensis.
№ 337, 337а, б/7351. Табл. XXXIII, фиг. 1—9 *
Amphipora karmakensis.
№ 339, 339а—в/7351. Табл. XXXIV, фиг. 1—4 *
Amphipora intexta.
№ 340, 340а/7351. Табл. XXXIV, фиг. 5—9 *
Amphipora pinguis.
№ 342, 342а, б/7351. Табл. XXXV, фиг. 1—5 *
Amphipora pinguis var. *izylensis.*
№ 343, 343а, б/7351. Табл. XXXVI, фиг. 1—8 *
Amphipora uralensis.
№ 344, 344а, б/7351. Табл. XXXVI, фиг. 9, 10; табл. XXXVII, фиг. 1, 2 *

Amphipora spissa.
№ 345, 345а—в/7351. Табл. XXXVII, фиг. 3—7*
Paramphipora tenuis.
№ 346, 346а, б/7351. Табл. XXXVIII, фиг. 1—3 *
Paramphipora tomiensis.
№ 347, 347а—в/7351. Табл. XXXVIII, фиг. 4—11 *
Paramphipora dilucida.
№ 348, 348а/7351. Табл. XXXVIII, фиг. 14—16 *
Paramphipora difficilis.
№ 350, 350а—г/7351. Табл. XXXIX, фиг. 4—16 *
Paramphipora devonica.
№ 1000а, б/7351. Табл. XXXIX, фиг. 19, 20; табл. XL, фиг. 1, 2 *
Paramphipora maculosa.
№ 352, 352а—в/7351. Табл. XL, фиг. 3—7 *
Paramphipora perforata.
№ 1005а/7351. Табл. XL, фиг. 8—12 *

132. ЯВОРСКИЙ В. И. (колл. № 7351). *Stromatoporoidea* Советского Союза. Часть третья. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., вып. 44, 1961, 63 с., 38 пал. табл.

В работе изложены результаты дальнейшего изучения строматопороидей из отложений с ордовика по карбон включительно, с учетом сведений, опубликованных со времени публикации части II (1957). Описано 69 видов, из них 3 в открытой номенклатуре, 6 вариететов, 3 формы с родовым определением. Новых видов 54, 2 новых рода, в коллекции новых видов 49.

Голотипы и синтипы:

Actinostroma malcevi Yavorsky.
№ 353, 353а, б/7351. Табл. I, фиг. 1, 2 *
Actinostroma tenuipalum Yavor.
№ 354, 354а, б/7351. Табл. I, фиг. 3, 4 *
Gerronostroma undatum.
№ 355, 355а, б/7351. Табл. I, фиг. 5—7 *
Gerronostroma tablikense.
№ 356, 356а, б/7351. Табл. I, фиг. 8
№ 357, 357а, б/7351. Табл. II, фиг. 3, 4
Gerronostroma regulare.
№ 359, 359а, б/7351. Табл. II, фиг. 5, 6 *
Gerronostroma dragunovi.
№ 360, 360а, б/7351. Табл. II, фиг. 7, 8; табл. III, фиг. 1 *

Gerronostroma komiense.
№ 361, 361а, б/7351. Табл. III, фиг. 2—4 *
Gerronostroma kitatense.
№ 365, 365а—в/7351. Табл. IV, фиг. 2, 4
Gerronostroma nikitini.
№ 367, 367а, б/7351. Табл. IV, фиг. 6, 7 *
Clathrostroma nelynense.
№ 368, 368а, б/7351. Табл. IV, фиг. 8; табл. V, фиг. 1, 2 *
Clathrostroma tumulum.
№ 370, 370а, б/7351. Табл. V, фиг. 5—7 *
Clathrostroma jukkense.
№ 371, 371а, б/7351. Табл. V, фиг. 8; табл. VI, фиг. 1 *
Clathrostroma petschorense.
№ 372, 372а, б/7351. Табл. VI, фиг. 2—4 *
Clathrostroma implicitum.
№ 373, 373а—в/7351. Табл. VI, фиг. 5—7 *
Clathrostroma vodorezovi.
№ 374, 374а—в/7351. Табл. XV, фиг. 4—6 *
Clathrodictyon mamelonse.
№ 381, 381а, б/7351. Табл. VIII, фиг. 3; табл. IX, фиг. 2, 3
Clathrodictyon corrugare.
№ 390, 390а, б/7351. Табл. XIII, фиг. 2, 3 *
Clathrodictyon tumulum.
№ 397а, б/7351. Табл. XV, фиг. 1 *
Labechia irregularis.
№ 398, 398а—д/7351. Табл. XVI, фиг. 2, 3
№ 399, 399а—в/7351. Табл. XVI, фиг.1, 4, 5
Labechia socialis.
№ 402, 402а, б/7351. Табл. XVII, фиг. 5, 6 *
Labechia tschalbygensis.
№ 403, 403а—г/7351. Табл. XVII, фиг. 7, 8 *
Labechia mutabilis.
№ 404, 404а, б/7351. Табл. XVIII, фиг. 1, 2 *
Labechia kurganensis.
№ 405, 405а, б/7351. Табл. XVIII, фиг. 3—6 *
Labechia kudukensis.
№ 406, 406а, б/7351. Табл. XVIII, фиг. 7, 8 *
Labechia mirabilis.
№ 407, 407а—д/7351. Табл. XIX, фиг. 2—6; табл. XX, фиг. 1, 2 *
Labechia koltubensis.
№ 408а—г/7351. Табл. XXVII, фиг. 5
№ 409а—в/7351. Табл. XXVII, фиг. 4
Cystostroma rarus.

№ 1006а—д/7351. Табл. XIX, фиг. 2—6; табл. XX, фиг. 1, 2 *

Cystostroma sarytschelekense.

№ 410, 410а, б/7351. Табл. XX, фиг. 3, 4 *

Stromatopora tuvensis.

№ 411а, б/7351. Табл. XXI, фиг. 1, 6

№ 415а, б/7351. Табл. XXI, фиг. 3, 8

Stromatopora gliadenensis.

№ 419, 419а, б/7351. Табл. XXII, фиг. 6—8 *

Stromatopora vorkutensis.

№ 420, 420а, б/7351. Табл. XXIII, фиг. 1—3 *

Stromatopora aspectabilis.

№ 421, 421а, б/7351. Табл. XXIII, фиг. 4, 6, 7*

Stromatopora gurjevskensis.

№ 423, 423а—г/7351. Табл. XXIV, фиг. 3—6 *

Stromatopora obscura.

№ 424, 424а—е/7351. Табл. XXIV, фиг. 7; табл. XXV, фиг. 1, 2 *

Stromatopora boiarschinovi.

№ 425, 425а, б/7351. Табл. XXV, фиг. 3—5 *

Stromatopora yakovlevi.

№ 426, 426а, б/7351. Табл. XXV, фиг. 6, 8

№ 427а, б/7351. Табл. XXV, фиг. 7; табл. XXVI, фиг. 1—3

Stromatopora karaensis.

№ 429, 429а, б/7351. Табл. XXVII, фиг. 1—3 *

Parallelopora typica.

№ 430а—в/7351. Табл. XXVI, фиг. 7, 8 *

Parallelopora ulatauensis.

№ 431а—д/7351. Табл. XXVII, фиг. 6—8; табл. XXX, фиг. 2

Parallelopora vojvensis.

№ 434, 434а—в/7351. Табл. XXVIII, фиг. 1—4, 6

Parallelopora ponomarevi.

№ 436, 436а, б/7351. Табл. XXVIII, фиг. 7, 8; табл. XXIX, фиг. 1—3 *

Parallelopora kolymensis.

№ 438а—в/7351. Табл. XXIX, фиг. 4, 6, 7

Syringostroma subtilis.

№ 440, 440а, б/7351. Табл. XXX, фиг. 7, 8 *

Stachyodes singularis.

№ 443а—е/7351. Табл. XXXIII, фиг. 1—4; табл. XXXII, фиг. 1—8 *

Stachyodes radiata.

№ 444а, б/7351. Табл. XXXIII, фиг. 9, 10 *

Stachyodes venusta.

№ 1008а, б/7351. Табл. XXXIV, фиг. 1—5 *

Vicinustachyodes mirabilis.
№ 1010а, б/7351. Табл. XXXVI, фиг. 1—3 *
Vicinustachyodes perforata.
№ 1011а, б/7351. Табл. XXXVI, фиг. 4—14 *
Syringoporinus sokolovi.
№ 448, 448а, б/7351. Табл. XXXVIII, фиг. 1, 3

133. ЯВОРСКИЙ В. И. (колл. № 7351). *Stromatoporoidea* Советского Союза. Часть четвертая. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 87, 1963, 94 с., 31 пал. табл.

Автором предполагалось этой частью завершить монографию по изучению группы и на основе дополнительных материалов им сделаны исправления в определениях ряда форм, описанных ранее. Всего описано 67 видов строматопорат на гидрактиноидной и тиллопороидной групп, 6 видов в открытой номенклатуре, 7 вариететов, 3 формы с определениями до рода, 7 с новыми наименованиями. Новых видов 59, 1 новый род. В коллекции 54 новых вида.

Голотипы и синтипы:

Actinostroma barlykense Yavorsky.
№ 450, 450а—д/7351. Табл. I, фиг. 1—3 *
Actinostroma khondelense Yavor.
№ 451, 451а, б/7351. Табл. I, фиг. 4, 5 *
Actinostroma crassulaminatum.
№ 454, 454а—в/7351. Табл. I, фиг. 8; табл. II, фиг. 1 *
Actinostroma singulare.
№ 456, 456а, б/7351. Табл. II, фиг. 2, 3 *
Atelodictyon lopatini.
№ 457, 457а—в/7351. Табл. III, фиг. 1—3 *
Atelodictyon obliquus.
№ 459, 459а—в/7351. Табл. IV, фиг. 2, 3 *
Atelodictyon batalovense.
№ 461, 461а, б/7351. Табл. IV, фиг. 6, 7 *
Atelodictyon urazovense.
№ 462, 462а, б/7351. Табл. IV, фиг. 8 *
Atelodictyon curvus.
№ 463, 463а, б/7351. Табл. IV, фиг. 9; табл. V, фиг. 1
Atelodictyon anadyrense.
№ 465, 465а, б/7351. Табл. V, фиг. 3, 4 *
Atelodictyon ruginosum.
№ 466, 466а—в/7351. Табл. V, фиг. 5—8 *
Intexodictyon barlykense.
№ 467, 467а, б/7351. Табл. VI, фиг. 1—3 *
Intexodictyon copulatum.
№ 468, 468а, б/7351. Табл. VII, фиг. 6—8 *

Intexodictyon perplexum.
№ 469, 469а—ж/7351. Табл. VI, фиг. 6, 7; табл. VIII, фиг. 1—4 *
Clathrodictyon anguste.
№ 470, 470а, б/7351. Табл. VI, фиг. 4, 5 *
Clathrodictyon ottykense.
№ 471, 471а, б/7351. Табл. VII, фиг. 1, 2 *
Anostylostroma sibiricus.
№ 473, 473а, б/7351. Табл. VIII, фиг. 5—6 *
Anostylostroma krapotkini.
№ 474, 474а, б/7351. Табл. VIII, фиг. 7—9 *
Labechia frutelosa.
№ 475, 475а, б/7351. Табл. IX, фиг. 1, 2 *
Labechia communis.
№ 476, 476а, б/7351. Табл. IX, фиг. 3 *
Labechia tunguskensis.
№ 478, 478а/7351. Табл. XI, фиг. 2 *
Rosenella tunguskensis.
№ 480а, б/7351. Табл. XI, фиг. 2, 3 *
Cystostroma tortuosum.
№ 482, 482а, б/7351. Табл. XII, фиг. 1, 2 *
Cystostroma kozhimense.
№ 483, 483а/7351. Табл. XII, фиг. 3—5 *
Cystostroma regulare.
№ 484, 484а, б/7351. Табл. XIV, фиг. 1, 2 *
Stromatocerium miraculum.
№ 485, 485а, б/7351. Табл. XIII, фиг. 6, 7 *
Beatricea inaequalis.
№ 487, 487а, б/7351. Табл. XV, фиг. 3, 7
Beatricea mediupustulis.
№ 490, 490а, б/7351. Табл. XVI, фиг. 4, 5 *
Beatricea tenuipustulis.
№ 491, 491а, б/7351. Табл. XIV, фиг. 3; табл. XVI, фиг. 6 *
Stromatopora difficilis.
№ 493, 493а, б/7351. Табл. XVII, фиг. 5, 6 *
Stromatopora aequalis.
№ 495, 495а, б/7351. Табл. XVIII, фиг. 1, 2 *
Stromatopora enissejensis.
№ 499а, б/7351. Табл. XIX, фиг. 1, 2 *
Stromatopora adakensis.
№ 500, 500а, б/7351. Табл. XIX, фиг. 5, 6 *
Parallelopora iljinskiensis.
№ 501, 501а/7351. Табл. XIX, фиг. 7; табл. XX, фиг. 1 *
Parallelopora urazovensis.
№ 502, 502а—г/7351. Табл. XX, фиг. 2—4 *

Parallelopora crassa.
№ 503, 503а, б/7351. Табл. XX, фиг. 5—7 *
Parallelopora auschkulensis.
№ 504, 504а, б/7351. Табл. XX, фиг. 8; табл. XXI, фиг. 1—3 *
Parallelopora stricta.
№ 505, 505а, б/7351. Табл. XIV, фиг. 4, 5 *
Parallelopora kozhimensis.
№ 506, 506а—г/7351. Табл. XIV, фиг. 6—8 *
Трupetostroma spatiosum.
№ 507, 507а, б/7351. Табл. XXI, фиг. 4, 8
№ 510, 510а, б/7351. Табл. XXI, фиг. 7, 9
Synthetostroma timanicum.
№ 511, 511а, б/7351. Табл. XXII, фиг. 1—4 *
Synthetostroma ukhtense.
№ 512а, б/7351. Табл. XXII, фиг. 5—7 *
Synthetostroma crassum.
№ 513, 513а, б/7351. Табл. XXII, фиг. 8, 9; табл. XXIII, фиг. 1, 2 *
Synthetostroma tumulum.
№ 514а, б/7351. Табл. XXIII, фиг. 3—5 *
Synthetostroma opimum.
№ 515, 515а, б/7351. Табл. XXIII, фиг. 6—8 *
Stachyodes tuberosa.
№ 516а—в/7351. Табл. XXIV, фиг. 1—9; табл. XXV, фиг. 1—3 *
Stachyodes inexplorata.
№ 518а/7351. Табл. XXV, фиг. 7 *
Stachyodes insolita.
№ 520а, б/7351. Табл. XXVI, фиг. 2—4 *
Stachyodes sagittula.
№ 521, 521а, б/7351. Табл. XXX, фиг. 1—3
Stachyodes tenuitextilis.
№ 531а/7351. Табл. XXIX, фиг. 1, 3
Stachyodes disparvesiculosa.
№ 534а/7351. Табл. XXX, фиг. 7—9, 11
Amphipora aequalis.
№ 537а/7351. Табл. XXXI, фиг. 7—9
Amphipora amplevesiculosis.
№ 538а, б/7351. Табл. XXVI, фиг. 6, 7; табл. XXXI, фиг. 11, 12
Paramphipora laxeperforata.
№ 539а/7351. Табл. XXXI, фиг. 14 *

134. ЯВОРСКИЙ В. И. (колл. № 9566). Некоторые позднеордовикские строматопороидеи Тувы. Ежег. ВПО; т. XVIII, 1968, с. 48—53, 3 пал. табл.

Описана небольшая коллекция строматопорат из отложений верхнекаргинской подсвиты юго-западной Тувы. Всего 8 видов, из них 5 новых; в коллекции 4 новых вида.

Голотипы:

Labechia ordovikensis Yavorsky.
№ 1а, б/9566. Табл. I, фиг. 1, 2
Labechia tuvensis Yavor.
№ 2а, б/9566. Табл. I, фиг. 3, 4
Labechia densocolumna.
№ 4а, б/9566. Табл. II, фиг. 1, 2
Cystostroma ordovikense.
№ 7а—в/9566. Табл. III, фиг. 1—3

135. ЯКОВЛЕВ Н. Н. (колл. № 6112). О некоторых цистоидеях из нижнего силура Урала. Мат. ЦНИГРИ, палеонтология и стратиграфия, сб. 3, 1937, 2 с., 1 пал. табл.

Описан 1 новый вид цистоидей и 2 формы с родовым определением, находки которых, совместно с трилобитами, позволили автору уточнить возраст песчаников р. Белой.

Синтипы:

Mesocystis jakeli Yakovlev.
№ 1/6112. Табл. I, фиг. 3
№ 2/6112. Табл. I, фиг. 4
№ 3/6112. Табл. I, фиг. 5
№ 4/6112. Табл. I, фиг. 6
№ 5/6112. Табл. I, фиг. 7

СИЛУР

136. АБУШИК А. Ф. (колл. № 8246). Новый род лудловских остракод Приполярного Урала. Мат. по геол. и пол. ископ. Урала. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 86, 1962, с. 83—85.

Изучены и описаны остатки представителей семейства *Leperditiidae* с ранее не описанным строением створок, что позволило отнести находки к новому роду и виду.

Голотип:

Bispinitia uralica Abushik.
№ 1/8246. Табл. I, фиг. 1

137. АБУШИК А. Ф. (колл. № 8247). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. II, часть II, 1968, с. 233.

Описано два новых вида остракод из отложений силура и девона.

Голотипы:

Kiaeria alata Abushik.
№ 6/8247. Табл. 58, фиг. 7
Herrmannina levitskii.
№ 1/8247. Табл. 58, фиг. 11

138. АБУШИК А. Ф. (колл. № 9584). Лудловские остракоды Туркестанского хребта (Средняя Азия). Палеонт журн. № 3, 1968, с. 68—76, 2 пал. табл.

Изученая коллекция остракод из исфаринских слоев Средней Азии значительно расширила представление о стратиграфическом и географическом распространении силурийских остракод. Описан 1 новый род, 10 видов, из которых 9 — новых.

Голотипы:

Moierina triangula Abushik.
№ 4/9584. Табл. VII, фиг. 2
Ispharaella ispharaensis.
№ 5/9584. Табл. VII, фиг. 5
Cavellina idonea.
№ 7/9584. Табл. VIII, фиг. 3
Microcheilinella moderata.
№ 10/9584. Табл. VII, фиг. 7
Microcheilinella nitida.
№ 11/9584. Табл. VII, фиг. 8
Bairdiocypris simplex.
№ 12/9584. Табл. VII, фиг. 9
Baschkirina longa.
№ 15/9584. Табл. VII, фиг. 11
Acanthoscapha subnavicula.
№ 16/9584. Табл. VIII, фиг. 6
Acanthoscapha alata.
№ 20/9584. Табл. VIII, фиг. 10

139. АБУШИК А. Ф. (колл. № 11192). Силурийские остракоды Северо-Запада Сибирской платформы. В сб.: «Стратиграфия и палеонтология докембрия и палеозоя севера Сибири» НИИГА, 1977, с. 97—122, 3 пал. табл.

В результате анализа коллекции остракод выявлено 5 комплексов, сменяющих друг друга в разрезе, отмечена эндемичность позднелландоверийско-ранневенлокских сообществ, предложена схема биостратиграфического расчленения отложений. Описан 21 вид, из них 15 новых, 2 новых рода и 1 форма с родовым определением. В колл. 14 новых видов.

Голотипы:

Hallatia infida Abushik.
№ 1/11192. Табл. I, фиг. 1
Leiocyamus complanatus.
№ 3/11192. Табл. I, фиг. 3

Signetopsis cardinata.
№ 6/11192. Табл. I, фиг. 6
Hatangeus armatus.
№ 9/11192. Табл. I, фиг. 9
Hatangeus foveatus.
№ 11/11192. Табл. I, фиг. 11
Hatangeus ambiquus.
№ 12/11192. Табл. I, фиг. 12
Norilskinia norilica.
№ 18/11192. Табл. II, фиг. 1
Norilskinia binodosa.
№ 20/11192. Табл. II, фиг. 3
Norilskinia cuspidata.
№ 23/11192. Табл. III, фиг. 1
Eukloedenella partibile.
№ 27/11192. Табл. III, фиг. 4
Cavellina fabacea.
№ 29/11192. Табл. III, фиг. 6
Thrallella bialveolata.
№ 32/11192. Табл. III, фиг. 9
Tubulibairdia tumida.
№ 33/11192. Табл. III, фиг. 10
Pachydomella anastasijae.
№ 35/11192. Табл. III, фиг. 13

140. АБУШИК А. Ф. (колл. № 11633). Силурийские *Microcheilinella* (Ostracoda) Подолии. Ежег. ВПО, т. XXII, «Наука», Л., 1979, с. 43—59, 3 пал. табл.

Изучены представители группы остракод в Подолии ранее не исследовавшиеся. Описано 13 видов, из них 7 новых, приведена таблица распространения 20 видов рассмотренного рода.

Голотипы:

Microcheilinella subvariolaris Abushik.
№ 2/11633. Табл. I, фиг. 6
Microcheilinella acutafiniformis.
№ 5/11633. Табл. II, фиг. 6
Microcheilinella acuta.
№ 6/11633. Табл. II, фиг. 3
Microcheilinella mukschensis.
№ 10/11633. Табл. III, фиг. 1
Microcheilinella planodorsa.
№ 15/11633. Табл. III, фиг. 3
Microcheilinella trapeziformis.
№ 16/11633. Табл. III, фиг. 8
Microcheilinella fabaria.
№ 17/11633. Табл. III, фиг. 6

141. АБУШИК А. Ф. (колл. № 9515). Силурийские и раннедевонские остракоды. В сб.: «Силурийские и нижнедевонские отло-

жения острова Долгого». АН СССР. — Уральск. науч. центр, Свердловск, 1980, с. 107—134, 6 пал. табл.

Рассмотрены комплексы остракод разреза о. Долгого, очень важного как эталон, для привязки разрозненных выходов пород силура и девона на западном склоне Приполярного Урала, гряде Чернышева и Поднятии Чернова. Описан 31 вид, из них 29 новых и 2 новых рода.

Голотипы:

Leperditia quinqueangulata Abushik.
№ 1/9515. Табл. I, фиг. 1
Leperditia dorsocornuta.
№ 10/9515. Табл. I, фиг. 10
Leperditia marinae.
№ 12/9515. Табл. I, фиг. 12
Leperditia extrema.
№ 14/9515. Табл. I, фиг. 14
Herrmannina insignis.
№ 16/9515. Табл. I, фиг. 16
Herrmannina hebes.
№ 20/9515 (19/9515). Табл. I, фиг. 20
Herrmannina orbiculata.
№ 21/9515. Табл. I, фиг. 21
Herrmannina immensa.
№ 23/9515. Табл. I, фиг. 35
Herrmannina convexa.
№ 25/9515. Табл. I, фиг. 23
Tollitia minuta.
№ 27/9515. Табл. I, фиг. 27
Tollitia minima.
№ 30/9515. Табл. I, фиг. 32
Tollitia simplex.
№ 32/9515. Табл. I, фиг. 25
Tollitia acuta.
№ 34/9515. Табл. I, фиг. 30
Sohrenkia tuberculata.
№ 39/9515. Табл. II, фиг. 1
Kiaeria elegans.
№ 41/9515. Табл. I, фиг. 40
Bispinitia cymbiforme.
№ 44/9515. Табл. II, фиг. 3
Gibberella pretiosa.
№ 49/9515. Табл. II, фиг. 6
Leiocyamus variabilis.
№ 52/9515. Табл. II, фиг. 10
Signetopsis limbata.
№ 60/9515. Табл. II, фиг. 17

Scipionis ? *praecox.*
№ 62/9515. Табл. II, фиг. 19
Beyrichia (Simplicibeyrichia) praeglobifera.
№ 72/9515. Табл. IV, фиг. 1
Dolgitia triangula.
№ 78/9515. Табл. V, фиг. 1
Eokloedenia subbacata.
№ 82/9515. Табл. V, фиг. 6
Eukloedenella posterioalta.
№ 87/9515. Табл. VI, фиг. 4
Eukloedenella ? *dizygopleuroides.*
№ 91/9515. Табл. V, фиг. 11
Nyhamnella ? *gigantea.*
№ 93/9515. Табл. VI, фиг. 11
Alveolella nadinae.
№ 94/9515. Табл. IV, фиг. 7
Cavellina dubia.
№ 97/9515. Табл. VI, фиг. 9
Silenis modestus.
№ 104/9515. Табл. VI, фиг. 13

142. АБУШИК А. Ф. (колл. № 12015). Остракоды. В сб.: «Объяснительная записка к схеме стратиграфии верхесилурийских отложений Вайгачско-Южноновоземельского региона». ВНИИГ и МР МО Мингео СССР, 1981, с. 157—170.
Описано 7 новых видов остракод.

Голотипы:

Leperdita ? *submarinae* Abushik.
№ 1/12015. Табл. XXXVI, фиг. 16
Beyrichia (Simplicibeyrichia) bispina.
№ 4/12015. Табл. XXVIII, фиг. 7
Bingeria arctica.
№ 6/12015. Табл. XXXIX, фиг. 5
Hexophthalmoides mirus.
№ 8/12015. Табл. XL, фиг. 8
Eokloedenia punctata.
№ 10/12015. Табл. XL, фиг. 5
Dizygopleura ? *terra.*
№ 13/12015. Табл. XL, фиг. 11
Scaldianella novosemelica.
№ 15/12015. Табл. XXXIX, фиг. 7

143. АБУШИК А. Ф. (колл. № 12084) в соавторстве с Р. Г. Матухин, Ю. Ю. Валюкявичус и др. Пограничные толщи и граница силура и девона на Северной Земле. В сб.: «Границы крупных подразделений фанерозоя Сибири». СНИИГГиМС, Новосибирск, 1982, с. 77—91, 1 пал. табл.
Изученная фауна позволила сопоставить верхнесилурийские и нижнедевонские толщи Северной Земли с опорными разре-

зами Арктики, Прибалтики, о. Шпицберген и Западной Европы. Описано 3 новых вида.

Голотипы:

Platybolbina angustimarginata Abushik.
№ 1/12084. Табл. I, фиг. 1
Bingeria microrete.
№ 8/12084. Табл. I, фиг. 8
Eokloedenia bacatiformis.
№ 11/12084. Табл. I, фиг. 11

144. АБУШИК А. Ф. (колл. № 12099). Остракоды самойловичской свиты и граница венлока и лудлова на Северной Земле. В сб.: «Геология архипелага Северная Земля». ПГО «Севморгеология», 1982, с. 80—102, 3 пал. табл.

Изучение комплексов остракод одной свиты с 2-х островов Северной Земли показало их разновозрастность, что позволило автору часть отложений рассматривать в составе венлока, а верхи свиты отнести к лудлову. Всего описано 19 видов, из них 1 форма в открытой номенклатуре и 2 с родовым определением.

Голотипы:

Scipionis armatus Abushik.
№ 6/12099. Табл. I, фиг. 6
Pribylites tumefactus.
№ 8/12099. Табл. I, фиг. 5
Bingeria bispina.
№ 12/12099. Табл. I, фиг. 11
Eukloedenella clivula.
№ 17/12099. Табл. II, фиг. 4
Alveolella festa.
№ 19/12099. Табл. II, фиг. 6
Cavellina bisulcifera.
№ 23/12099. Табл. III, фиг. 1
Cavellina effecta.
№ 26/12099. Табл. III, фиг. 4
Thlipsobellum terrenum.
№ 29/12099. Табл. III, фиг. 7
Cytherellina amaciata.
№ 36/12099. Табл. II, фиг. 14
Pseudorayella trapeziale.
№ 37/12099. Табл. III, фиг. 11
Pseudorayella angulare.
№ 40/12099. Табл. III, фиг. 14
Pseudorayella ellipsoidea.
№ 42/12099. Табл. III, фиг. 16

145. АБУШИК А. Ф., МОИСЕЕВА Т. И. (колл. № 12192). Силурийские флипсуриды и конвергентные виды лонгискулид (остракоды) Украины и Белоруссии. В сб.: «Новые и малоизвестные виды ископаемых животных и растений Белоруссии». Минск, 1986, с. 22—33, 2 пал. табл.

Описано 3 новых рода и 7 видов остракод двух семейств. Новых видов 6. Приведены данные по распространению остатков в силуре Приднестровья и Брестской впадины, рассмотрена фациальная приуроченность и филогенетические связи.

Голотипы:

Thlipsura cognata Abushik et Moisseeva.
№ 1/12192. Табл. I, фиг. 1
Thlipsura serotina.
№ 2/12192. Табл. I, фиг. 2
Thlipsuritta aperta.
№ 5/12192. Табл. II, фиг. 2
Thlipsuritia umbonata.
№ 3/12192. Табл. I, фиг. 4
Simplicithlipsa deplanata.
№ 9/12192. Табл. I, фиг. 5
Thlipsuritia occlusa.
№ 10/12192. Табл. I, фиг. 6
Silenis sulcatus.
№ 13/12192. Табл. II, фиг. 5

146. АВРОВ Д. П., СТУКАЛИНА Г. А. (колл. № 8492). Новые данные о силурийских отложениях юга Горного Алтая. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 111, 1964, с. 25—29.

Описан 1 новый вид криноидей, изучение остатков которых позволило авторам отнести вмещающие отложения к венлоку.

Голотип:

Tetragonotetragonalis altaicus Yeltyschewa.
№ 1/8492. рис. 1а—в

БАЛАШОВА Е. А. (колл. № 8153). См. №№ 49, 50.

147. БЕРГЕР А. Я. (колл. № 10078). Древние тентакулиты Сибири. В сб.: «Силур Сибирской платформы». Тр. ин-та геол. и геоф. СО АН СССР, вып. 508, 1982, с. 132—141.

Описано 1 новое семейство, 3 новых рода и 6 новых видов. В коллекции новых видов 5.

Голотипы:

Costatulites homogenus Berger.
№ 1/10078. Табл. XVIII, фиг. 1
Costatulites corniformis.
№ 6/10078. Табл. XVIII, фиг. 6

Costatulites abnormis.
№ 12/10078. Табл. XIX, фиг. 5
Evenkyites rarus.
№ 15/10078. Табл. XX, фиг. 2
Schlotheimites reticulatus.
№ 16/10078. Табл. XXI, фиг. 1

148. БОНДАРЕНКО О. Б. (колл. № 11635). Изменчивость и астогенетическое развитие некоторых позднесилурийских гелиолитоид Подольского Приднестровья. Палеонт. журн. № 4, 1978, с. 13—31, 2 пал. табл.

Изучение двух новых родов из одного биотопа показало, что межколониальная изменчивость выражается слабее, чем внутриколониальная, что обусловлено сезонным чередованием фаз размножения. Новых вида 3, один представлен двумя подвидами.

Голотипы:

Okopites okopinensis okopinensis Bondarenko.
№ 1/11635. Табл. I
Okopites okopinensis uniformis Bond.
№ 8/11635. Табл. II, фиг. 1
Dnestrites transitus.
№ 15/11635 (15/11625). Табл. II, фиг. 3
Dnestrites expectatus.
№ 27/11635 (5/11635). Табл. II, фиг. 4

149. БОНДАРЕНКО О. Б. (колл. № 11902). Изменчивость и морфогенез некоторых позднесилурийских гелиолитоид Подольского Приднестровья. Палеонт. сб. № 18, 1981, с. 8—19, 2 пал. табл.

Описано 2 вида, из них 1 новый.

Голотипы:

Heliplasma dnestriensis (Bondarenko).
№ 11/11902. Табл. II, фиг. 1, рис. 8

150. БОНДАРЕНКО О. Б. (колл. № 11721). Объем нового семейства *Stelliporellidae* (гелиолитиды). В кн.: Табуляты и гелиолитоиды палеозоя СССР. Тр. II Всес. симп. по изуч. ископ. кораллов СССР. Вып. I, 1971, с. 166—178.

Описано новое семейство, 3 новых рода и 5 видов. В коллекции 1 новый вид.

Голотип:

Syringoheliolites contrarius Bondarenko.
№ 6/11721. Табл. XXXVIII, фиг. 5

151. БОРИСЯК М. А. (колл. № 8213). Некоторые лландоверийские брахиоподы из Северо-Восточного Казахстана. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 93, 1964, с. 71—80, 1 пал. табл.

Описано 3 вида брахиопод и 1 форма с родовым определением. Новый вид 1.

Голотип:

Eospirifer (?) *schidertensis* M. Borissiak.
№ 15/8213. Табл. I, фиг. 15

ЕЛТЫШЕВА Р. С., СТУКАЛИНА Г. А. (колл. № 8444).
См. № 62.

ЕЛТЫШЕВА Р. С. (колл. № 11018).
См. № 64.

ЕРИНА М. В. (колл. № 10472).
См. № 65.

152. ЖИЖИНА М. С. (колл. № 8966). Новые виды силурийских фавозитид Таймыра. Сб. статей по палеонт. и биострат. НИИГА, вып. 3, 1957, с. 18—23, 3 пал. табл.

Описано 2 новых вида и 1 новый вариетет табулят.

Голотипы:

Favosites favosiformis var. *multitabulata* Zhizhina.
№ 1/8966. Табл. I, фиг. 1, 2

Favosites brodyensis.
№ 9/8966. Табл. III, фиг. 1, 2

Favosites notabilis.
№ 12/8966. Табл. II, фиг. 2, 3

153. ЖИЖИНА М. С., СМИРНОВА М. А. (колл. № 8967). Новые фавозитиды лландовери и венлока Восточного Таймыра. Сб. статей по палеонт. и биострат. НИИГА, вып. 6, 1957, с. 15—59, 16 пал. табл.

Описано 13 видов и 4 вариетета табулят из силура Таймыра. Новых видов 8 и 4 новых вариетета.

Голотипы:

Palaeofavosites amoenus Smirnova.
№ 2, 2а, б/8967. Табл. I, фиг. 1, 2

Mesofavosites obliquus var. *aquilonalis* Smirn.
№ 5, 5а—г/8967. Табл. III, фиг. 1, 2

Mesofavosites insuetus.
№ 7, 7а—в/8967. Табл. II, фиг. 3; табл. III, фиг. 3

Favosites slobini Zhizhina.
№ 28, 28а, б/8967. Табл. VIII, фиг. 3—5

Favosites prominens Zhiz.
№ 29, 29 а—в/8967. Табл. IX, фиг. 1, 2; Табл. X, фиг. 1—2

Favosites orassimuralis.
№ 30, 30а, б/8967. Табл. XI, фиг. 1—4

Favosites undulatus var. *fulvus.*
№ 31, 31а, б/8967. Табл. XII, фиг. 1—2

Favosites hirsutus var. *regularis.*
№ 33, 33а, б/8967. Табл. XVI, фиг. 1, 2
Favosites incrassatus.
№ 34, 34а—г/8967. Табл. XIII, фиг. 1, 2
Favosites concavotabulatus.
№ 35, 35а, б/8967. Табл. XIV, фиг. 1, 2
Favosites rectiformis.
№ 37, 37 а, б/8967. Табл. XV, фиг. 1, 2
Favosites (Sapporipora) favositoides var. *biserialis* Smirnova.
№ 39, 39а, б/8967. Табл. XVI, фиг. 3, 4

154. ЖИЖИНА М. С., СМИРНОВА М. А. (колл. 8968). Фавозитиды и тамнопориды из силурийских отложений Восточного Таймыра. Сб. статей по палеонт. и биострат. НИИГА, вып. 16, 1959, с. 62—93, 12 пал. табл.

Изученные фавозитиды найдены в силуре Восточного Таймыра впервые, хотя и известны из других областей; тамнопориды представлены новыми видами. Всего описано 16 видов и 5 вариететов; новых видов 2.

Голотипы:

Parastriatopora multiseptosa Smirnova.
№ 62а, б/8968. Табл. XII, фиг. 1—4
Parastriatopora sokolovi.
№ 63а, б/8968. Табл. XII, фиг. 5, 6

155. ЖИЖИНА М. С. (колл. № 8742). *Spumaeolites* gen. nov. (*Tabulata*) из лландовери Таймыра. Палеонт. журн. № 3, 1967, с. 118—120.

Описан 1 новый род и 1 новый вид табулят.

Голотип:

Spumacolites sokolovi Zhizhina.
№ 1, 1а, б/8742, фиг. а—в (в тексте)

156. КАДЛЕЦ Н. М. (колл. № 11601). Ацервуляриды (*Rugosa*) из силура Подолии. Палеонт. журн. № 4, 1978, с. 42—48, 1 пал. табл.

Описан 1 новый вид ругоз из силура Подолии.

Голотип:

Acervularia sokolensis Kadlets.
№ 5а, б/11601. Табл. III, фиг. 2

157. КАДЛЕЦ Н. М. (колл. № 12077). Об онтогенезе ликофиллид (*Rugosa*). В сб.: «Фанерозойские рифы и кораллы СССР» (Труды V Всесоюзного симпозиума по кораллам и рифам. Душанбе, 1983). М., «Наука», 1986, с. 61—64, 1 пал. табл.

Рассматривается онтогенез двух родов одного семейства. Описан 1 новый вид.

Голотип:

Novactis alius Kadlets.
№ 1а—в/12077. Табл. XVI, фиг. 1.

158. КИМ А. И. (колл. № 9176). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Часть 1, 1960, с. 173—175, 2 пал. табл.
Описано 2 новых вида и 1 подвид силурийских табулят Средней Азии.

Голотипы:

Agetolites asiaticus Kim.
№ 1а, б/9176 (504(20)9176). Табл. 30, фиг. 1
Palaeofavosites indubius.
№ 2а, б/9176 (504/14/9176). Табл. 30, фиг. 2
Palaeofavosites indubius var. *zeravschanica.*
№ 4а, б/9176 (504/54/9176). Табл. 31, фиг. 2

159. КИМ И. А. (колл. № 9984). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 5, 1980, с. 9—13.
Описано 4 новых видов силурийских табулят, один из них отнесен к новому роду.

Голотипы:

Mesofavosites djaxanensis Kim.
№ 1/9984. Табл. III, фиг. 1
Mesofavosites plicatomuralis.
№ 2/9984. Табл. II, фиг. 3
Plicatomurus aceleatus.
№ 3/9984. Табл. III, фиг. 2
Bozdonia syringoporoides.
№ 4/9984. Табл. V, фиг. 1

160. КОВАЛЕВСКИЙ О. П. (колл. № 8713). Табуляты и гелиолитоидеи караэспинского горизонта. В сб.: «Стратиграфия нижнепалеозойских и силурийских отложений Центрального Казахстана». ВСЕГЕИ—ЦКГУ, Л., «Недра», 1965, с. 112—125, 4 пал. табл.
Описано 12 видов табулят и гелиолитоидей из силурийских отложений двух районов Центрального Казахстана. Новых видов 4.

Голотипы:

Favosites mikhnevichi Kovalevsky.
№ 1/8713. Табл. I, фиг. 1
Heliolites crassimurus Koval.
№ 12/8713. Табл. III, фиг. 3
Pseudoplasmopora karaespensis.
№ 13/8713. Табл. III, фиг. 4
Squameolites aksarlensis.
№ 17/8713. Табл. IV, фиг. 4

КОВАЛЕВСКИЙ О. П. (колл. № 8257, 9316). См. № 70.

161. КОЛОБОВА И. М. (колл. № 8767). О лландоверийском возрасте низов уркинской свиты хребта Тарбагатай. Биострат. сб. Вып. 3, ВСЕГЕИ, нов. сер., 129, 1967, с. 172—179, 1 пал. табл.

Анализ комплекса трилобитов позволил автору отнести рассмотренные отложения к лландовери, а не к венлоку, как было принято ранее. Описано 4 вида и 1 вариетет. Новый вид 1.

Голотип:

Encrinurus inusitatus Kolobova.
№ 11/8767. Табл. I, фиг. 11

КОЛОБОВА И. М. (колл. № 10542). См. № 72.

162. КОЛОБОВА И. М. (колл. № 12543). Трилобиты акканских известняков Юго-Западного Прибалхашья (Казахстан). Ежег. ВПО, т. XXXI, 1988, с. 110—129, 3 пал. табл.

Описано 6 видов и 1 подвид. Новый вид 1.

Голотип:

Aceroproetus acer Kolobova.
№ 16/12543 (12543/13). Табл. II, фиг. 3

163. КОРЕНЬ Т. Н. (колл. № 8164). Новый силурийский род *Uralograptus*. Палеонт. журн. АН СССР, № 3, 1962, с. 136, 137.

Описаны остатки граптолитов нового рода и вида из нижнего венлока западного склона Полярного Урала.

Голотип:

Uralograptus insuetus Koren.
№ 5/8164. Рис. 1

164. КОРЕНЬ Т. Н. (колл. № 8272). «Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР». Вып. II, часть II, 1968, с. 290—292, I пал. табл.

Описано 3 новых вида граптолитов.

Голотипы:

Petalograptus crassus Koren.
№ 1/8273. Табл. 68, фиг. 1
Campograptus (?) *absonus*.
№ 3/8273. Табл. 68, фиг. 4
Spirograptus enormis.
№ 2/8273. Табл. 68, фиг. 7

165. КОРЕНЬ Т. Н. (колл. № 8273). Новые раннесилурийские граптолиты Южного Урала. Палеонт. журн. № 4, 1968, с. 101—103.

Описано два новых вида граптолитов из двух семейств, встреченных в больших и разнообразных комплексах граптолитов, имеющих широкое географическое распространение. В колл. 1 новый вид.

Голотип:

Cyrtograptus sakmaricus Koren.
№ 239/8273. Табл. XXXIII, фиг. 1

166. КОРЕНЬ Т. Н. (колл. № 10688). Граптолиты и зональное расчленение лландоверийских отложений западного склона Полярного Урала (Лемвинская фациальная зона). В кн.: «Материалы по геол. и пол. ископ. северо-востока Европейской части СССР». Сб. № 7, 1972, с. 62—112, 8 пал. табл.

Дано описание разрезов, анализ зональных комплексов граптолитов, корреляция верхнелландоверийских отложений по комплексам граптолитов с одновозрастными толщами других регионов. Описано 29 видов, 1 вариетет; новых видов 5.

Голотипы:

Streptograptus distentus Koren.
№ 28/10688 (123/8642). Табл. III, фиг. 4
Pristiograptus moludensis.
№ 37/10688 (53/8642). Табл. III, фиг. 14
Oktavites compositus.
№ 65/10688 (163/8642). Табл. VI, фиг. 1
Rastrites subtilis.
№ 88/10688 (204/8642). Табл. VIII, фиг. 4
Rastrites rotundus.
№ 93/10688 (209/8642). Табл. VIII, фиг. 6

КОРЕНЬ Т. Н., МИХАЙЛОВА Н. Ф., ЦАЙ Д. Т. (колл. № 11568).

См. № 77.

167. КОРЕНЬ Т. Н. (колл. № 10876). New late sibirian Monograptids from Kazakhstan Palaeontology, vol. 26, part 2, 1983, p. 407—434, 4 Plate.

Рассмотрена история изучения, биостратиграфия и морфология позднесилурийских граптолитов Казахстана.

Описано 19 видов, из них 8 новых.

Голотипы:

Monograptus anerosus Koren.
№ 1/10876. Табл. 49, фиг. 1
Monograptus balaensis.
№ 11/10876. Табл. 49, фиг. 6

Monograptus beatus.
№ 12/10876. Табл. 49, фиг. 7
Monograptus microden aksajebsis.
№ 26/10876. Табл. 50, фиг. 6
Monograptus mironovi.
№ 40/10876. Табл. 51, фиг. 1
Monograptus nimius.
№ 48/10876. Табл. 51, фиг. 5
Monograptus prognatus.
№ 51/10876. Табл. 51, фиг. 8
Monograptus supinus.
№ 77/10876. Табл. 52, фиг. 11

168. КОРЕНЬ Т. Н. (колл. № 12261). Граптолиты в кн.: «Токрауский горизонт верхнего силура». Алма-Ата: Наука, 1986, с. 86—136, 20 пал. табл.

В сборнике, обобщающем накопленные данные по стратиграфическому расчленению, строению разрезов и фауне токрауского горизонта Северного Прибалхашья описано 25 видов и 1 подвид позднесилурийских граптолитов. Новых вида 4.

Голотипы:

Monograptus bessolaensis Koren.
№ 23/12261. Табл. XVIII, фиг. 7
Pseudomonoclimacis cinctutus.
№ 275/12261. Табл. XXXI, фиг. 1, рис. 33а
Pseudomonoclimacis lidiae.
№ 299/12261. Табл. XXXIII, фиг. 1
Neolobograptus ? proprius.
№ 334/12261. Табл. XXXV, фиг. 3, рис. 37в

169. ЛЕЛЕШУС В. Л. (колл. № 9020). Об одном из направлений изменчивости рода *Multisolenia* Frirz. Изв. отд. естеств. наук АН Таджикской ССР, вып. 1 (28), 1959, с. 49—54, 4 пал. табл.

Описано 3 вида табулят и изучены их филогенетические отношения. Новых видов 2.

Голотипы:

Multisolenla mutosa Leleshus.
№ 3а, б/9020. Табл. II, фиг. 1, 2
Antherolites hemiseptosus.
№ 5а, б/9020. Табл. IV, фиг. 1, 2

170. ЛЕЛЕШУС В. Л. (колл. № 9192). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Часть I, 1960, с. 206.

Описан 1 новый вид табулят из силура Средней Азии.

Голотип:

Syringoporinus aequabilis Leleshus.
№ 1а/9192. Табл. 40, фиг. 1

171. ЛЕЛЕШУС В. Л. (колл. № 9192). К диагнозу силурийских табулят из рода *Cylindrostylus* Sokolov. Докл. АН СССР, т. 130, № 2, 1960, с. 430—432, 1 пал. табл.

Описан 1 новый вид и 1 новый вариетет.

Голотипы:

Cylindrostylus turkmensaicus var. *fistulata* Leleshus.
№ 2, 2а—с/9192. Рис. 2а—б
Cylindrostylus giganteus Lel.
№ 5а, б/9192. Рис. 2г, д

ЛЕСОВАЯ А. И. (колл. № 10473). См. № 78.

172. МАКСИМОВА З. А. (колл. № 9112). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 1, ч. II, 1960, с. 256—280, 3 пал. табл.

Описано 11 новых видов, 3 из которых принадлежат новому роду и 4 новых подвида трилобитов из силура и девона Ц. Казахстана, Рудного Алтая и Арктики. В коллекции 9 новых видов и 3 новых подвида.

Голотипы:

Schizoproetus borealis Z. Maximova.
№ 1/9112. Табл. 54, фиг. 1
Dechenellurus ursus Z. Max.
№ 3/9112. Табл. 54, фиг. 7
Dechenellurus granifer.
№ 6/9112. Табл. 54, фиг. 12
Dechenellurus parvus.
№ 7/9112. Табл. 54, фиг. 4
Scutellum (Scutellum) haidingeri indefensum.
№ 10/9112. Табл. 55, фиг. 1
Scabriscutellum boreum.
№ 14/9112. Табл. 55, фиг. 7
Scabriscutellum miloradovitchi.
№ 16/9112. Табл. 55, фиг. 4
Dalmanites saryarkensis.
№ 18/9112. Табл. 55, фиг. 9
Odontochile crassa.
№ 19/9112. Табл. 56, фиг. 2
Cheirurus quenstedti orientalis.
№ 21/9112. Табл. 56, фиг. 4
Crotolocephalus gibbus hexaspinus.
№ 23/9112. Табл. 56, фиг. 8
Harpes pansa.
№ 24/9112. Табл. 56, фиг. 1

МАКСИМОВА З. А. (колл. № 9202). См. №№ 79, 80.

173. МАКСИМОВА З. А. (колл. № 8597). Среднепалеозойские трилобиты Центрального Казахстана. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 165, 1968, 137 с., 35 пал. табл.

Анализ изученной коллекции позволил уточнить значение остатков трилобитов для стратиграфии верхнего силура и девона, сделать некоторые палеогеографические выводы. Описано 58 видов, из них 16 в открытой номенклатуре, 4 подвида, 11 форм с родовыми определениями. Новых видов 26 и 2 новых подвида.

Голотипы:

Otarion kiikbaicum Z. Maximova.
№ 1/8597. Табл. I, фиг. 1
Praedechenella kasachstanica Z. Max.
№ 7/8597. Табл. III, фиг. 8
Dechenellurus profusus.
№ 20/8597. Табл. III, фиг. 7
Scutellum michnevitchi.
№ 26/8597. Табл. IV, фиг. 4
Lobopyge (Lobopyge) limbata.
№ 41/8597. Табл. VI, фиг. 5
Lobopyge (Lobopyge) longiaxis.
№ 44/8597. Табл. VII, фиг. 2
Lobopyge (Lobopyge) brevis.
№ 46/8597. Табл. VII, фиг. 1
Calymene weberi.
№ 54/8597. Табл. IX, фиг. 5
Calymene kokbaitalensis.
№ 59/8597. Табл. VIII, фиг. 1
Phacops praepipa.
№ 71/8597. Табл. XVI, фиг. 4
Phacops fecunolus orientalis.
№ 76/8597. Табл. X, фиг. 2
Phacops logani balchashensis.
№ 84/8597. Табл. XIII, фиг. 2
Phacops saryarkensis.
№ 92/8597. Табл. XV, фиг. 1
Phacops dentatus.
№ 94/8597. Табл. XVIII, фиг. 1
Phacops angulatus.
№ 98/8597. Табл. XX, фиг. 1
Phacops pustulatus.
№ 102/8597. Табл. XIX, фиг. 1
Phacops acutus.
№ 109/8597. Табл. XIX, фиг. 8
Phacops? rhinoceras.
№ 112/8597. Табл. XXI, фиг. 1

Dalmanites septicostatus.
№ 149/8597. Табл. XXII, фиг. 1
Odontochile pristina.
№ 161/8597. Табл. XXV, фиг. 3
Odontochile batymarginata.
№ 167/8597. Табл. XXVII, фиг. 3
Odontochile idonea.
№ 169/8597. Табл. XXVI, фиг. 1
Odontochile kiikbaica.
№ 173/8597. Табл. XXIV, фиг. 1
Odontochile ulrichi asiatica.
№ 180/8597. Табл. XXIX, фиг. 2
Odontochile arcuata.
№ 188/8597. Табл. XXIX, фиг. 2
Odontochile bifurcata.
№ 192/8697. Табл. XXX, фиг. 4
Odontochile carinata.
№ 194/8597. Табл. XXX, фиг. 1
Odontochile frontale.
№ 196/8597. Табл. XXVIII, фиг. 2

174. МАШКОВА Т. В. (колл. № 11650). Новые силурийские конодонты из Центральной Сибири. Палеонт. журн. АН СССР, № 2, 1979, с. 98—105, 1 пал. табл.

Описан 1 новый род с типовым видом и еще один новый вид конодонтов. Сделано предположение, что изученные остатки принадлежали одному конодонтоносителю и располагались в билатерально-симметричном положении.

Голотипы:

Kockelella suglobovi Mashkova.
№ 8/11650. Табл. XI, фиг. 8
Huddlella johni.
№ 1/11650. Табл. XI, фиг. 1

175. МЕНАКОВА Г. Н., НИКИФОРОВА О. И. (колл. № 6228). Новые представители позднесилурийских брахиопод Зеравшано-Гиссарской горной области. Палеонт. журн. № 4, 1986, с. 65—76, 1 пал. табл.

Уточняется систематическое положение широко распространенных позднесилурийских брахиопод, представителей трех подсемейств. Дано описание трех новых родов, к которым отнесены виды описанные ранее; 1 вид новый.

Голотип:

Argella pirum Menakova et Nikiforova.
№ 5/6228. Табл. VII, фиг. 5

176. МИЗЕНС Л. И. (колл. № 11294). Новые силурийские атрипиды восточного склона Северного и Среднего Урала. В сб.:

«Палеонтология нижнего палеозоя Урала». Тр. ИГиГ, АН СССР, вып. 129, 1977, с. 39—55, 3 пал. табл.

Описано 7 новых видов брахиопод, 1 новый подвид. В коллекции новых видов 6 и 1 подвид.

Голотипы:

Lissatrypa philomelaformis Mizens.
№ 1/11294. Табл. I, фиг. 1
Lissatrypa compressaformis Sapelnikov et Mizens.
№ 6/11294. Табл. I, фиг. 6
Atrypella subrecta Mizens.
№ 10/11294. Табл. I, фиг. 10
Atrypella camelina pavdensis.
№ 14/11294. Табл. II, фиг. 1
Atrypa losvensis.
№ 21/11294. Табл. II, фиг. 6
Spinatrypa (?) *bobrovkensis.*
№ 24/11294. Табл. III, фиг. 1
Atrypinella pseudogranulifera.
№ 27/11294. Табл. III, фиг. 4

177. МОДЗАЛЕВСКАЯ Е. А. (колл. № 11567). Комплексы мшанок чергакской серии Тувы. Ежег. ВПО, т. XXI, «Наука», 1978, с. 119—143, 4 пал. табл.

Описано 12 новых видов силурийских мшанок.

Голотипы:

Ceramopora magna Modzalevskaja.
№ 1/11567. Табл. I, фиг. 1
Fistulipora subincerta Modz.
№ 3/11567. Табл. I, фиг. 3
Profistulipora (?) *silurica.*
№ 4/11567. Табл. I, фиг. 4; табл. II, фиг. 1
Amplexopora simplicissima.
№ 5/11567. Табл. III, фиг. 2
Cyphotrypa verae.
№ 6/11567. Табл. II, фиг. 2
Cyphotrypa alexandrae.
№ 7/11567. Табл. II, фиг. 3
Anomalotoechus elegestica.
№ 9/11567. Табл. III, фиг. 1
Eridotrypa versa.
№ 10/11567. Табл. IV, фиг. 1
Eridotrypa acifera.
№ 12/11567. Табл. IV, фиг. 3
Eridotrypa granuliformis.
№ 13/11567. Табл. IV, фиг. 4
Homotrypa formosa.
№ 14/11567. Табл. I, фиг. 4

Stigmatella singulare.
№ 15/11567. Табл. IV, фиг. 5

178. МОДЗАЛЕВСКАЯ Е. А. (колл. № 11593, 10805). Некоторые силурийские мшанки Тувы. Ежег. ВПО, т. XXII, 1979, с. 63—93, 5 пал. табл.+доп. табл.
Описан 1 новый род и 14 новых видов мшанок.

Голотипы:

Profustulipora (?) *microcellularis* Modzalevskaja.
№ 1а, б/11593. Табл. I, фиг. 1
Fistulacanta araargensis Modz.
№ 2а, б/11593. Табл. I, фиг. 2
Fistulacanta acerosa.
№ 3а, б/11593. Табл. I, фиг. 3
Fistulacanta clausa.
№ 4а, б/11593. Табл. II, фиг. 1
Hennigopora pseudoflorida.
№ 3а, б/10805. Табл. I, фиг. 2
Amplexopora subseptosa.
№ 6/11593. Табл. II, фиг. 4
Monticulipora alashensis.
№ 7/11593. Табл. III, фиг. 1
Plasopora juvenalis.
№ 8а, б/11593. Табл. III, фиг. 2
Plasopora propria.
№ 9/11593. Табл. III, фиг. 3
Lioclema explanodeum.
№ 11а, б/11593. Табл. V, фиг. 1
Lioclema eoexplanatum.
№ 12а, б/11593. Табл. IV, фиг. 3
Nekhorosheviella (?) *silurica.*
№ 15/11593. Табл. II, фиг. 3
Eridotrypa heteromera.
№ 16/11593. Табл. V, фиг. 2
Hemiphragma pitchishuensis.
№ 18/11593. Табл. V, фиг. 4

179. МОДЗАЛЕВСКАЯ Е. А. (колл. № 11226)[1]. Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 5, 1980, с. 45—46.
Описано 2 новых вида мшанок из силура Тувы.

Голотипы:

Lioclema subasperum Modzalevskaja.
№ 1а, б/11226 (1/10805). Табл. XIV, фиг. 1
Lioclema aciculata Modz.
№ 2а, б/11226 (1/10805). Табл. XIX, фиг. 2

[1] Опубликовано под № 10805 — ошибочно.

180. МОДЗАЛЕВСКАЯ Т. Л. (колл. № 11712, 11550). К систематике палеозойских атиридид. Палеонт. журн. № 2, 1979, с. 48—63, 1 пал. табл.

Описано 5 видов силурийских брахиопод, из них 4 новых и 3 новых подвида.

Голотипы:

Glassina uritata T. Modzalevskaja.
№ 1/11712. Табл. IV, фиг. 1
Glassina pentagona T. Modz.
№ 3/11712. Табл. IV, фиг. 2
Glassina dissecta.
№ 7/11712. Табл. IV, фиг. 4
Greenfieldia uberis.
№ 19/11550. Табл. IV, фиг. 9
Greenfieldia uberis ampla.
№ 11/11712. Табл. IV, фиг. 13
Greenfieldia uberis tanta.
№ 22/11550. Табл. IV, фиг. 14

181. МОДЗАЛЕВСКАЯ Т. Л. (колл. № 11048). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. V, 1980, с. 81—87.

Описано 3 новых вида брахиопод из силура Подолии и Новой Земли. В коллекции 2 новых вида.

Голотипы:

Meristina bilobata T. Modzalevskaya.
№ 3/11048. Табл. XX, фиг. 7
Meristina hatanzeica T. Modz.
№ 14/11048. Табл. XX, фиг. 15

182. МОДЗАЛЕВСКАЯ Т. Л. (колл. № 11550). Брахиоподы силура и нижнего девона и их стратиграфическое значение. В сб.: Силурийские и нижнедевонские отложения острова Долгого. АН СССР, 1980, с. 82—104, 1 пал. табл.

Описано 16 видов, из них 2 новых и 6 подвидов, 4 вида в открытой номенклатуре, 1 форма с родовым определением.

Голотипы:

Greenfieldia uberis uberis T. Modzalevskaya.
№ 19/11550. Табл. II, фиг. 2
Greenfieldia uberis tanta T. Modz.
№ 22/11550. Табл. II, фиг. 5
Didymothyris plicatella.
№ 25/11550. Табл. I, фиг. 19

183. МОДЗАЛЕВСКАЯ Т. Л. (колл. № 12011). Брахиоподы. В сб.: «Объяснительная записка к схеме стратиграфии верхнесилурийских отложений Вайгачско-Южноновоземельского региона», ВНИИГиМР МО Мингео СССР, 1981, с. 146—157.

Описан 1 новый род и 2 новых вида брахиопод.

Голотипы:

Squamathyris glacialis T. Modzalevskaya.
№ 9/12011. Табл. XXIX, фиг. 6
Howellella grandis T. Modz.
№ 24/12011. Табл. XXXVIII, фиг. 11

184. МОДЗАЛЕВСКАЯ Т. Л., НИКИФОРОВА О. И. (колл. № 11953). Брахиоподы скальского горизонта Подолии. Ежег. ВПО, т. XXV, 1982, с. 98—121, 2 пал. табл.

Описано 15 видов и 3 подвида, из которых 2 вида и 1 подвид новые.

Голотипы:

Dolerorthis tanta T. Modzalevskaya et Nikiforova.
№ 1/11953. Табл. I, фиг. 1
Hemitoechia distincta crebra T. Modz. et Nikif.
№ 14/11953. Табл. I, фиг. 14
Hemitoechia serrata.
№ 18/11953. Табл. I, фиг. 18

185. МОДЗАЛЕВСКАЯ Т. Л. (колл. № 11964). Брахиоподы силура и раннего девона Европейской части СССР. Отряд *Athyridida.* ПИН, «Наука», 1985, 128 с., 16 пал. табл.

Изучены силурийские и раннедевонские брахиоподы одного отряда, приведена история изучения группы, рассмотрены вопросы морфологии, выявлены таксономические признаки, уточнена систематика. Описано 24 вида и 6 подвидов, принадлежащих к 13 родам, из них 1 новый. Новый вид 1.

Голотип:

Merista plena T. Modzalevskaya.
№ 38/11964. Табл. V, фиг. 1

186. МОДЗАЛЕВСКАЯ Т. Л. (колл. № 12373). Раннесилурийские брахиоподы Южного острова Новой Земли. В сб.: «Страт. и фауна палеозоя Новой Земли». ПГО «Севморгеология», Мингео СССР, 1985, с. 59—73, 2 пал. табл.

Описано 13 видов, из них 1 новый и 6 в открытой номенклатуре.

Голотип:

Virgianella trivialis T. Modzalevskaya.
№ 9/12373. Табл. I, фиг. 7

187. НЕХОРОШЕВ В. П. (колл. № 5061). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 3, 1972, с. 165, 166.

Описан 1 новый вид силурийских мшанок из Восточного Казахстана.

Голотип:

Unitrypa rjabmini Nekhoroshev.
№ 25/5061. Табл. 44, фиг. 1

188. НЕХОРОШЕВА Л. В. (колл. № 12315). Позднесилурийские мшанки Средней Азии. Ежег. ВПО, т. XXXI, 1988, с. 20—32, 3 пал. табл.
Описано 5 новых видов и 1 форма с родовым определением.

Голотипы:

Orbignyella variabile L. Nekhorosheva.
№ 1а—д/12315. Табл. I, фиг. 1
Lioclema waschurovae L. Nekh.
№ 5а, б/12315 (2а, б/12315, 4а, б/12315). Табл. I, фиг. 3
Moyerella tjanshanica.
№ 6а/12315. Табл. II, фиг. 1
Moyerella isfaraensis.
№ 10а/12315. Табл. II, фиг. 2
Semicoscinium minutum.
№ 16а/12315. Табл. III, фиг. 3

189. НЕХОРОШЕВА Л. В. (колл. № 12109). Первая находка мшанок в венлоке центральной части Уфимского амфитеатра. Ежег. ВПО, т. XXXIV, 1991, с. 267—272, 1 пал. табл.
Описан 1 новый вид мшанок из силура Урала.

Голотип:

Eridotrypa voroniensis L. Nekhorosheva.
№ 1а, б/12109. Табл. I, фиг. 3а, б

190. НИКИФОРОВА О. И. (колл. № 8639). Полевой атлас руководящих брахиопод верхнего силура Киргизской ССР. Кирг. филиал АН СССР, 1949, 20 с., 8 пал. табл.
Описано 29 видов и 3 вариетета брахиопод. Новых видов 6, в коллекции 5 новых видов и 1 вариетет; позднее (1986 г.) автором пересмотрены родовые определения и описаны заново 3 вида.

Голотипы:

Gipidula animus Nikiforova.
№ 1/8639. Табл. II, фиг. 3
Atrypa subarachnae Nikif.
№ 2/8639. Табл. V, фиг. 4
Lissatrypa caudata.
№ 7/8639. Табл. IV, фиг. 6
Spirifer (Delthyris?) favositicus var. *gissarensis.*
№ 6/8639. Табл. VI, фиг. 4
Parazyga argensis.
№ 4/8639. Табл. VII, фиг. 6

Parazyga mirus.
№ 5/8639. Табл. VII, фиг. 5

191. НИКИФОРОВА О. И. (колл. № 8201). Находки новых силурийских брахиопод в Чаткальском хребте. Тр. ВСЕГЕИ, т. 93, 1964, с. 81—90, 1 пал. табл.
Описано 2 новых рода брахиопод.

Голотипы:

Nucleospira asiatica Nikiforova.
№ 1/8201. Табл. I, фиг. 1
Tschatkalia unica Nikif.
№ 36/8201. Табл. I, фиг. 16

192. НИКИФОРОВА О. И., МОДЗАЛЕВСКАЯ Т. Л. (колл. № 9543). О находке раковин новых брахиопод рода *Dnestrina* в силуре Молдавии и Подолии. Ежег. ВПО, т. XVIII, 1968, с. 206—211.
Описаны брахиоподы, отнесенные автором к типовому виду нового рода.

Голотип:

Dnestrina gutta Nikiforova et T. Modzalevskaja.
№ 1/9543. Табл. I, фиг. 1

193. НИКИФОРОВА О. И., МОДЗАЛЕВСКАЯ Т. Л. (колл. № 9794). Некоторые лландоверийские и венлокские брахиоподы Северо-Западной части Сибирской платформы. Уч. зап. НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 21, 1968, с. 50—81, 5 пал. табл.
Описано 9 видов, 1 подвид и 2 формы с родовым определением. Новых видов 5, 1 новый подвид, однако, в коллекции 4 новых вида и подвид.

Голотипы:

Stegerhynchus decemplicatus duplex Nikiforova et T. Modzalevskaja.
№ 5/9794. Табл. I, фиг. 5
Alispira? *rotundata* Nikif. et T. Modz.
№ 15/9794. Табл. II, фиг. 4
Protatypa lepidota.
№ 26/9794. Табл. II, фиг. 8
Dubaria tenera.
№ 37/9794. Табл. III, фиг. 8
Hyattidina? *acutisummitatus.*
№ 49/9794 (43/9794). Табл. V, фиг. 1

НИКИФОРОВА О. И. (колл. № 10532). См. № 96.

194. НИКИФОРОВА О. И., МОДЗАЛЕВСКАЯ Т. Л. (колл. № 11475). В статье: O. I. Nikiforova, T. L. Modzalevskaya and

M. G. Bassett. Review of the upper Sibirian and lower Devonian articulate brachiopods of Podolia. Special pap. in palaeont. № 34, 1985, 66 с., 16 пал. табл.

Приведены описания 41 неотипа видов и подвидов замковых брахиопод, изученных ранее Козловским (1929) из отложений лудлова — жедина Подолии. Для двух видов описанных Семирадским (1906) выбраны лептотипы. На основании новых сборов произведена ревизия всей фауны, для многих видов уточнены роды. Описан 1 новый вид. В музее хранится 38 неотипов, голотип 1.

Неопиты и голотипы:

Resserella elegantuloides (Kozlowski).
№ 1/11475. Табл. I, фиг. 1
Salopina crassiformis.
№ 4/11475. Табл. I, фиг. 4
Platyorthis cimex.
№ 15/11475. Табл. 2, фиг. 4
Isorthis czajnochai.
№ 12/11475. Табл. 2, фиг. 1
Schizophoria fragilis.
№ 5/11475. Табл. I, фиг. 5
Dalejina frequens.
№ 18/11475. Табл. 2, фиг. 7
Plectodonta mariae.
№ 23/11475. Табл. 3, фиг. 5
Pholidostrophia (Mesopholidostrophia) verrucosa.
№ 25/11475. Табл. 3, фиг. 7
Mesodouvillina subinterstrialis subinterstrialis.
№ 28/11475. Табл. 4, фиг. 1
Mesodouvillina subinterstrialis seretensis.
№ 33/11475. Табл. 4, фиг. 6
Mesodouvillina? dzwinogrodensis.
№ 27/11475. Табл. 3, фиг. 9
Shaleriella tenuis Nikiforova et Modzalevskaya.
№ 34/11475. Табл. 5, фиг. 1
Iridistrophia praeumbracula (Kozlowski).
№ 41/11475. Табл. 6, фиг. 1
Morinortynchus wieniukowi.
№ 43/11475. Табл. 6, фиг. 3
Pseudostrophochonetes mediocostalis.
№ 50/11475. Табл. 7, фиг. 2
Asymmetrochonetes proliferus.
№ 55/11475. Табл. 7, фиг. 7
Protochonetes dniestrensis.
№ 70/11475 (69/11475). Табл. 8, фиг. 9
Anastrophia (Grayina) magnifira.
№ 71/11475. Табл. 8, фиг. 10

Clorinda pseudolinguifera
№ 75/11475. Табл. 9, фиг. 2
Machaeraria althi.
№ 76/11475. Табл. 9, фиг. 3
Hemitoechia? bieniaszi.
№ 78/11475. Табл. 9, фиг. 5
Atrypa reticularis dzwinogrodensis.
№ 84/11475. Табл. 10, фиг. 1
Atrypa reticularis tajnensis.
№ 85/11475. Табл. 10, фиг. 2
Atrypa reticularis nieczlawiensis.
№ 86/11475. Табл. 10, фиг. 3
Lissatrypa leprosa.
№ 90/11475. Табл. 11, фиг. 2
Septatrypa secreta.
№ 97/11475. Табл. 11, фиг. 10
Howellella latisinuata.
№ 106/11475. Табл. 13, фиг. 1
Howellella laeviplicata.
№ 110/11475. Табл. 13, фиг. 5
Hewellella orphana.
№ 114/11475. Табл. 13, фиг. 9
Howellella angustiplicata angustiplicata.
№ 115/11475. Табл. 14, фиг. 1
Howellella angustiplicata zaleszczykiensis.
№ 119/11475. Табл. 14, фиг. 5
Ambocoelia praecox.
№ 100/11475. Табл. 12, фиг. 1
Cyrtina praecedens.
№ 102/11475. Табл. 12, фиг. 3
Meristella wisniowskii.
№ 122/11475. Табл. 14, фиг. 8
Protathyris praecursor.
№ 125/11475. Табл. 15, фиг. 1
Nucleospira robusta.
№ 126/11475. Табл. 15, фиг. 5
Rhynchospirina siemiradzkii.
№ 81/11475. Табл. 9, фиг. 8
Podolella rensselaeroides.
№ 131/11475. Табл. 16, фиг. 3
Brachyzyga pentameroides.
№ 132/11475. Табл. 16, фиг. 4

195. НИЛОВА Н. В. (колл. № 8192). Брахиоподы караэспинского горизонта. В сб.: «Стратиграфия нижнепалеозойских и силурийских отложений Центрального Казахстана» ВСЕГЕИ—ЦКГУ, «Недра», 1965, с. 91—106, 3 пал. табл.

Описано 10 видов, 3 подвида и 1 вид в открытой номенклатуре. Новых видов 6 и 1 новый подвид.

Голотипы:

Anastrophia bedrovi Nilova.
№ 1/8192. Табл. I, фиг. 1
Leptostrophia (?) *aksarlyensis.*
№ 6/8192. Табл. I, фиг. 7
Ussovia borissiakae.
№ 20/8192. Табл. II, фиг. 6
Atrypa reticularia gravis.
№ 9/8192. Табл. III, фиг. 1
Espella kazachstanica.
№ 15/8192. Табл. III, фиг. 8
Merista kazachica [1]
№ 17/8192. Табл. III, фиг. 10
Nucleospira agadyrensis.
№ 18/8192. Табл. III, фиг. 12

196. ОБУТ А. М., СОБОЛЕВСКАЯ Р. Ф. (колл. № 8783). Граптолиты силура Таймыра. «Наука», М., 1965, 120 с., 19 пал. табл.

Описано 65 видов, из них 9 в открытой номенклатуре, 8 подвидов, 2 с определением до рода. Новых видов 8, 1 новый подвид. Приведены таблицы сопоставления граптолитовых зон силура СССР и Англии, зонального распространения граптолитов силура Таймыра.

Голотипы:

Dimorphograptus urvantzovi Obut et Sobolevskaya.
№ 35/8783. Табл. III, фиг. 7
Monograptus elongata-concavus.
№ 37/8783. Табл. III, фиг. 10
Monograptus nganasanicus.
№ 50/8783. Табл. IV, фиг. 12
Pernerograptus sidiachenkoi.
№ 88/8783. Табл. IX, фиг. 2
Pristiograptus emaceratus.
№ 113/8783. Табл. XI, фиг. 7
Pristiograptus sungularis.
№ 127/8783. Табл. XIII, фиг. 3
Colonograptus roemeri tenuis.
№ 133/8783. Табл. XIII, фиг. 9
Rastrites orlovi.
№ 179/8783. Табл. XVII, фиг. 10

197. ОРАДОВСКАЯ М. М. (колл. № 10630). Тип брахиоподы. В кн.: «Полевой атлас силурийской фауны Северо-Востока СССР». Магадан, 1975, с. 60—128.

[1] В сборнике «Новые виды...». Вып. II, часть II, 1968 г. опубликована с видовым названием *M. kazachstanica* Nilova.

Атлас является первой сводкой, где приведено описание силурийских брахиопод, собранных в 60-х годах на территории Северо-Востока СССР. Всего описано 40 видов из разных коллекций, из них 14 видов, 4 формы, 3 подвида и 3 формы с определением до рода принадлежит данной коллекции. Новых видов 6, в коллекции 5 и 2 новых подвида.

Голотипы и синтипы:

Clorinda undata kolymica Oradovskaja.
№ 1/10630. Табл. 29, фиг. 1
Stropheodonta (Eostropheodonta) lineatoporosa Orad.
№ 12/10630 (97/10630). Табл. 66, фиг. 9
Hemitoechia omirovi.
№ 17/10630 (35/10630). Табл. 60, фиг. 1
Lenatoechia elegans nana.
№ 41/10630 (24/10630). Табл. 64, фиг. 5
Lenatoechia ? prodigiosa.
№ 42/10630 (120/10630). Табл. 65, фиг. 1
Alispira (?) *deplanata.*
№ 54/10630. Табл. 31, фиг. 2
Lissatrypa jucunda.
№ 64/10630. Табл. 30, фиг. 1
Hyattidina lentiforme.
№ 77/10630 (95/10630). Табл. 30, фиг. 4
№ 78/10630 (94/10630). Табл. 30, фиг. 5

ПОПОВ Л. Е., НИКИТИН И. Ф., РУКАВИШНИКОВА Т. Б. (колл. № 11678). См. № 108.
РОЗМАН Х. С. (колл. № 11700). См. № 114.

198. РЯБИНИН В. Н. (колл. № 11985). Силурийские строматопороидеи Монголии и Тувы. Тр. Монгольской комиссии № 31, АН СССР, Мат. эксп. геол. отр. И. П. Рачковского, вып. № 7, 1937, 36 с., 4 пал. табл.

Описано 5 видов, из них 2 новых и 1 в открытой номенклатуре; 4 формы с родовым определением.

Синтипы:

Labechia elegestica Riabinin.
№ 3а, б/11985. Табл. II, фиг. 3
№ 4а, б/11985. Табл. II, фиг. 4, 5
№ 5а/11985. Табл. II, фиг. 6
Stromatopora elegestica Riab.
№ 8а, б/11985. Табл. III, фиг. 3, 4 *

199. СМИРНОВА М. А. (колл. № 11556). Табуляты острова Долгого. В сб.: «Силурийские и нижнедевонские отложения острова Долгого», АН СССР, 1980, с. 68—81, 2 пал. табл.

Описан 1 новый род и 4 вида, из них 3 новых.

Голотипы:

Romingerella (?) *dolgovskaja* Smirn.
№ 7а—в/11556 (4/11556). Табл. II, фиг. 1
Romingerella (?) *septata.*
№ 10а—г/11556 (5/11556). Табл. II, фиг. 2
Striatopora anuyensiformis.
№ 34а—г/11556 (7/11556). Табл. II, фиг. 3

200. СМИРНОВА М. А. (колл. № 11967). Табуляты. В сб.: «Объяснительная записка к схеме стратиграфии верхнесилурийских отложений Вайгачско-Южноновоземельского региона». ВНИИГ и МР МО Мингео СССР, 1981, с. 107—126.
Описано 6 видов табулят, из них 1 новый.

Голотипы:

Thecia fedotovi Smirnova.
№ 1/11967 (1/9955). Табл. XVII, фиг. 1

СОКОЛОВ Б. С. (колл. № 8122). См. № 117.

201. СТРЕЛЬНИКОВ С. И. (колл. № 8503). О находке *Diplochone (Rugoda)* в силуре Приполярного Урала. Палеонт. журн. АН СССР, № 1, 1964, с. 132—134.
Описан новый вид ругоз, отнесенный к роду, представители которого ранее встречались только в девонских отложениях.

Голотип:

Diplochone kozhimica Strelnikov.
№ 1/8503. Рис. 1

202. СТРЕЛЬНИКОВ С. И. (колл. № 8503). Об объеме семейства *Kodonophyllidae (Rugosa).* Палеонт. журн. АН СССР, № 4, 1964, с. 49—60, 1 пал. табл.
Проведена ревизия семейства силурийских ругоз, отличающихся своеобразной тонкой структурой септ. Описано 2 новых рода и 2 новых вида.

Голотипы:

Scynophyllum clavum Strelnikov.
№ 3/8503. Табл. VI, фиг. 1
Stereoxylodes argutus.
№ 9/8503. Табл. VI, фиг. 5

СТРЕЛЬНИКОВ С. И. (колл. № 8714). См. № 118.

203. СТУКАЛИНА Г. А. (колл. № 9282). Комплекс лландоверийских стеблей морских лилий хр. Чингиз. Информ. сборн. ВСЕГЕИ, № 35, палеонт. и страт. 1960, с. 95—110.

Описано 7 новых видов криноидей из двух комплексов форм, получившихся при стратиграфическом анализе изученной коллекции. В коллекции новых видов 6.

Голотипы:

Pentagonocyclicus lenitus Stukalina.
№ 2/9282. Рис. 2
Pentagonocyclicus aktschetauensis.
№ 3/9282. Рис. 3
Pentagonocyclicus kokajgyrensis.
№ 4/9282. Рис. 4
Pentagonopentagonalis tolenensis.
№ 5/9282. Рис. 5
Pentagonopentagonalis catagraphus.
№ 6/9282. Рис. 6
Cyclocyclicus infacetus.
№ 7/9282. Рис. 7

204. СТУКАЛИНА Г. А. (колл. № 8721). Стебли криноидей из отложений верхнего силура гор Аксарлы (Центральный Казахстан). Информ. сб. № 42, ВСЕГЕИ, 1961, с. 31—42, 2 пал. табл.

Описано 15 новых видов криноидей со схематическими изображениями боковых поверхностей и поверхностей сочленения. Изображения оригинальных экземпляров даны на фототаблицах в работе 1965 г., эти номера таблиц и фигуры для голотипов указаны в скобках. В коллекции 11 голотипов.

Голотипы:

Anthinocrinus lullowicus Stukalina.
№ 27/8721. Табл. II, фиг. 6 (Табл. II, фиг. 12, 13)
Pentagonopentagonalis facetus.
№ 26/8721. Табл. I, фиг. 7 (Табл. II, фиг. 11)
Pentagonopentagonalis quinquespinosus.
№ 31/8721. Табл. II, фиг. 5 (Табл. II, фиг. 17, 19)
Pentagonopentagonalis vitreus.
№ 23/8721. Табл. I, фиг. 5 (Табл. II, фиг. 7)
Pentagonocyclicus tricostatus.
№ 14/8721. Табл. II, фиг. 3 (Табл. I, фиг. 17)
Pentagonocyclicus salebrosus.
№ 33/8721. Табл. II, фиг. 7 (Табл. II, фиг. 20, 21)
Pentagonocyclicus monocostatus.
№ 13/8721. Табл. I, фиг. 2 (Табл. I, фиг. 14—16)
Pentagonocyclicus lenticularis.
№ 30/8721. Табл. II, фиг. 4 (Табл. II, фиг. 16)

Pentagonocyclicus definitus.
№ 22/8721. Табл. I, фиг. 1 (Табл. II, фиг. 5, 6)
Pentagonocyclicus rugatus.
№ 29/8721. Табл. I, фиг. 4 (Табл. II, фиг. 15)
Pentagonocyclicus forus.
№ 18/8721. Табл. I, фиг. 8 (Табл. II, рис. 1)

205. СТУКАЛИНА Г. Л. (колл. № 8721). Морские лилии караэспинского горизонта. В сб.: «Стратиграфия нижнепалеозойских и силурийских отложений Центрального Казахстана». ВСЕГЕИ—ЦКГУ, Л., «Недра», 1965, с. 134—141, 2 пал. табл.

Описаны остатки стеблей морских лилий из стратотипа караэспинского горизонта. Всего 5 видов, 3 новых рода. Переописаны и отнесены к новым родам. 1 новый вид Р. С. Елтышевой и 1 вид описанный ранее в работе 1961 г.

Голотипы:

Syndetocrinus (?) *natus* Stukalina.
№ 1/8721. Табл. I, фиг. 1а
Pandocrinus pandus.
№ 16/8721. Табл. I, фиг. 19
Mediocrinus medius (Yeltyschewa).
№ 7/8721. Табл. I, фиг. 8
Medinecrinus vitreus (Stukalina).
№ 23/8721. Табл. II, фиг. 7

206. СТУКАЛИНА Г. А. (колл. № 9554). К систематике семейства *Decacrinidae.* Ежег. ВПО, т. XVIII, 1968, с. 250—265, 1 пал. табл.

Описаны криноидеи двух родов одного семейства. Данные морфофункционального анализа стеблей представителей семейства позволяют автору принять его в более сокращенном объеме, чем было принято ранее. Новых вида 2.

Голотипы:

Decacrinus ovalis Stukalina.
№ 6/9554 (9554/6). Табл. I, фиг. 7
Decacrinus ornatus.
№ 11/9554 (9554/11). Табл. I, фиг. 12

207. СТУКАЛИНА Г. А. (колл. № 9707).[1)] Позднепалеозойские морские лилии Забайкалья и Монголии. В сб.: «Стратиграфия и палеонтология осадочных геологических формаций Забайкалья». Геогр. общ. СССР, Забайкальский фил., 1973, с. 16—55, 6 пал. табл.

Описано 24 вида криноидей из отложений карбона и перми, дана таблица стратиграфического распространения остатков,

[1)] Коллекция ошибочно включена в раздел силур, должна быть в разделе карбон после № 356.

анализ двух преобладающих морфофункциональных типов. Новых видов 22.

Голотипы:

Poteriocrinites (?) *mergensis* Yeltyschewa et Stukalina.
№ 49/9707 (9707/49). Табл. V, фиг. 1
Camtocrinus magnus Stukalina.
№ 2/9707 (9707/02). Табл. I, фиг. 2
Camtocrinus gutaensis.
№ 8/9707 (9707/8). Табл. II, фиг. 2
Platycrinites (?) *amantovi.*
№ 22/9707 (9707/22). Табл. III, фиг. 6
Platycrinites (?) *ovalis.*
№ 26/9707 (9707/26). Табл. III, фиг. 10
Platycrinites (?) *sebtuberosus.*
№ 27/9707 (9707/27). Табл. III, фиг. 11
Platycrinites (?) *tuberosus* Yelt. et Stuk.
№ 28/9709 (9707/28). Табл. III, фиг. 12
Platycrinites (?) *altaicus.*
№ 30/9707 (9707/30). Табл. III, фиг. 14
Platycrinites (?) *kleninae.*
№ 33/9707 (9707/33). Табл. III, фиг. 18
Kasachstanocrinus borsjiensis Yelt. et Stuk.
№ 46/9707 (9707/46). Табл. IV, фиг. 11
Tschironocrinus tschironensis.
№ 41/9707 (9707/41). Табл. IV, фиг. 6
Pentagonocyclicus priscus Stuk.
№ 57/9707 (9707/57). Табл. V, фиг. 9
Pentagonocyclicus concavus.
№ 59/9707 (9518/2059). Табл. V, фиг. 11
Pentagonocyclicus subconcentricus.
№ 60/9707 (9707/60). Табл. VI, фиг. 1
Pentagonocyclicus kangilensis Yelt. et Stuk.
№ 62/9707 (9707/62). Табл. VI, фиг. 3
Pentagonocyclicus virgalensis Sisova et Stukalina.
№ 64/9707 (9707/64). Табл. VI, фиг. 5
Pentagonocyclicus asymmetricus Yelt. et Stuk.
№ 66/9707 (9707/66). Табл. VI, фиг. 7
Pentagonocyclicus uniformis Stukalina.
№ 68/9707 (9707/68). Табл. VI, фиг. 8
Pentagonocyclicus ellipticus.
№ 70/9707 (9707/70). Табл. VI, фиг. 11
Pentagonocyclicus koejimensis Yelt. et Stuk.
№ 71/9707 (9707/71). Табл. VI, фиг. 12

СТУКАЛИНА Г. А. (колл. № 10447). См. № 119.

208. СТУКАЛИНА Г. А. (колл. № 12212). Криноидеи. В кн.: «Токрауский горизонт верхнего силура». Алма-Ата, Наука, 1986, с. 77—86, 2 пал. табл.

Описано 15 видов криноидей из типовых отложений для токрауского горизонта Казахстана (поздний силур). Новый род 1, новых видов 9.

Голотипы:

Ctenocrinus pusillus Stukalina.
№ 7/12212. Табл. I, фиг. 7
Anthinocrinus costatus.
№ 16/12212. Табл. I, фиг. 16
Bazaricrinus stellatilobatus.
№ 11/12212. Табл. I, фиг. 11
Karakolocrinus laticanalis.
№ 14/12212. Табл. I, фиг. 14
Pennatocrinus praepennatus.
№ 12/12212. Табл. I, фиг. 12
Mediocrinus simplex.
№ 19/12212. Табл. II, фиг. 1
Pandocrinus fascicularis.
№ 25/12212. Табл. II, фиг. 7
Medinecrinus vulgaris.
№ 31/12212. Табл. II, фиг. 13
Dactaricrinus digitatus.
№ 24/12212. Табл. II, фиг. 6

209. СЫТОВА В. А. (колл. № 8710). Ругозы боровушкинской свиты (верхний силур) Рудного Алтая. Вопр. палеонтологии, т. V, 1966, с. 93—100, 3 пал. табл.

Описано 12 форм, принадлежащих 12 родам, из них 2 рода и 3 вида новые.

Голотипы:

Zelophyllum seraphimae Sytova.
№ 6а, б/8710. Табл. I, фиг. 4
Neobrachyelasma altaica.
№ 11а, б/8710. Табл. I, фиг. 5
Implicophyllum aitalievi.
№ 15а, б/8710. Табл. II, фиг. 1

210. СЫТОВА В. А. (колл. № 11702). Некоторые ругозы (кораллы) из силурийских отложений опорного разреза «Элегест» (Тува). Вопр. палеонтологии, т. 8, 1979, с. 29—37, 4 пал. табл.

Описано 2 новых рода, 14 видов, из них 5 новых.

Голотипы:

Sokoloviella delicata Sytova.
№ 1/11702. Табл. IV, фиг. 3

Pseudopilophyllum elegestum Syt.
№ 4/11702. Табл. I, фиг. 1
Phaulacris semaiophylloides.
№ 6/11702. Табл. I, фиг. 4
Tenuiphyllum crassum.
№ 99/11702. Табл. IV, фиг. 2
Strombodes tuvensis.
№ 69/11702. Табл. IV, фиг. 1

211. ЧЕРНЫШЕВ Б. Б. (колл. № 11174). Силурийские и девонские *Tabulata* Монголии и Тувы. АН СССР, Тр. Монгольской комиссии № 30, вып. 6, 1937, 34 с., 4 пал. табл.
Описано 17 видов, из них 8 новых и 2 открытой номенклатуры, 1 новый вариетет и 2 формы с родовым определением. В коллекции 6 новых видов и 1 вариетет.

Голотипы:

Favosites forbesi var. *tuvaensis* B. Tchernychev.
№ 4а, б/11174. Табл. I, фиг. 4а, б
Favosites alashensis B. Tchern.
№ 5а, б/11174. Табл. I, фиг. 5а, б
Palaeofavosites mirabilis.
№ 6а, б/11174. Табл. II, фиг. 1а—с
Alveolites hemisphericus.
№ 7а, б/11174. Табл. II, фиг. 2а, б
Alveolites ryčkovskii.
№ 8а—в/11174. Табл. III, фиг. 1а—с
Syringopora tuvaensis.
№ 9а, б/11174. Табл. IV, фиг. 1а, в
Heliolites lebedevae.
№ 12а—г/11174. Рис. 5, 6

212. ЧЕХОВИЧ В. Д. (колл. № 9207). В. Н. ДУБАТОЛОВ и В. Д. ЧЕХОВИЧ. К вопросу о границе силура и девона в юго-западной части Кузнецкого бассейна и Средней Азии. В сб.: «Силурийские и девонские кораллы Азиатской части СССР». «Наука», 1964, с. 3—77, 7 пал. табл.
Описано 14 видов табулят и 3 подвида, из них 9 видов и 2 подвида новые. В коллекции 6 новых видов и 2 подвида.

Голотипы:

Favosites pactum Chekhovich.
№ 32а, б/9207. Табл. II, фиг. 3
Favosites clarus leptotheichus Chekh.
№ 48а, б/9207. Табл. V, фиг. 1
Favosites shiriktensis.
№ 51а, б/9207. Табл. V, фиг. 2
Favosites subtarejaensis.
№ 49а, б/9207. Табл. V, фиг. 4

Pachyfavosites kozlowskii minima.
№ 60а/9207. Табл. VII, фиг. 2
Squameofavosites isfaraensis.
№ 69а, б/9207. Табл. VI, фиг. 3
Squameofavosites kuniakensis.
№ 73а, б/9207. Табл. VI, фиг. 2
Squameofavosites kokshalensis.
№ 77а, б/9207. Табл. VII, фиг. 1

213. ЧЕХОВИЧ В. Д. (колл. № 8569). Биостратиграфическое расчленение силура Приполярного Урала по табулятам. В сб.: «Табулятоморфные кораллы ордовика и силура СССР». Тр. Всес. симп. по изуч. ископ. кораллов, вып. 1. М., «Наука», 1965, с. 59—86, 1 пал. табл.

Описана коллекция силурийских табулят, впервые изученных из силура Азии. Всего 8 видов и 1 форма, из них 2 вида новые.

Голотипы:

Multisolenia uralica Chekhovich.
№ 8а, б/8569. Табл. XV, фиг. 5, 6
Mesosolenia silenoidea Chekh.
№ 9а, б/8569. Табл. XV, фиг. 4

214. ЧЕХОВИЧ В. Д. (колл. № 9600). В работе В. Н. Дубатолов, В. Д. Чехович, Ф. Е. Янет. Табуляты пограничных слоев силура и девона Алтае-Саянской горной области и Урала. В кн.: «Кораллы пограничных слоев силура и девона Алтае-Саянской горной области и Урала», 1968, с. 5—109, 48 пал. табл.

Изучена большая колллекция табулят и гелиолитид, проанализированы данные о распространении кораллов в отложениях, приведены сведения о корреляции карбонатных и терригенно-карбонатных разрезов по данным изучения кораллов. Описан 61 вид и 3 подвида, из них 34 новые. В коллекции 9 новых видов описанных Чехович В. Д.

Голотипы:

Laceripora minima Chekhovich.
№ 4а, б/9600. Табл. II, фиг. 2
Favocites syvjuensis Chekh.
№ 33а, б/9600. Табл. VIII, фиг. 1
Favosites ramiferus.
№ 38а, б/9600. Табл. IX, фиг. 1
Favosites polaris.
№ 30а, б/9600. Табл. XI, фиг. 1
Squameofavosites betjuensis.
№ 50а, б/9600. Табл. XXVI, фиг. 3, 4
Parastriatopora spinosa.
№ 55а, б/9600. Табл. XXXI, фиг. 3

Parastriatopora admirabile.
№ 60а, б/9600. Табл. XXXII, фиг. 2
Parastriatopora uralica.
№ 58а, б/9600. Табл. XXXI, фиг. 6
Parastriatopora (?) *paradoxa.*
№ 64а, б/9600. Табл. XXXIII, фиг. 2

215. ЧЕХОВИЧ В. Д. (колл. № 11002). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 5, 1980, с. 10—12.
Описано 2 новых вида табулят из силура Тувы, один из них отнесен к новому роду.

Голотипы:

Kysilites tchiraensis Chekhovich.
№ 2а, б/11002. Табл. IV, фиг. 2
Ciliapora pitchiensis Chekh.
№ 4а, б/11002. Табл. IV, фиг. 4

216. ШЕЙНМАНН Ю. М. (колл. № 2362). Мшанки верхнего силура р. Средней Тунгуски. Изв. Геол. Ком., т. XLV, № 7, 1926, с. 783—794, 1 пал. табл.
Детальное сравнение описанной фауны с видами того же рода из верхнего силура Северной Америки и о. Готланд привело автора к выводу о верхнесилурийском возрасте вмещающих фауну отложений. Описано 4 новых вида.

Голотипы:

Phaenopora gregaria Schoenmann.
№ 1, 1а, б/2362. Табл. XXV, рис. 4—7; рис. 2
Phaenopora transenna.
№ 6, 6а—с/2362. Табл. XXV, рис. 10—15; рис. 3
Clathropora sibirica.
№ 46, 46а—с/2362. Табл. XXV, рис. 8—9; рис. 4
Spatiopora teres.
№ 48, 48а, в/2362. Табл. XXV, рис. 1—3

217. ЯВОРСКИЙ В. И. (колл. № 2595). Силурийские *Stromatoporoidea.* Изв. Геол. Ком., т. XLVIII, № 1, 1929, с. 77—114, 7 пал. табл.
В работе описаны материалы из отложений позднего силура Подолии, Салаирского кряжа, Эстонии, Вайгача, о. Готланд. Всего 20 видов, 1 вариетет, 1 форма с родовым определением. Новых видов 10, 2 новых вариетета.

Голотипы и синтипы:

Actinostroma podolicum Yavorsky.
№ 1а, б/2595. Табл. V, фиг. 3
№ 2, 2а, б/2595. Табл. V, фиг. 5
№ 3, 3а, б/2595. Табл. V, фиг. 6

Actinostroma intermedium Yavor.
№ 4, 4а, б/2595. Табл. V, фиг. 7, 8 *
Actinostroma pexisum.
№ 5/2595 (шлифы отсутствуют) *
Clathrodictyon convictum.
№ 18/2595 (шлифы отсутствуют) *
Clathrodictyon salairicum.
№ 19, 19а, б/2595. Табл. IX, фиг. 8; табл. X, фиг. 1 *
Beatricea tenuitextilis.
№ 20а—г/2595. Табл. XII, фиг. 7, 8 *
Stromatopora lamellosa.
№ 24, 24а, б/2595. Табл. XI, фиг. 3, 4 *
Stromatopora tuberculata.
№ 25, 25а, б/2595. Табл. XI, фиг. 5, 6 *
Stromatopora venukovi.
№ 26, 26а, б/2595. Табл. XI, фиг. 8, 9 *
Syringostroma fedorovi.
№ 27, 27а, б/2595. Табл. XII, фиг. 1—3

218. ЯВОРСКИЙ В. И. (колл. № 5630). Некоторые палеозойские и мезозойские *Hydrozoa, Tabulata* и *Algae.* Монографии по палеонтологии СССР, том XX, вып. 1, 1947, 30 с., 12 пал. табл.

Описано 39 видов строматопорат, из них 33 новых, 3 новых рода и 3 новых вариетета, 1 форма с родовым определением; 6 видов гидроидных, из них 3 новых; 2 новых вида шестилучевых кораллов и 1 новый вид водорослей. В коллекции 10 видов и 1 вариетет строматопорат из палеозойских отложений, из них 7 видов и 1 вариетет новые.

Голотипы:

Actinostroma uralicum Yavorsky.
№ 2, 2а, в/5630. Табл. I, фиг. 3, 4
Stromatopora angulata Yavor.
№ 25, 25а, б/5630. Табл. IV, фиг. 11
Stromatopora tyrganica.
№ 28, 28а, в/5630. Табл. V, фиг. 1, 2
Stromatopora deržavini.
№ 30, 30а, в/5630. Табл. V, фиг. 5, 6
Stromatopora kirgisica.
№ 31а, в/5630. Табл. V, фиг. 7, 8
Stromatoporella yegorovi.
№ 39, 39а—с/5630. Табл. VI, фиг. 12; табл. VII, фиг. 1
Stromatoporella turensis.
№ 40, 40а/5630. Табл. VI, фиг. 13; табл. VII, фиг. 2

Syringostroma centrotum var. *kirgisica.*
№ 41, 41а, в/5630. Табл. VII, фиг. 3, 4

219. ЯВОРСКИЙ В. И. (колл. № 6854). Некоторые палеозойские строматопороидеи. ВСЕГЕИ, 1951, 33 с., 6 пал. табл.

Описано 12 видов строматопорат и 3 вариетета, из них 8 видов и вариететы новые. Приведена таблица распространения палеозойских и мезозойских представителей изученной группы.

Голотипы:

Actinostroma crassum Yavorsky.
№ 1, 1а, в/6854. Табл. I, фиг. 1, 2
Actinostroma istokense Yavor.
№ 3а—с/6854. Табл. I, фиг. 5—7
Clathrocoilona intscherepense.
№ 4, 4а, в/6854. Табл. I, фиг. 8; табл. II, фиг. 1
Clathrodictyon variabile var. *vilvense.*
№ 5, 5а, в/6854. Табл. II, фиг. 2, 3
Stromatopora sokolensis.
№ 10, 10а—с/6854. Табл. III, фиг. 5, 6
Stromatopora grintschukensis.
№ 11, 11а, в/6854. Табл. III, фиг. 7, 8
Stromatopora carteri var. *podolica.*
№ 12, 12а, в/6854. Табл. IV, фиг. 1, 2
Stromatopora convicta.
№ 13, 13а, в/6854. Табл. IV, фиг. 3, 4
Hermatostroma detzavini.
№ 16, 16а, в/6854. Табл. IV, фиг. 7, 8; табл. V, фиг. 1
Hermatostroma episcopale var. *talovense.*
№ 17, 17а, в/6854. Табл. V, фиг. 2—4
Idiostroma elegans.
№ 18, 18в—с/6854. Табл. V, фиг. 5—7

220. ЯВОРСКИЙ В. И. (колл. № 8641). Некоторые силурийские и девонские строматопороидеи Печорского бассейна. Тр. ВСЕГЕИ, вып. 1, нов. сер., т. 115, 1965, с. 218—233, 7 пал. табл.

Описано 17 видов строматопорат, из них 14 новых, 4 вида в открытой номенклатуре и 2 с определениями до рода. Изучение имеющегося у автора материала позволило внести изменения в определения ранее описанных форм.

Голотипы:

Atelodictyon nekhoroshevi Yavorsky.
№ 1, 1а—в/8641. Табл. I, фиг. 1—3

Atelodictyon pulchrum Yavor.
№ 4, 4а, б/8641. Табл. I, фиг. 7, 8
Atelodictyon tenuicellulosum.
№ 5, 5а, б/8641. Табл. II, фиг. 1, 2
Intexodictyon densum.
№ 7, 7а, б/8641. Табл. II, фиг. 6, 7
Intexodictyon tenuitextilum.
№ 8, 8а—в/8641. Табл. II, фиг. 8; табл. III, фиг. 1, 2
Intexodictyon khalfinae.
№ 10, 10а, б/8641. Табл. III, фиг. 4, 5
Clathrodictyon pissarevae.
№ 11, 11а, б/8641. Табл. III, фиг. 6
Cystostroma diversum.
№ 13, 13а, б/8641. Табл. IV, фиг. 1—3
Trupetostroma junkense.
№ 16, 16а—в/8641. Табл. V, фиг. 1—3
Stachyodes tschernyschevi.
№ 17, 17а/8641. Табл. VI, фиг. 1—3
Stachyodes tschernovi.
№ 21а/8641. Табл. VII, фиг. 1, 2
Paramphipora grandis.
№ 23а/8641. Табл. VII, фиг. 3—6
Paramphipora composita.
№ 24а/8641. Табл. VII, фиг. 7—13
Paramphipora acteoni.
№ 25а/8641. Табл. V, фиг. 6—9

221. ЯВОРСКИЙ В. И. (колл. № 7351). *Stromatoporoidea* Советского Союза. Часть пятая. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 148. М., «Недра», 1967, 56 с., 29 пал. табл.

Коллекция к завершающей сводке по данной группе фауны содержит 80 экземпляров строматопороидей, представляющих гидроктиноидную и миллепороидную группы из отложений силура-девона. Всего описано 69 видов, из них 51 вид новый; 11 видов в открытой номенклатуре, 6 с родовыми определениями, 3 вида с новыми названиями, 3 новых рода. В коллекции 41 новый вид.

Голотипы и синтипы:

Actinostroma nicholsoni Yavorsky.
№ 540а, б/7351. Табл. I, фиг. 1, 2 *
Actinostroma miraculum Yavor.
№ 541а, б/7351. Табл. I, фиг. 3, 4 *
Atelodictyon nikitini.
№ 542а, б/7351. Табл. I, фиг. 5, 6 *
Atelodictyon bargatzkyi.
№ 543а, б/7351. Табл. I, фиг. 7, 8 *

Atelodictyon incertum.
№ 544а, б/7351. Табл. VI, фиг. 1, 2 *
Clathrodictyon nelynense.
№ 545а/7351. Табл. II, фиг. 1
№ 546а/7351. Табл. II, фиг. 2
Intexodictyon usitatum.
№ 548а, б/7351. Табл. II, фиг. 4, 5 *
Intexodictyon rectum.
№ 549а, б/7351. Табл. II, фиг. 6, 7 *
Labechia duplexicis.
№ 550а/7351. Табл. II, фиг. 8 *
Labechia sirtensis.
№ 551а, б/7351. Табл. III, фиг. 1, 2 *
Labechia aequalis.
№ 552а, б/7351. Табл. IV, фиг. 4—6 *
Rosenellinella venusta.
№ 555а/7351. Табл. III, фиг. 3
№ 556а/7351. Табл. III, фиг. 4
Bullulodictyon patokense.
№ 557а, б/7351. Табл. III, фиг. 5—7 *
Trupetostroma undatum.
№ 562а, б/7351. Табл. VII, фиг. 1, 2 *
Trupetostroma krusseri.
№ 563а, б/7351. Табл. VII, фиг. 3, 4 *
Trupetostroma irregulare.
№ 568а, б/7351. Табл. VIII, фиг. 1—3 *
Trupetostroma gallowayi.
№ 569а, б/7351. Табл. VIII, фиг. 4—6 *
Trupetostroma lecomptei.
№ 571а, б/7351. Табл. IX, фиг. 1—3 *
Trupetostroma compositum.
№ 572а, б/7351. Табл. IX, фиг. 4—6 *
Trupetostroma diversum.
№ 573а/7351. Табл. IX, фиг. 7
№ 574а/7351. Табл. IX, фиг. 8
№ 575а/7351. Табл. IX, фиг. 9
Trupetostroma obesum.
№ 579а, б/7351. Табл. XI, фиг. 1—3 *
Trupetostroma tschernyschevi.
№ 580а, б/7351. Табл. XI, фиг. 4—8; табл. XII, фиг. 1 *
Parallelopora actaeonis.
№ 581а, б/7351. Табл. XII, фиг. 2, 3 *
Stromatopora radiata.
№ 582а/7351. Табл. XII, фиг. 7
№ 583а/7351. Табл. XXIX, фиг. 1
Idiostroma subtile.
№ 585а/7351. Табл. XIII, фиг. 1
№ 586а/7351. Табл. XIII, фиг. 2

Idiostroma tschernyschevi.
№ 587а/7351. Табл. XIII, фиг. 3—5 *
Idiostroma concentricum.
№ 588а/7351. Табл. XXIX, фиг. 2 *
Stachyodes discludois.
№ 589а/7351. Табл. XIV, фиг. 1—4
№ 590а/7351. Табл. XV, фиг. 1—2
Stachyodes condenseporoides.
№ 591а/7351. Табл. XV, фиг. 5, 7, 8 *
Vicinostachyodes multiplex.
№ 604а/7351. Табл. XIII, фиг. 6; табл. XXIII, фиг. 1 *
Vicinostachyodes microporoides.
№ 605а/7351. Табл. XV, фиг. 10, 11
№ 606а/7351. Табл. XX, фиг. 3; табл. XXIV, фиг. 2—4, табл. XXIII, фиг. 4
Vicinostachyodes laginensis.
№ 607а, б/7351. Табл. XXIX, фиг. 3—5 *
Paramphipora amfioni.
№ 608а/7351. Табл. XVIII, фиг. 8—10; табл. XXV, фиг. 11 *
Paramphipora directura.
609а, б/7351. Табл. XXV, фиг. 6—8
Paramphipora ampluporoides.
№ 612а/7351. Табл. XXV, фиг. 9, 10
Paramphipora vojvensis.
№ 613а, б/7351. Табл. XXVI, фиг. 4; табл. XXVII, фиг. 12; табл. XXVIII, фиг. 4, 5
Paramphipora peculiaris.
№ 614а/7351. Табл. XXVI, фиг. 1—3; табл. XXVIII, фиг. 1
Paramphipora mediocris.
№ 615а/7351. Табл. XXVII, фиг. 1—6
Paramphipora hanimedi.
№ 616/7351. Табл. XXVII, фиг. 7—9
Paramphipora abluta.
№ 617а/7351. Табл. XXVII, фиг. 10, 11
Paramphipora corrupta.
№ 620а/7351. Табл. XXVIII, фиг. 7, 8

222. ЯВОРСКИЙ В. И. (колл. № 9608). *Rosenellinella* — новый раннесилурийский род Тувы. Ежег. ВПО, т. XVIII, 1968, с. 361, 362, 1 пал. табл.

Кратко описан новый род и новый вид строматопорат из венлокских отложений р. Элегест.

Голотип:

Rosenellinella bisyllaba Yavorsky.
№ 1, 1а, б/9608. Табл. I, фиг. 1—3

223. АБУШИК А. Ф. (колл. № 8154). Среднедевонские лепердитииды Урала, Новой Земли и Средней Азии. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 67, 1961, с. 133—145, 3 пал. табл.

Изученная коллекция остракод позволила составить схему сопоставления среднедевонских отложений некоторых районов Урала и Новой Земли. Описано 7 новых видов и 2 новых вариетета.

Голотипы:

Leperditia planula Abushik.
№ 1/8154. Табл. I, фиг. 1
Herrmannina moderata.
№ 3/8154. Табл. I, фиг. 3
Mölleritia rotunda.
№ 9/8154. Табл. I, фиг. 6
Mölleritia obliqua.
№ 19/8154. Табл. I, фиг. 16
Mölleritia egorovi.
№ 23/8154. Табл. II, фиг. 1
Mölleritia quadrigibbera.
№ 35/8154. Табл. II, фиг. 12
Mölleritia nana.
№ 59/8154. Табл. I, фиг. 23

224. АБУШИК А. Ф. (колл. № 8184). Два новых вида позднедевонских лепердитиид Сибирской платформы. Палеонт. журн. № 1, 1963, с. 100—104, 1 пал. табл.

Рассмотрен позднедевонский этап в развитии одного семейства остракод. Описано два новых вида.

Голотипы:

Moelleritia crassa Abushik.
№ 1/8184. Табл. IX, фиг. 1
Moelleritia tenuis.
№ 15/8184. Табл. IX, фиг. 15

АБУШИК А. Ф. (колл. № 8247). См. № 137.

225. АБУШИК А. Ф. (колл. № 9677). Остракоды борщовского горизонта Подолии. В сб.: «Биостратиграфия пограничных отложений силура и девона». «Наука», 1968, с. 49—73.

Изученная коллекция позволяет автору подразделить борщовский горизонт Подолии на три части согласно распространению остракод. Описано 20 видов, из них 18 новых и 2 рода в открытой номенклатуре.

Голотипы:

Leperditia prominentis Abushik.
№ 1/9677. Табл. I, фиг. 1
Cryptophyllus triangulus.
№ 3/9677. Табл. I, фиг. 4
Aechmina subcuspidata.
№ 7/9677. Табл. II, фиг. 1
Opisthoplax subcompressa.
№ 9/9677. Табл. I, фиг. 7
Opisthoplax gyratus.
№ 11/9677. Табл. I, фиг. 9
Phlyctiscapha podolica.
№ 14/9677. Табл. II, фиг. 9
Ulrichia elegans.
№ 16/9677. Табл. II, фиг. 4
Ulrichia obliqua.
№ 19/9677. Табл. II, фиг. 6
Richina biconica.
№ 25/9677. Табл. III, фиг. 6
Richina propria.
№ 26/9677. Табл. III, фиг. 7
Richina varia.
№ 27/9677. Табл. III, фиг. 5
Dizygopleura mira.
№ 30/9677. Табл. IV, фиг. 1
Ponderodictya mirabilis.
№ 31/9677. Табл. IV, фиг. 2
Healdia unicornis.
№ 39/9677. Табл. III, фиг. 8
Healdia alveilata.
№ 42/9677. Табл. V, фиг. 8
Healdia? obtusa.
№ 46/9677. Табл. V, фиг. 9
Healdianella mutica.
№ 47/9677. Табл. IV, фиг. 9
Baschkirina arta.
№ 49/9677. Табл. IV, фиг. 5

226. АБУШИК А. Ф., ТРАНДАФИЛОВА Е. Ф. (колл. № 10350). Раннедевонские полоннеллы (*Ostracoda*) Молдавии. Биострат. сборник, Палеонтология и стратиграфия палеозоя СССР, нов. сер., т. 289. Л., 1978, с. 42—53, 3 пал. табл.

Остатки остракод изученного рода равномерно распределены по всему разрезу Молдавии, встречены на Украине, в Польше, Тюрингии и являются материалом для корреляции. Описано 6 новых видов и 1 новый подвид.

Голотипы:

Poloniella alexanderi acutata Abushik et Trandafilova.
№ 1/10350. Табл. I, фиг. 1
Poloniella costata.
№ 8/10350. Табл. I, фиг. 9
Poloniella margaritae.
№ 20/10350. Табл. II, фиг. 4
Poloniella rara.
№ 31/10350. Табл. II, фиг. 15
Poloniella deplanata.
№ 41/10350. Табл. III, фиг. 3
Poloniella cornuta.
№ 47/10350. Табл. III, фиг. 9
Poloniella jucunda.
№ 51/10350. Табл. III, фиг. 13

АБУШИК А. Ф. (колл. № 9515). См. № 141.

227. АБУШИК А. Ф. (колл. № 12509)[1]. Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 5, 1980, с. 37—42.
Описано 7 новых видов, 1 новый подвид и 1 новый род остракод.

Голотипы:

Clavofabellina abunda miscella Abushik.
№ 1/12509 (1/9515). Табл. XII, фиг. 1
Clavofabellina attenuata.
№ 5/12509 (5/9515). Табл. XII, фиг. 5
Clavofabellina? dorsicostata.
№ 10/12509 (10/9515). Табл. XII, фиг. 12
Kielciella sulcata.
№ 14/12509 (14/9515). Табл. XII, фиг. 10
Primitiopsella multifoveata.
№ 16/12509 (16/9515). Табл. XII, фиг. 16
Welleriella ventriumbonata.
№ 20/12509 (20/9515). Табл. XIII, фиг. 1
Kloedenia? kozhimica.
№ 24/12509 (24/9515). Табл. XIII, фиг. 12
Costokloedenia bicostata.
№ 26/12509 (26/9515). Табл. XIII, фиг. 5

АБУШИК А. Ф. (колл. № 12084). См. № 143.

228. БАЛАШОВА Е. А., БАЛАШОВ З. Г. (колл. № 9051). Материалы к познанию верхнеараменской фауны Казахстана. Вестник ЛГУ, № 1, 1954, с. 179—202, 2 пал. табл.

---

[1] Номер коллекции 9515 в публикации указан ошибочно.

Описано 5 видов двустворок, 1 гастропод, 5 видов головоногих моллюсков, из них 1 новый и 5 видов трилобитов, из них 1 новый. В коллекции из новых видов только трилобит.

Голотип:

Cyrtosymbole (Cyrtosymbole) granulifera.
№ 11/9051. Табл. II, фиг. 4

229. БЕРГЕР А. Я. (колл. № 10590). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 5, 1980, с. 36.
Описан 1 новый вид тентакулид из девона Подолии.

Голотип:

Turmalites duplanullatus Berger.
№ 10/10590. Табл. XI, фиг. 5

230. БЕРГЕР А. Я. (колл. № 10590). Раннедевонские представители рода *Tentaculites* Подолии. Ежег. ВПО, т. XXVI, 1983, с. 276—294.
Описано 7 видов тентакулитов, из них 4 новых.

Голотипы:

Tentaculites mitkovensis Berger.
№ 1/10590. Табл. I, фиг. 1
Tentaculites excellens.
№ 4/10590. Табл. I, фиг. 4
Tentaculites formalis.
№ 6/10590. Табл. I, фиг. 6
Tentaculites (?) *crassus.*
№ 11/10590. Табл. III, фиг. 4

232. БЕРГЕР А. Я. (колл. № 10079). *Tiverites* — новый род раннедевонских тентакулид. Ежег. ВПО, т. XXXII, 1989, с. 218—228, 2 пал. табл.
Описано 4 вида тентакулид из нижнего девона Подолии, отнесенных к новому роду. Новых 3 вида, в коллекции 2.

Голотипы:

Tiverites finitimus Berger.
№ 1/10079. Табл. I, фиг. 1
Tiverites polymorphus.
№ 9/10079. Табл. II, фиг. 2

232. БУЛЬВАНКЕР Э. З. (колл. № 8635). Материалы к изучению фауны Таштыпской свиты Минусинской котловины. М. А. Ржонсницкая, В. С. Мелещенко, Н. А. Беляков и др. Тр. ВСЕГЕИ, палеонт. и биострат., 1952, с. 120—189, 1 пал. табл.
Описано 3 новых вида ругоз, отнесенных к новому роду. Отмечено, что встреченные ругозы отличаются своеобразным

строением и не дают возможности определить возраст вмещающих отложений.

Голотипы:

Minussiella beliakovi Bulvanker.
№ 1а, в/8635. Табл. XII, фиг. 2а, б
Minussiella kulagaiensis Bulv.
№ 2а, в/8635. Табл. VII, фиг. 1а, б
Minussiella asiatica.
№ 3а—с/8635. Табл. VII, фиг. 5

233. БУЛЬВАНКЕР Э. З. (колл. № 9109). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР, часть 1, 1960, с. 234—245.
Описано 6 новых видов ругоз из девона Новой Земли.

Голотипы:

Pseudomicroplasma parakuznetskiensis Bulvanker.
№ 1/9109. Табл. 50, фиг. 1
Arcophyllum yakovlevi Tchernychev.
№ 4/9109. Табл. 50, фиг. 2; табл. 51, фиг. 1
Tabulophyllum paranormale Bulvanker.
№ 5/9109. Табл. 55, фиг. 2
Loyolophyllum originale Bulv.
№ 7/9109. Табл. 57, фиг. 1
Loyolophyllum crassispinosum Tchern.
№ 8/9109. Табл. 58, фиг. 1
Stringophyllum tchernychevi Bulv.
№ 9/9109. Табл. 59, фиг. 1

234. БУЛЬВАНКЕР Э. З. (колл. № 8557). Первые данные о девонских ругозах Северо-Востока СССР. В сб.: «Ругозы палеозоя СССР». Тр. I Всес. симпозиума по изучению ископаемых кораллов СССР, вып. 3, 1965, с. 54—58.
Описано 6 новых видов ругоз.

Голотипы:

Aulacophyllum pepelaievi Bulvanker.
№ 1а—в/8557. Табл. XXIII, фиг. 1а—г
Aulacophyllum cylindricum Bulv.
№ 2а—в/8557. Табл. XXIV, фиг. 1а—в
Acanthophyllum nikolaievi.
№ 3а, б/8557. Табл. XVI, фиг. 1а, б
Taimyrophyllum colymensis.
№ 4а, б/8557. Табл. XVII, фиг. 1а—в
Fasciphyllum longiseptatum.
№ 5а—в/8557. Табл. XIV, фиг. 1а—в
Minussiella solida.
№ 6а—в/8557. Табл. XX, фиг. 1а—в

235. БУЛЬВАНКЕР Э. З. (колл. № 9109). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР, вып. II, часть II, 1968, с. 27—40.

Описано 6 новых видов ругоз из девона Новой Земли.

Голотипы:

Cystiphylloides porfirjevi Bulvanker.
№ 16/9109. Табл. 11, фиг. 3
Heliophyllum paramirabile Bulv.
№ 13/9109. Табл. 15, фиг. 1
Heliophyllum tcherkessovae.
№ 14/9109. Табл. 16, фиг. 2
Grypophyllum paraagregatum.
№ 11/9109. Табл. 18, фиг. 1
Grypophyllum arcticum.
№ 12/9109. Табл. 19, фиг. 1
Neospongophyllum multivesiculosum.
№ 17/9109. Табл. 21, фиг. 1

236. БУТУСОВА И. П. (колл. № 9285). Некоторые гастроподы мамонтовских слоев среднего девона Кузнецкого бассейна. Информ. сборн. ВСЕГЕИ, № 35, палеонт. и страт., 1960, с. 81—89.

Описано 3 новых вида гастропод, очень характерные для мамонтовских слоев Кузнецкого бассейна.

Голотипы:

Bucanella gurjevskensis Butusova.
№ 1/9285. Рис. 1а, б
Bucanopsis carinifera salairica.
№ 2/9285. Рис. 2а, б
Strobeus arculatus sibiricus.
№ 3/9285. Рис. 3а, б

237. ВОЛОГДИН А. Г. (колл. № 9321). Известковые водоросли зоны так называемых каратауских брекчий (Кара-Тау, Казахская ССР). Изв. АН СССР, сер. биологическая, № 1, 1948, с. 83—91, 2 пал. табл.

Описаны остатки известковых водорослей из двух горизонтов девона, отнесенные к 2 новым видам, один из которых, по мнению автора, является предковой формой другого.

Голотипы:

Boroldaiphycus borovikovi Vologdin.
№ 1/9321. Табл. I, рис. 1—4
Boroldaiphycus terektaensis Vlgd.
№ 2, 2а—г/9321, Табл. II, рис. 1—4

238. ЕЛТЫШЕВА Р. С., СИЗОВА Е. Н. (колл. № 8676). *Anthinocrinidae* — новое семейство среди палеозойских морских

лилий. В сб.: «Вопросы страт. и тектоники Восточного Казахстана». Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 160, 1973, с. 86—99, 1 пал. табл.

Описано 7 новых видов и 1 новый подвид криноидей, как наиболее типичные виды изученного семейства.

Голотипы:

Anthinocrinus floreus Yeltyscheva.
№ 3/8676. Табл. I, фиг. 3
Anthinocrinus floreus rotundus Yeltyscheva et Sisova.
№ 5/8676. Табл. I, фиг. 5
Anthinocrinus carbonicus Yelt.
№ 10/8676. Табл. I, фиг. 10
Anthinocrinus primaevus Sis.
№ 13/8676. Табл. I, фиг. 13
Kasachstanocrinus stellatus Yelt. et Sis.
№ 8/8676. Табл. I, фиг. 8
Kasachstanocrinus formosus.
№ 16/8676. Табл. I, фиг. 9
Kasachstanocrinus pentamerus.
№ 15/8676. Табл. I, фиг. 15
Kasachstanocrinus soboleevi.
№ 17/8676. Табл. I, фиг. 17

239. ЗАНИНА И. Е. (колл. № 9286). Новые позднедевонские остракоды центральных районов Русской платформы. Палеонт. журн. № 3, 1960, с. 77—89, 7 пал. табл.

Описано 10 новых видов остракод из девона Русской платформы.

Голотипы:

Impostor pellax Zanina.
№ 1/9286. Табл. VI, фиг. 1
Coryellina imitotrix.
№ 4/9286. Табл. VI, фиг. 4
Illativella clivosa.
№ 6/9286. Табл. VI, фиг. 6
Tenebrion ? devonicus.
№ 12/9286. Табл. VII, фиг. 1
Youngiella griasiensis.
№ 11/9286. Табл. VII, фиг. 2
Semilukiella cosharica.
№ 13/9286. Табл. VII, фиг. 3
Indivisia variolata.
№ 18/9286. Табл. VII, фиг. 5
Marginia costatiformis.
№ 17/9286. Табл. VII, фиг. 7
Carbonita lipetzkensis.
№ 20/9286. Табл. VII, фиг. 8

Rectella famenniensis.
№ 22/9286. Табл. VII, фиг. 9

240. КАПЛУН Л. И. (колл. № 12737). Брахиоподы нижнего и среднего девона Джунгаро-Балхашской провинции. В сб.: «Биостратиграфия нижнего и среднего девона Джунгаро-Балхашской провинции». СО АН СССР, 1991, с. 111—147, 20 пал. табл.

Описано 16 видов и 3 новых подвида. Новых видов 11, в коллекции 6 новых видов и 2 подвида.

Голотипы:

Dalejodiscus minor kazachstanica Kaplun.
№ 6/12737. Табл. XXIV, фиг. 1
Mesoleptostrophia (Paraleptostrophia) lepsensis.
№ 18/12737. Табл. XXV, фиг. 1
Machaeraria nalivkini.
№ 13/12737. Табл. XXIV, фиг. 13
Delthyris besobensis.
№ 30/12737. Табл. XXVII, фиг. 1
Ivanothyris subgrandis.
№ 40/12737. Табл. XXVIII, фиг. 1
Quadrithyris katbasensis.
№ 35/12737. Табл. XXVII, фиг. 6
Mauispirifer gosseleti kazachstanensis.
№ 42/12737. Табл. XXXI, фиг. 1
Cranaena (Asiacranaena) koldarensis.
№ 55/12737. Табл. XXXV, фиг. 3

241. КОРЕНЬ Т. Н. (колл. № 10505). Early Devonian monograptids of the telleri biozone in the Urals — Tien Show fold area. In.: «Acta Geol. Polonica», vol. 25, N 1, 1975, pp. 1—24.

Детально описано 5 видов и 1 подвид граптолитов семейства монограптид, из них 1 новый вид; рассмотрены их систематическое положение, морфологические особенности, филогения и стратиграфическое значение.

Голотип:

Monograptus fanicus Koren.
№ 7/10505. Табл. II, фиг. 5

242. КРАВЦОВ А. Г. (колл. № 8677). Раннедевонские четырехлучевые кораллы с реки Тареи (Центральный Таймыр). Ученые зап. НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 3, 1963, с. 5—49, 15 пал. табл.

Описано 18 видов ругоз, из них 13 видов новых. В коллекции новых видов 12, для одного вида выбран голотип из неопубликованной коллекции Чернышева Б. Б. № 6192, но не приведено изображение экземпляра, хранящегося в музее.

Голотипы:

Zmeinogorskia tareica Kravtsov.
№ 19а—г/8677. Табл. IV, фиг. 2а, б
Pseudomicroplasma monentaria Kr.
№ 10а, б/8677. Табл. V, фиг. 1а, б
Pseudomicroplasma compacta.
№ 14а, б/8677. Табл. VI, фиг. 3а, б
Zonophyllum breviculum.
№ 15а, б/8677. Табл. VII, фиг. 1а, б
Zonophyllum septentrionarium.
№ 16а, б/8677. Табл. VII, фиг. 2а, б
Pseudozonophyllum primitivum.
№ 18а—в/8677. Табл. VIII, фиг. 4а—в
Pseudozonophyllum elegans.
№ 23а, б/8677. Табл. X, фиг. 2а, б
Pseudozonophyllum imulum.
№ 24а—г/8677. Табл. X, фиг. 3а—б; табл. XI, фиг. 1
Pseudozonophyllum eohalli.
№ 25а—в/8677. Табл. XI, фиг. 2а—в; табл. XII, фиг. 1а
Tabularia magnifica.
№ 27а—в/8677. Табл. XIII, фиг. 1а, б
Aulacophyllum priscum.
№ 28а, б/8677. Табл. XIII, фиг. 2а, б
Stenophyllum taimyricum.
№ 29а, б/8677. Табл. XIII, фиг. 3; табл. XIV, фиг. 1

243. КРАВЦОВ А. Г. (колл. № 8941). Раннедевонские четырехлучевые кораллы Южного острова Новой Земли (горизонт губы Марковой). Ученые зап. НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 10, 1965, с. 113—122, 2 пал. табл.

Описано 4 вида и 1 форма с родовым определением. Новых видов 3.

Голотипы:

Tryplasma alterna Kravtsov.
№ 1а, б/8941. Табл. I, фиг. 1
Nardophyllum clarum Kr.
№ 4а, б/8941. Табл. II, фиг. 2
Spongophyllum separatum.
№ 5а—в/8941. Табл. II, фиг. 3

244. КРАВЦОВ А. Г. (колл. № 8941). Раннедевонские и эйфельские четырехлучевые кораллы южного острова Новой Земли (вальневский горизонт). Ученые зап. НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 16, 1966, с. 22—63.

Описано 23 вида, из них 22 новых и 1 форма с родовым определением. В коллекции 21 новый вид.

Голотипы:

Phaulactis deciduus Kravtsov.
№ 7а—в/8941. Табл. I, фиг. 2
Fasciphyllum carinoferum Kr.
№ 8а, б/8941. Табл. II, фиг. 1
Fasciphyllum oblongulum.
№ 10а, б/8941. Табл. II, фиг. 3
Billinsastraea novozemelica.
№ 11а, б/8941. Табл. III, фиг. 3
Zonophyllum longiseptatum.
№ 14а—г/8941. Табл. IV, фиг. 2
Zonophyllum dierectum.
№ 15а—г/8941. Табл. V, фиг. 1
Zonophyllum caecum.
№ 16а—д/8941. Табл. V, фиг. 2; табл. VI, фиг. 1
Diplochone sachaninensis.
№ 20а, б/8941. Табл. VII, фиг. 2
Digonophyllum reductum.
№ 21а—в/8941. Табл. VII, фиг. 3
Digonophyllum bifurcum.
№ 22а—г/8941. Табл. VII, фиг. 4; табл. VIII, фиг. 1
Pseudomicroplasma cylindrica.
№ 23а, б/8941. Табл. VIII, фиг. 2
Pseudomicroplasma polarica.
№ 24а—в/8941. Табл. IX, фиг. 2
Pseudomicroplasma bizonata.
№ 25а—в/8941. Табл. VIII, фиг. 3; табл. IX, фиг. 1
Cystiphylloides corneum.
№ 27а—г/8941. Табл. IX, фиг. 4
Cystiphylloides oblitterum.
№ 28а, б/8941. Табл. X, фиг. 1
Cystiphylloides originale.
№ 30а—в/8941. Табл. X, фиг. 3
Cystiphylloides bulvankerae.
№ 32а—в/8941. Табл. XI, фиг. 2
Aulacophyllum primum.
№ 33а, б/8941. Табл. XI, фиг. 3
Aulacophyllum tabulatum.
№ 34а, б/8941. Табл. XI, фиг. 4; табл. XII, фиг. 1
Grossophyllum improcerum.
№ 35а—в/8941. Табл. XII, фиг. 2

Camurophyllum camurum.
№ 36а—в/8941. Табл. XII, фиг. 4

245. КУЗЬМИН А. М. (колл. № 8806). Девонские цефалоподы (надотряд *Nautiloidea*) Южного острова Новой Земли. Ученые зап. НИИГА, вып. 9, 1965, с. 8—40, 7 пал. табл.

Описана коллекция головоногих моллюсков из девона Новой Земли, изучение которой позволило сделать выводы о приуроченности наутилоидей к определенным типам отложений. Всего видов 18, из них 8 новых.

Голотипы:

Plagiostomoceras calvicense Kuzmin.
№ 1/8806. Табл. I, фиг. 1
Cycloceras novosemelicum Kuzm.
№ 4/8806. Табл. I, фиг. 4
Alpenoceras cruglovi.
№ 7/8806. Табл. II, фиг. 2
Mixosiphonoceras boreale.
№ 13/8806. Табл. III, фиг. 1; табл. IV, фиг. 3
Tripleuroceras alferovi.
№ 15/8806. Табл. IV, фиг. 4
Nathoceras russanovi.
№ 18/8806. Табл. VI, фиг. 1
Homoadelphoceras valnevense.
№ 19/8806. Табл. VII, фиг. 3
Halloceras eifelense.
№ 22/8806. Табл. VII, фиг. 1

246. КУЗЬМИН А. М. (колл. № 8940). Среднедевонские наутилоидеи Южного острова Новой Земли. Ученые зап. НИИГА, вып. 12, 1966, с. 46—61, 5 пал. табл.

Изучение коллекции головоногих позволило выявить их филогенетические взаимоотношения, что помогает провести корреляцию и стратификацию отложений. Описано 7 видов, 5 из них новые.

Голотипы:

Archiacoceras rarum Kuzmin.
№ 2/8940. Табл. I, фиг. 2
Danaoceras crassum Kuzm.
№ 4/8940. Табл. II, фиг. 1; табл. III, фиг. 2
Rutoceras parvulum.
№ 8/8940. Табл. IV, фиг. 1
Hercoceras aculeatum.
№ 12/8940. Табл. V, фиг. 1
Halloceras torulosum.
№ 14/8940. Табл. V, фиг. 4

247. КУЗЬМИН А. М. (колл. № 9869). Первая находка конодонтов в нижнедевонских отложениях Центрального Таймыра. Ученые зап. НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 20, 1967, с. 52—57, 1 пал. табл.

Описано 2 новых вида конодонтов.

Голотипы:

Panderodus devonicus Kuzmin.
№ 1/9869 (9869/1). Табл. I, фиг. 1
Icriodus taimyricus Kuzm.
№ 6/9869 (9869/6). Табл. I, фиг. 2

248. КУЛИКОВА В. Ф. (колл. № 11574). Новый представитель рода *Tanaodon* (*Bivalvia*) девона Тургая. Ежег. ВПО, т. XXI, 1978, с. 41—47, 1 пал. табл.

Описан 1 новый вид двустворчатых моллюсков с замком характерным для ранее монотипичного рода.

Голотип:

Tanaodon litvini V. Kulikova.
№ 3/11574. Табл., фиг. 3

249. КУЛИКОВА В. Ф. (колл. № 11133). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 5, 1980, с. 20—21, 1 пал. табл.

Описан 1 новый вид двустворчатых моллюсков из девона гряды Чернышева.

Голотип:

Leptodesma (*Leiopteria*) *synjensis* Kulikova.
№ 1/11133. Табл. VII, фиг. 8

250. ЛЕПЕХИНА В. Г. (колл. № 9257). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 1, ч. 1, 1960, с. 7—9.

Описан 1 новый вид псилофитов из девона окрестностей Красноярска.

Голотип:

Psilodendrion sibiricum Lepjechina.
№ 1/9257 (743/9257). Табл. I, фиг. 1.

251. ЛЕПЕХИНА В. Г. (колл. № 8421). Новые находки древесин кордаитовых из верхнего палеозоя Казахстана. Палеонт. журн., № 4, 1963, с. 103—109, 1 пал., табл.

Описаны остатки кордаитовых растений из отложений девона и перми, принадлежащих двум новым видам.

Голотипы:

Taxopitys karayandensis Lepjechina
№ 1/8421. Табл. X, фиг. 1, 2
Callixylon kazakhstanum Lep.
№ 6/8421. Табл. X, фиг. 4—6.

252. ЛЕПЕХИНА В. Г. (колл. № 8256). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. II, ч. 1, 1968, с. 37—39.
Описан 1 новый вид.

Голотип:

Pietzschia timanica Lepjechina.
№ 1/8256. Табл. 14, фиг. 1—5

МАКСИМОВА З. А. (колл. № 9112). См. № 172.
МАКСИМОВА З. А. (колл. № 8597). См. № 173.

253. МАКСИМОВА З. А. (колл. № 10106). Девонские скутеллюиды Советской Арктики и некоторые вопросы филогении семейства *Scutelluidae*. Ежег. ВПО, т. XVIII, 1968, с. 148—165, 2 пал. табл.
Описано 5 видов трилобитов одного семейства, из них 1 в открытой номенклатуре, 1 форма с родовым определением, 1 новый подвид. Новый вид 1.

Голотипы:

Scutellum alutaceum arcticum Z. Maximova.
№ 2/10106. Табл. I, фиг. 4
Thysanopeltella tcherkessovae Z. Max.
№ 16/10106. Табл. I, фиг. 2

254. МАКСИМОВА З. А. (колл. № 10991). Первая находка девонских трилобитов в Монгольском Алтае и новые данные о линьке факопид. Биострат. сб. Вып. 5, Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 182, 1974, с. 164—170, 1 пал. табл.
Описано 2 новых вида и 1 форма с родовым определением.

Голотипы:

Radiolichas (?) *asiaticus* Z. Maximova.
№ 11/10991. Табл. I, фиг. 11
Paciphacops (*Viaphacops*) *mongolicus* Z. Max.
№ 4/10991. Табл. I, фиг. 4

255. МАКСИМОВА З. А. (колл. № 11091). Трилобиты. В сб.: «Ярусное расчленение нижнего девона Тихоокеанской области на территории СССР». ВСЕГЕИ, 1978, с. 118—122, 4 пал. табл.
Описано 2 новых рода, 1 новый подрод и 4 новых вида трилобитов.

Голотипы:

Reedops almaatensis Z. Maximova.
№ 1/11091. Табл. IX, фиг. 4
Odontochile (*Pacifina*) *kaplune* Z. Max.
№ 2/11091. Табл. IX, фиг. 2
Saryarkella radiata.
№ 3/11091. Табл. IX, фиг. 3

Crotalocephalus (*Crotalocephalina*) *pseudoexpansus*.
№ 4/11091. Табл. IX, фиг. 1

256. МАШКОВА Т. В. (колл. № 11512). Новые конодонты зоны Pesavis—Optima из нижнего девона Урала и Зеравшана. Палеонт. журн. АН СССР, № 2, 1978, с. 91—97, 1 пал. табл.
Описан 1 новый род с типовым видом.

Голотип:

Kimognathus alexeii Mashkova.
№ 2/11512. Рис. 2. Фиг. г—е

257. МИРОНОВА М. Г. (колл. № 11920). Новые раннедевонские платицератиды (гастроподы) Подолья. Палеонт. сборник, № 20, 1982, Львов, с. 58—66, 1 пал. табл.
Описано 10 видов, из них 5 новых.

Голотипы:

Platyceras (*Platyceras*) *mitkovense*.
№ 2/11920. Табл. 1, фиг. 2
Platyceras (*Platyceras*) *pararobustum*.
№ 4/11920. Табл. 1, фиг. 4
Platyceras (*Platyceras*) *nieczlawense*.
№ 5/11920. Табл. I, фиг. 11
Platyceras (*Platyceras*) *subnescium*.
№ 6/11920. Табл. I, фиг. 5
Platyceras (*Platyceras*) *tainaense*.
№ 8/11920. Табл. I, фиг. 7

258. МОДЗАЛЕВСКАЯ Е. А. (колл. № 11549). Брахиоподы. В сб.: «Ярусное расчленение нижнего девона Тихоокеанской области на территории СССР». ВСЕГЕИ, 1978, с. 79—117, 8 пал. табл.
В коллективной работе описаны брахиоподы Дальнего Востока и Забайкалья. Всего 24 вида, из них 12 новых (в коллекции 10), 3 в открытой номенклатуре и 3 формы с родовым определением.

Голотипы:

Discomyorthis musculosa asiagenes Modzalevskaja et Schischkina.
№ 1/11549. Табл. I, фиг. 4
Cymostrophia (?) *auriculata* Modz.
№ 15/11549. Табл. II, фиг. 2
Stropheodonta schilkaensis.
№ 16/11549. Табл. I, фиг. 15
Gladiostrophia verneuili orientalis.
№ 18/11549. Табл. IV, фиг. 5
Lissostrophia inermis amazarica.
№ 21/11549. Табл. I, фиг. 14
Tastaria pseudotasta.
№ 22/11549. Табл. III, фиг. 10

Eodevonatia extrema.
№ 30/11549. Табл. V, фиг. 20
Notoparmella amurensis.
№ 41/11549. Табл. VII, фиг. 9
Acrospirifer pseudomurchisoni.
№ 45/11549. Табл. VII, фиг. 18
Paraspirifer urkanensis.
№ 47/11549. Табл. VII, фиг. 21

МОДЗАЛЕВСКАЯ Т. Л. (колл. № 11964). См. № 185.

259. МОДЗАЛЕВСКАЯ Т. Л., ЧЕРКЕСОВА С. В. (колл. № 12714). Раннедевонские брахиоподы Новой Земли и их значение для корреляции с Канадской Арктикой. В сб.: «Стратиграфия и палеонтология палеозоя Советской Арктики». ПГО «Севморгеология», 1989, с. 77—96, 4 пал. табл.

Описано 19 видов, 2 подвида, 3 формы с родовым определением. Новый вид 1, 13 видов в открытой номенклатуре, 1 новый подвид.

Голотипы:

Clorinda garreti novosemelica Tcherkesova.
№ 27/12714. Табл. II, фиг. 8
Reticulariopsis savagei T. Modzalevskaya.
№ 34/12714. Табл. III, фиг. 8

260. МОДЗАЛЕВСКАЯ Т. Л. (колл. № 12799). Раннедевонские брахиоподы южного острова Новой Земли (район губы Тайная). В сб.: «Страт. и палеонт. палеозоя Арктики». НПО «Севморгеология», 1991, с. 104—124, 2 пал. табл.

Описано 8 видов, из них 6 новых, один из которых типовой для нового рода и 4 формы описаны с родовым определением.

Голотипы:

Karbous dedaleus T. Modzalevskaya.
№ 8/12799. Табл. I, фиг. 8
Protathyris cordatus T. Modz.
№ 13/12799. Табл. I, фиг. 11
Protathyris flexuosus.
№ 14/12799. Табл. I, фиг. 12
Protathyris binarius.
№ 15/12799. Табл. II, фиг. 2
Gacina ? bunata.
№ 21/12799. Табл. II, фиг. 5
Cuspidatella cuspidata.
№ 26/12799. Табл. II, фиг. 8

261. НЕХОРОШЕВА Л. В., ЧЕРКЕСОВА С. В. (колл. № 10043). Стратиграфия и мшанки нижнедевонских отложений реки Тареи (Центральный Таймыр). Сб. статей по палеонт. и биост. НИИГА, вып. 26, 1961, с. 10—34, 6 пал. табл.

Описано 9 новых видов и 2 новые формы мшанок.

Голотипы:

Fistulipora apiata L. Nekhorosheva.
№ 1/10043. Табл. I, фиг. 2; табл. VI, фиг. 4
Fistulipora angustannula L. Nekh.
№ 3/10043. Табл. I, фиг. 3
Fistulipora tarejaensis.
№ 4/10043. Табл. I, фиг. 1
Fistulipora tarejaensis carinata.
№ 5/10043. Табл. II, фиг. 2; табл. VI, фиг. 1
Fistulipora nordica.
№ 6/10043. Табл. II, фиг. 3
Fistulipora nordica microalveolaris.
№ 9/10043. Табл. II, фиг. 1; табл. III, фиг. 3
Fistuliramus cyclotrypaeformis.
№ 10/10043. Табл. III, фиг. 1, 2, 4
Semicoscinium praestriatum.
№ 11/10043. Табл. IV, фиг. 1—5
Ottoseetaxis devonicus.
№ 13/10043. Табл. V, фиг. 3
Rhombopora leptoclada.
№ 17/10043. Табл. V, фиг. 6

262. НЕХОРОШЕВА Л. В. (колл. № 10042). Мшанки из тарейского нижнедевонского разреза (Центральный Таймыр). Уч. зап. НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 24, 1968, с. 45 — 62, 9 пал. табл.

Описано 11 видов, из них 2 новых и 1 в открытой номенклатуре, 2 формы и 4 формы с родовым определением.

Голотипы:

Leptotrypa ordinaria L. Nekhorosheva.
№ 1, 1а—г/10042 (10042/1). Табл. IV, фиг. 1
Atactotoechus simplex L. Nekh.
№ 2, 2а—г/10042. (10042/2). Табл. V, фиг. 1—4

263. НЕХОРОШЕВА Л. В. (колл. № 11208). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 5, 1980, с. 46—47.

Описан 1 новый вид мшанок из девона Новой Земли.

Голотип:

Reteporina podgorniensis L. Nekhorosheva.
№ 1, 1а, б/11208. Табл. XIV, фиг. 1

264. НЕХОРОШЕВА Л. В. (колл. № 12355). Первые находки мшанок в среднедевонских отложениях Русской Гавани (Северный остров Новой Земли). В сб.: «Страт. и фауна палеозоя Новой Земли». ПГО «Севморгеология», Мингео СССР, 1985, с. 98—105, 2 пал. табл.

Описано 2 новых вида мшанок.

Голотипы:

Fistulipora multilamellataformis L. Nekhorosheva.
№ 1а—г/12355. Табл. I, фиг. 1
Saffordotaxis gracilis L. Nekhor.
№ 2а—в/12355. Табл. I, рис. 2

265. НЕХОРОШЕВА Л. В. (колл. № 12803). Девонские мшанки отрядов *Cystoporata* и *Trepostomata* юга Новой Земли. В сб.: «Страт. и палеонт. палеозоя Арктики». НПО «Севморгеология», 1991, с. 44—58.

Описано 11 видов, из них 3 новых и 4 в открытой номенклатуре.

Голотипы:

Fistulipora grandibullata L. Nekhorosheva.
№ 1а—в/12803. Табл. I, фиг. 2
Cyclotrypa laminataformis L. Nekhor.
№ 5а—в/12803. Табл. II, фиг. 1
Leptotrypa sakhaninensis.
№ 7а, б/12803. Табл. III, фиг. 1

266. НИКИФОРОВА О. И. (колл. № 11115). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 5, 1980, с. 52—53.

Описан 1 новый вид брахиопод из девона Средней Азии.

Голотип:

Dolerorthis ? *alaica* Nikiforova.
№ 2/11115. Табл. XVI, фиг. 5

НИКИФОРОВА О. И., МОДЗАЛЕВСКАЯ Т. Л. (колл. № 11475). См. № 194.

267. ОБРУЧЕВ Д. В. (колл. № 1661). *Angarichthys*, новый род *Arthrodira* из девона р. Бахты. Изв. Геол. ком., т. XLV, № 6, 1926, с. 679—691, 1 пал. табл.

Описаны разрозненные остатки костных щитов панциря, челюстей и бокового шипа панцирных рыб нового рода и вида, находки которых позволяют уточнить возраст рыбоносных слоев.

Голотип:

Angarichthys hyperboreus Obrutschew.
№ 1/1661. Табл. XVIII, фиг. 1

268. ПЕТРОСЯН Н. А. (колл. № 8243). Новые данные к палеоботанической характеристике турбинской свиты Минусинской котловины. ВСЕГЕИ, Инф. сборник № 10, Стратиграфия и палеонтология, 1959, с. 93 — 102, 1 пал. табл.

Описано 2 новых вида растительных остатков из отложений среднего девона Минусинской котловины.

Голотипы:

Moresnetia krischtofovichii Radczenko.
№ 1/8243. Табл. I, фиг. 1
Moresnetia sibirica Petrosjan.
№ 4/8243. Табл. I, фиг. 6

269. ПЕТРОСЯН Н. М., РАДЧЕНКО Г. П. (колл. № 8244). О франской флоре Западной Сибири. ВСЕГЕИ, Инф. сборник № 24, Стратиграфия и палеонтология, 1960, с. 99—113, 1 пал. табл.

Новые находки остатков растений в франских отложениях различных районов Западной Сибири позволили авторам уточнить список характерных видов. Описан 1 новый род и 2 новых вида.

Голотипы и синтипы:

Condomaephyton gracile Radczenko et Petrosjan.
№ 1/8244. Табл. I, фиг. 4
№ 4/8244. Табл. I, фиг. 7
Niayssia altaica Radcz. et Petr.
№ 5/8244. Табл. I, фиг. 1

270. ПЕТРОСЯН Н. М., РАДЧЕНКО Г. П. (колл. № 9258). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Часть 1, 1960, с. 9—14, 43—45.

Описано 4 новых вида девонских растений.

Голотипы:

Uralia sibirica Petrosjan.
№ 1/9258 (83/9258). Табл. 2, фиг. 1
Uralia minussinskiensis Petr.
№ 5/9258 (533/9258). Табл. 2, фиг. 7
Uralia camdjalensis.
№ 10/9258 (62/9258). Табл. 1, фиг. 5
Svalbardia osmanica Petrosjan et Radczenko.
№ 14/9258 (150/9258). Табл. 9, фиг. 4

271. ПЕТРОСЯН Н. М., РАДЧЕНКО Г. П. (колл. № 9258). В сб.: В. Г. Лепехина, Н. М. Петросян, Г. П. Радченко. Важнейшие девонские растения Алтае-Саянской горной области. Мат. к фитостратиграфии девонских отложений Алтае-Саянской горной области. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 70, 1962, 142 с., 24 пал. табл.

Описано 47 видов растений и 6 форм. Новых видов 7.

Голотипы и синтипы:

Taeniocrada orientalis Radczenko.
№ 109/9258 (189/9258). Табл. II, фиг. 5

Dichophyton typicum Petrosjan et Kovbasina.
№ 149/9258 (546/9258). Табл. IX, фиг. 5
Barinophyton sibiricum Petrosjan.
№ 213/9258 (597/9258). Табл. XIX, фиг. 1
№ 214/9258 (594/9258). Табл. XIX, фиг. 2
№ 215/9258 (599/9258). Табл. XIX, фиг. 3
№ 216/9258 (598/9258). Табл. XIX, фиг. 4
Condrusia brevis.
№ 231/9258 (14/9258). Табл. XXIV, фиг. 8
Aphyllopteris tenuis.
№ 235/9258 (120/9258). Табл. XXIV, фиг. 6
Aphyllopteris robusta Radczenko.
№ 238/9258 (170/9258). Табл. XXIV, фиг. 2

272. ПЛАМЕНСКАЯ А. Г. (колл. № 12764). Мшанки нижнего и среднего девона Казахстана. В сб.: «Биостратиграфия нижнего и среднего девона Джунгаро-Балхашской провинции». СО АН СССР, 1991, с. 91—111, 4 пал. табл.

Описано 15 видов мшанок, из них 14 новых, 3 из которых типовые для описанных новых родов.

Голотипы:

Fenestella longitorosa Plamenskaja.
№ 2/12764. Табл. XIX, фиг. 2
Fenestella balaensis Plam.
№ 1/12764. Табл. XIX, фиг. 1
Ptilopora rara.
№ 3/12764. Табл. XIX, фиг. 3
Hemitrypa minima.
№ 5/12764. Табл. XIX, фиг. 5
Praesemicoscinium spicatum.
№ 8/12764. Табл. XX, фиг. 1
Praesemicoscinium parvulum.
№ 7/12764. Табл. XIX, фиг. 7
Eosemicoscinium laticarinatum.
№ 12/12764. Табл. XX, фиг. 4
Eosemicoscinium tatjanae.
№ 13/12764. Табл. XX, фиг. 5
Eosemicoscinium burultobense.
№ 14/12764. Табл. XX, фиг. 6, 7
Medisemicoscinium perelegantum.
№ 16/12764. Табл. XXI, фиг. 3
Semicoscoscinium ? portentosum.
№ 19/12764. Табл. XXI, фиг. 4
Quadrisemicoscinium fungiforme.
№ 17/12764. Табл. XXII, фиг. 4
Unitrypa balchashensis.
№ 20/12764. Табл. XXII, фиг. 1

Polypora bicarinata.
№ 24/12764. Табл. XXII, фиг. 5

273. ПОПОВ Л. Е. (колл. № 11829). Первая находка беззамковых брахиопод семейства *Acrotretidae* в нижнем девоне СССР. В сб.: «Палеонт. основа стратиграфических схем палеозоя и мезозоя островов Советской Арктики». НИИГА, 1981, с. 61—65, 1 пал. табл.

Описан 1 новый брахиопод.

Голотип:

Opsiconidion minor Popov.
№ 1/11829. Табл. I, фиг. 7

274. РЖОНСНИЦКАЯ М. А. (колл. № 6251). Ринхонеллиды верхнего девона Кузнецкого бассейна. Ежег. ВПО, т. XIV, 1953, с. 163—183, 2 пал. табл.

Описаны верхнедевонские представители одного семейства брахиопод, которые ранее были почти не известны в Кузнецком бассейне. Всего 7 видов, из них 2 новые, 1 вариетет и 4 формы в открытой номенклатуре.

Голотипы:

Liorhynchus depressus Ržonsnitzkaja.
№ 17/6251. Табл. X, фиг. 7
Isopoma isiliense Ržon.
№ 26/6251. Табл. X, фиг. 12.

275. РЯБИНИН В. Н. (колл. № 3848). О верхне-девонских строматопороидеях. Изв. Всес. геол.-разв. объединения, т. LI, вып. 76, 1932, с. 1125—1133, 2 пал. табл.

Описано 8 видов строматопороидей и 1 форма с родовым определением. Материал собран из Златоустовской области и Киргизской степи, отмечена частичная перекристаллизация скелетов организмов. Новых видов 6.

Синтипы:

Labechia devonica Riabinin.
№ 2, 2а/3848. Табл. I, фиг. 3
№ 3, 3а, в/3848. Табл. I, фиг. 4, 5
Labechia regularis Riab.
№ 13а/3848. Табл. I, фиг. 3
№ 4а/3848. Табл. I, фиг. 6
Labechia variabilis.
№ 5, 5а, в/3848. Табл. I, фиг. 7, 8
Rosenella miniarensis.
№ 9, 9а/3848. Табл. II, фиг. 5
№ 10а, в/3848. Табл. II, фиг. 6, 7
Rosenella normalis.
№ 11, 11а/3848. Табл. II, фиг. 8

Clathrodictyon variabile.
№ 12, 12а, в/3848. Табл. II, фиг. 9, 10

276. РЯБИНИН В. Н. (колл. № 3937). Девонские *Stromatoporoidea* Тимана. Изв. Всес. геол.-разв. объед., т. LI. Вып. 58, 1932, с. 855—870, 3 пал. табл.

Рассмотренный материал, несмотря на плохую сохранность колоний, позволил автору привести замечания об условиях жизни организмов, субстрата, симбиотических связях и конкурентной борьбе с мшанками, колониальными кораллами, водорослями. Описано 14 видов и 1 вариетет. Новых видов 6, в колл. 5

Синтипы:

Actinostroma timanicum Riabinin.
№ 3, 3а, в/3937. Табл. I, фиг. 5, 6
Clathrodictyon yavorskyi Riab.
№ 8, 8а, в/3937. Табл. II, фиг. 3, 4
Stromatopora sphaeroidalis.
№ 12, 12а, в/3937. Табл. III, фиг. 1, 2
Parallelopora volensis.
№ 14, 14а, в/3937. Табл. III, фиг. 3, 4
Parallelopora parva.
№ 15, 15а, в/3937. Табл. III, фиг. 7, 8

277. СЕНКЕВИЧ М. А. (колл. № 12736). Растения девона Казахстана. В сб.: «Биостратиграфия нижнего и среднего девона Джунгаро-Балхашской провинции». СО АН СССР, 1991, с. 209—249, 14 пал. табл.

Описано 3 новых рода и вида водорослей и 13 видов плауновидных растений, из них 7 видов новых, 2 из которых типовые для новых видов. Для 5 ранее описанных видов выделены голотипы.

Голотипы:

Orestovia lata Senkevitsch.
№ 3/12736. Табл. LI, фиг. 3
Krupchenkella katbasensis (Senk.).
№ 7/12736. Табл. LI, фиг. 7
Tamarella taeniata.
№ 10/12736. Табл. LII, фиг. 3
Maubasia notabilis.
№ 17/12736. Табл. LIV, фиг. 1
Tomiodendron zvontsovi.
№ 22/12736. Табл. LV, фиг. 1
Tomiodendron radczenkoi.
№ 29/12736. Табл. LVI, фиг. 3
Tomiodendron achmetbekense.
№ 28/12736. Табл. LVI, фиг. 1

Tomiodendron tschingizicum.
№ 32/12736. Табл. LVII, фиг. 2
Tomiodendron akchokensis.
№ 33/12736. Табл. LVII, фиг. 3
Tomiodendron mirabile.
№ 36/12736. Табл. LVIII, фиг. 2
Tentekiodendron elongatum.
№ 38/12736. Табл. LIX, фиг. 1
Balkhashiodendron kiselevi.
№ 53/12736. Табл. LXII, фиг. 1
Barrandeina karatauense.
№ 59/12736. Табл. LXIII, фиг. 1
Barsassia grandis.
№ 61/12736. Табл. LXIV, фиг. 1
Barsassia plana.
№ 64/12736. Табл. LXIV, фиг. 4

278. СИЗОВА Е. Н. (колл. № 11164). Позднефаменские криноидеи Центрального Казахстана. Ежег. ВПО, т. XXXI, 1988, с. 146—158, 1 пал. табл.
Описано новое семейство, 2 новых рода, 8 новых видов и 1 новый подвид.

Голотипы:

Dactylocrinus (?) *unicus* Sisova.
№ 1/11164. Табл. I, фиг. 1
Stenocrinus altus Sis.
№ 3/11164. Табл. I, фиг. 3
Cyclocion distinctus primus.
№ 4/11164. Табл. I, фиг. 4
Acbastaucrinus affectatus.
№ 5/11164. Табл. I, фиг. 5
Goniostathmus olentensis.
№ 6/11164. Табл. I, фиг. 6
Taranshicrinus tatus.
№ 8/11164. Табл. I, фиг. 8
Taranshicrinus volgaris.
№ 9/11164. Табл. I, фиг. 9
Konicrinus compositus.
№ 11/11164. Табл. I, фиг. 11
Pentagonocyclicus rarispinatus.
№ 10/11164. Табл. I, фиг. 10

279. СИЗОВА Е. Н. (колл. № 11572). Флориciклиды позднего девона Восточного Казахстана и Средней Азии. Ежег. ВПО, т. XXII, 1979, с. 166—171, 1 пал. табл.
Описан 1 новый род и два новых вида криноидей.

Голотипы:

Acbastaucrinus acbastauensis Sisova.
№ 1/11572. Табл., фиг. 1
Acbastaucrinus undosus.
№ 7/11572. Табл., фиг. 7

280. СИЗОВА Е. Н. (колл. № 11955). О некоторых флорициклидах девона и карбона Центрального и Южного Казахстана (криноидеи). Ежег. ВПО, т. XXVI, АН СССР, 1983, с. 263—274, 1 пал. табл.

Описано 8 новых видов и 1 новый род морских лилий.

Голотипы:

Acbastaucrinus quinguangularis Sisova.
№ 1/11955. Табл. I, фиг. 1
Acbastaucrinus (?) *martynovae.*
№ 3/11955. Табл. I, фиг. 3
Floricyclus kazangapicus.
№ 4/11955. Табл. I, фиг. 4
Floricyclus koytasensis.
№ 6/11955 (7/11955). Табл. I, фиг. 6
Floricyclus parvicostatus.
№ 8/11955. Табл. I, фиг. 8
Floricyclus candidus.
№ 10/11955. Табл. I, фиг. 10
Floricyclus insolitus.
№ 12/11955. Табл. I, фиг. 12
Plummerantericrinus paratus.
№ 14/11955. Табл. I, фиг. 14

281. СМИРНОВА М. А. (колл. № 8773). Табуляты нижнего и среднего девона Центрального Таймыра. Ученые зап. НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 7, 1965, с. 40—66, 5 пал. табл.

Анализ изученных табулят позволил автору расчленить девонские отложения Таймыра и сделать отдельные палеогеографические построения. Описано 10 видов, из них 8 новых.

Голотипы:

Favosites breviseptatus Smirnova.
№ 2/8773. Табл. I, фиг. 2
Squameofavosites orbicularis Smirn.
№ 3/8773. Табл. II, фиг. 1
Squameofavosites abnormis.
№ 4/8773. Табл. II, фиг. 2
Squameofavosites proprius.
№ 5/8773. Табл. V, фиг. 3
Squameofavosites attenuatus.
№ 6/8773. Табл. III, фиг. 3
Squameofavosites nodulosus.
№ 11/8773. Табл. IV, фиг. 2

Parastriatopora tcherkesovae.
№ 12/8773. Табл. V, фиг. 2
Alveolitella tarejaensis.
№ 14/8773. Табл. I, фиг. 3

282. СМИРНОВА М. А. (колл. № 8935). Новые виды табулят из горизонта Губы Моржовой нижнего девона (юго-западная часть Новой Земли). Ученые зап. НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 10, 1965, с. 93—112, 8 пал. табл.

Описано 8 новых видов табулят, 1 новый подвид и 1 новая форма.

Голотипы:

Favosites venustus Smirnova.
№ 1/8935. Табл. I, фиг. 1
Squameofavosites cribratus Smirn.
№ 7/8935. Табл. II, фиг. 1
Squameofavosites dubatolovi decrescus.
№ 15/8935. Табл. IV, фиг. 1
Dictyofavosites terrae-novae.
№ 22/8935. Табл. VI, фиг. 2
Syringolites (?) *favositoides.*
№ 25/8935. Табл. V, фиг. 1
Thamnopora rigens.
№ 26/8935. Табл. VI, фиг. 1
Thamnopora arctata.
№ 28/8935. Табл. VII, фиг. 1
Thamnopora singularis.
№ 36/8935. Табл. VIII, фиг. 1
Alveolitella ramifera.
№ 44/8935. Табл. V, фиг. 2

283. СМИРНОВА М. А. (колл. № 9567). Раннедевонские табуляты тарейского опорного разреза. Уч. зап. НИИГА, палеонт. и биострат. Вып. 22, 1968, с. 56—88, 22 пал. табл.

Описано 13 видов табулят и 1 подвид. Новых видов 11 и 1 новый подвид.

Голотипы:

Favosites barrandei disciformis Smirnova.
№ 7, 7а, б/9567 (770—3б/1/9567). Табл. VIII, фиг. 2
Squameofavosites nexus Smirn.
№ 9, 9а, б/9567 (775—51а/9567). Табл. IV, фиг. 2
Squameofavosites introrsus.
№ 13, 13а, б/9567 (770—9z/4/9567). Табл. X, фиг. 2

Squameofavosites fluvialis.
№ 15, 15а, б/9567 (770—23а/6/9567). Табл. XII, фиг. 2
Squameofavosites mixtissimus.
№ 16, 16а, б/9567 (770—41/9/9567). Табл. XX, фиг. 2
Squameofavosites rupestris.
№ 18, 18а, 6/9567 (770—41/7/9567). Табл. XX, фиг. 1
Emmonsia antica.
№ 19, 19а, б/9567 (775—68б/2/9567). Табл. XIII, фиг. 2
Emmonsia taimyrica.
№ 22, 22а, б/9567 (770—23а/1/9567). Табл. XIV, фиг. 1
Striatopora uriumskiana.
№ 24, 24а—г/9567 (775—10б/9567). Табл. III, фиг. 3—6
Striatopora magna.
№ 25, 25а—в/9567 (775—56в/9567). Табл. VII, фиг. 2
Stratiopora zlobini.
№ 30, 30а—д/9567 (770—30г/9567). Табл. XVIII, фиг. 2
Alveolites taimyrensis.
№ 31, 31а—г/9567(770-XV-IV/2/9567). Табл. XV, фиг. 1.

284. СМИРНОВА М. А. (колл. № 9718). В раб.: С. В. Черкесова, М. А. Смирнова, А. Г. Кравцова. Нижний девон юго-запада Новой Земли и описание некоторых табулят. В сб.: «Стратиграфия, условия осадконакопления и фауна ордовикских и нижнедевонских отложений Новой Земли, Вайгача и Пай-Хоя». Тр. НИИГА, т. 157, 1968 с. 145—164, 4 пал. табл.

Изученная коллекция табулят позволяет обосновать выделение вальневского горизонта Губы Моржовой. Описано 6 новых видов, один из них относится к новому роду. В колл. 5 новых видов.

Голотипы:

Favosites sachaninensis Smirnova.
№ 1/9718. Табл. I, фиг. 2
Lamellaeoporella superba Smirn.
№ 4/9718. Табл. II, фиг. 1
Gracilopora ptima.
№ 5/9718. Табл. II, фиг. 2
Yacutiopora minutissima.
№ 6/9718. Табл. III, фиг. 1

Coenites inventus.
№ 9/9718. Табл. IV, фиг. 2

285. СПАССКИЙ Н. Я. (колл. № 8774). Девонские четырехлучевые кораллы верховьев Амура и Восточного Забайкалья. Зап. ЛГИ, т. XXXVII, вып. 2, 1960, 99—107, 6 пал. табл.

Описано 5 видов ругоз, 4 формы с родовым определением, новых вида — 2. Работа является частью большой монографии.

Голотипы:

Lindstromia minima Spassky.
№ 4а, б/8774. Табл. I, фиг. 3
Gazimuria ildicanica.
№ 21а, б/8774. Табл. II, фиг. 4

286. СПАССКИЙ Н. Я. (колл. № 9158). Девонские четырехлучевые кораллы Южного Алтая и прилегающих территорий. Зап. ЛГИ, т. XXXVII, вып. 2, 1960, с. 108—131, 10 пал. табл.

Приведены краткие данные по стратиграфии девона и выводы, сделанные на основании детального изучения ругоз. Описано 13 видов и 1 вариетет. Новых видов 7.

Голотипы:

Tabulophyllum uimense Spassky.
№ 3а, б/9158. Табл. I, фиг. 3
Zmeinogorskia sagsayica.
№ 6а—в/9758. Табл. III, фиг. 1
Zmeinogorskia zaisanica.
№ 7а—г/9158. Табл. IV, фиг. 1
Tryplasma devoniana var. *gigantea.*
№ 9а, б/9158. Табл. V, фиг. 1
Rhizophyllum mongolicum.
№ 10а—в/9158. Табл. VI, фиг. 1
Pachyphyllum ibergenseformis.
№ 11а, б/9158. Табл. V, фиг. 2
Heliophyllum varioseptatum.
№ 13а, б/9158. Табл. VII, фиг. 2

287. СПАССКИЙ Н. Я. (колл. № 9349). Раннедевонские и эйфельские четырехлучевые кораллы Джунгарского Алатау. Зап. ЛГИ, т. XLIX, вып. 2, 1965, с. 18—30, 5 пал. табл.

Описано 2 новых рода и 5 новых видов ругоз, изучение которых позволило сделать автору выводы по палеогеографии и корреляции отложений.

Голотипы:

Multicarinophyllum multicarinatum Spassky.
№ 5а—б/9349. Табл. I, фиг. 1, 2
Neokyphophyllum calcareum.
№ 10а, б/9349. Табл. II, фиг. 1, 2

Bethanyphyllum maximum.
№ 22а, б/9349. Табл. III, фиг. 1, 2
Strimgophyllum admirabile.
№ 26а, б/9349. Табл. IV, фиг. 1, 2
Spongophyllum gemmatum.
№ 25а, б/9349. Табл. V, фиг. 1—3

288. СПАССКИЙ Я. Н. (колл. № 12124). Новый среднедевонский трилобит Салаира. Ежег. ВПО, т. XXVIII, 1985, с. 275—280, 1 пал. табл.
Описан 1 новый вид трилобитов.

Голотип:

Phacops (Phacops) malosalairicus I. Spassky.
№ 1/12124. Табл. I, фиг. 1

289. СПАССКИЙ Я. Н. (колл. № 12535). Трилобиты пропащинской свиты (Лохковский ярус) юга Новой Земли. Ежег. ВПО, т. XXXII, 1989, с. 182—195, 3 пал. табл.
Описано 2 новых рода и 7 новых видов трилобитов.

Голотипы:

Tcherkesovia prima I. Spassky.
№ 1/12535. Табл. I, фиг. 1
Taynaella insolita.
№ 10/12535. Табл. II, фиг. 1
Tropidocare borealis.
№ 14/12535. Табл. I, фиг. 8
Prantlia polita.
№ 17/12535. Табл. III, фиг. 1
Warburgella yolkini.
№ 24/12535. Табл. III, фиг. 8
Warburgella angusta.
№ 31/12535. Табл. II, фиг. 7
Warburgella dispersa
№ 36/12535. Табл. II, фиг. 13

290. СТАРОВЕРОВ В. Н. (колл. № 8428). О некоторых нижнедевонских фавозитидах бассейна р. Колыма. Мат. по геол. и пол. ископ. Северо-Востока СССР, № 19, 1966, с. 11—22, 4 пал. табл.
Описана коллекция табулят двух родов. Всего 7 видов, из них 2 новые.

Голотипы:

Squameofavosites ignotus Staroverov.
№ 6/8428. Табл. IV, фиг. 1—4, рис. 3
Squameofavosites pressus.
№ 7/8428. Табл. IV, фиг. 5—8

291. СТУКАЛИНА Г. А. (колл. № 8724). Новые виды *Hexacrinites(?)* Центрального Казахстана. Ежег. ВПО, т. XVII, 1965, с. 188—193, 1 пал. табл.

Описано 3 новых вида криноидей, принадлежащих одному из наиболее характерных девонских родов.

Голотипы:

Hexacrinites (?) *subbiconcavus* Stukalina.
№ 2/8724. Табл. I, фиг. 2
Hexacrinites (?) *inflatus.*
№ 5/8724. Табл. I, фиг. 7
Hexacrinites (?) *sverbilovi.*
№ 8/8724. Табл. I, фиг. 11

292. СТУКАЛИНА Г. А. (колл. № 12783). Ископаемые остатки *incertae sedis* из среднего девона Прибалхашья. В сб.: «Биостратиграфия нижнего и среднего девона Джунгаро-Балхашской провинции». Иванова Н. И., Сенкевич М. А., Стукалина Г. А. и др. СО АН СССР, 1991, с. 207—209

Описаны часто встречающиеся в девоне формы, напоминающие уплощенные «стебли» иглокожих, вызывающие ассоциации с растительными остатками. Выразительная морфология остатков, их характерность для эйфельских отложений вынудила автора выделить их в новый род и вид.

Голотип:

Arganatjiella indistinctus Stukalina et Senkevitsch.
№ 1/12783. Табл. L, фиг. 1

293. СТУКАЛИНА Г. А. (колл. № 12735). Морские лилии нижнего и среднего девона Казахстана. В сб.: «Биостратиграфия нижнего и среднего девона Джунгаро-Балхашской провинции». СО АН СССР, 1991, с. 147—207, 14 пал. табл.

Описано 63 вида криноидей, из них 3 вида новых.

Голотипы:

Cupressocrinites ? *chingizensis* Stukalina.
№ 17/12735. Табл. XXXIX, фиг. 1
Nuracrinus longilobatus Stuk.
№ 53/12735. Табл. XLIII, фиг. 10
Kuzbassocrinus senkevitschae.
№ 84/12735. Табл. XLVII, фиг. 7

294. ЧЕРКЕСОВА С. В. (колл. № 8667). О некоторых представителях семейства *Camarotoechiidae* в фаменских отложениях Новой Земли. Сборник статей по палеонт. и биострат. НИИГА, вып. 25, 1961, с. 44—51, 1 пал. табл.

Описано 2 вида и 1 подвид брахиопод, из них 1 вид и подвид новые.

Голотипы:

Junnanella erichsoni polaris Tcherkesova.
№ 1/8667. Табл. I, фиг. 4
Junnanellina karina Tcherkes.
№ 2/8667. Табл. I, фиг. 1

295. ЧЕРКЕСОВА С. В. (колл. № 8937). *Nordotoechia* — новый род раннедевонских ринхонеллид. Ученые зап. НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 10, 1965, с. 79—92, 1 пал. табл.
Описан 1 новый вид брахиопод из девона Новой Земли, принадлежащий новому роду.

Голотип:

Nordotoechia tumida Tcherkesova.
№ 1/8937. Табл. I, фиг. 1

296. ЧЕРКЕСОВА С. В. (колл. № 9522). Новый вид рода *Dmitria Sidiachenko* из фаменских отложений западного сектора Советской Арктики. Уч. зап. НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 13, 1966, с. 38—42.
Описан 1 новый вид брахиопод.

Голотип:

Dmitria subrotunda Tcherkesova.
№ 1/9522 (9522/1). Табл. I, фиг. 1

297. ЧЕРКЕСОВА С. В. (колл. № 9587). Новые роды семейства *Uncinulidae R*žonsnickaja (брахиоподы) из нижнедевонских отложений Новой Земли. Уч. зап. НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 18, 1967, с. 5—23, 1 пал. табл.
Описано 2 новых рода ринхонеллид, новый вид 1.

Голотип:

Pseudoglossinotoechia atalanta Tcherkesova.
№ 1/9587. Табл. I, фиг. 1

298. ЧЕРКЕСОВА С. В. (колл. № 11092). О морфологии спириферид. Палеонт. журн., № 3, 1976, с. 87—101, 1 пал. табл.
Описан 1 новый род и 5 видов брахиопод из девона Новой Земли. Новых видов 1.

Голотипы:

Ljudmilispirifer kabanijensis Tcherkesova.
№ 8/11092. Табл. VII, фиг. 14
Ljudmilispirifer voroninensis Tcherkes.
№ 13/11092. (18/11092). Табл. VII, фиг. 2
Ljudmilispirifer latihumerus.
№ 18/11092. Табл. VII, фиг. 20
Janius ? innatus.
№ 20/11092. Табл. VII, фиг. 17

299. ЧЕРКЕСОВА С. В. (колл. № 10965). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 5, 1980, с. 53, 57.

Описан 1 новый вид брахиопод из девона Новой Земли и 2 новых подвида.

Голотипы:

Cortezorthis valnevensis Tcherkesova.
№ 1/10965. Табл. XVI, фиг. 7
Radiomena parirregularis parirregularis Tcherkes.
№ 5/10965. Табл. XVII, фиг. 13
Radiomena parirregularis podgornensis.
№ 6/10965. Табл. XVII, фиг. 14

300. ЧЕРКЕСОВА С. В. (колл. № 11789). Новые девонские виды *Biconostrophia* Новой Земли. Ежег. ВПО, т. XXIII, 1980, с. 170—185, 3 пал. табл.

Описано 2 новых вида брахиопод и 1 форма с родовым определением.

Голотипы:

Biconostrophia sinelnikovaensis Tcherkesova.
№ 1/11789. Табл. I, фиг. 1
Biconostrophia kabaniensis Tcherkes.
№ 16/11789. Табл. II, фиг. 1

301. ЧЕРКЕСОВА С. В. (колл. № 12800). Брахиоподы из нижнедевонской сланцево-карбонатной толщи ручья Посудного на Новой Земле. В сб.: «Страт. и палеонт. палеозоя Арктики». НПО «Севморгеология», 1991, с. 64—90, 4 пал. табл.

Описано 16 видов, из них 8 в открытой номенклатуре, 1 новый подвид и 3 формы с родовым определением.

Голотип:

Sibirispira miranda posudnensis Tchrkesova.
№ 20/12800. Табл. III, фиг. 6

302. ЧЕРКЕСОВА С. В. (колл. № 12807). Новые раннедевонские спириферидыТаймыра. В сб.: «Страт. и палеонт. палеозоя Арктики». НПО «Севморгеология», 1991, с. 91—103, 2 пал. табл.

Описано 2 новых рода и 3 новых вида брахиопод.

Голотипы:

Tatjanaspirifer variabilis Tcherkesova.
№ 1/12807. Табл. II, фиг. 3
Tatjanaspirifer daksanensis Tcherkes.
№ 11/12807. Табл. I, фиг. 1
Mariaspirifer dolganensis.
№ 12/12807. Табл. I, фиг. 2

303. ЧЕХОВИЧ В. Д. (колл. № 9207). Новый род *Pseudoroemeria* из семейства *Syringolitidae (Tabulata).* Палеонт. журн. АН СССР, № 4, 1960, с. 43—47, 1 пал. табл.

Описаны 2 новых вида табулят из раннедевонских отложений, отнесенных к новому роду.

Голотипы:

Pseudoroemeria atbashiensis Chekhovich.
№ 82/9207. Табл. III, фиг. 1

Pseudoroemeria shiriktensis Chekh.
№ 83/9207. Табл. III, фиг. 2

ЧЕХОВИЧ В. Д. (колл. № 9207). См. № 212.

ЧЕХОВИЧ В. Д. (колл. № 9600). См. № 214.

304. ШЕЙНМАНН Ю. М. (колл. № 2361). *Trepostomata* из среднего девона Минусинского уезда Енисейской губ. Изв. Геол. Ком., т. XLIV, № 10, 1925, с. 917—934, 2 пал. табл.

Детально изучена коллекция мшанок, собранная разными геологами с 1908 по 1924 годы из отложений $Д_2$. Всего описано 13 видов 1 вариетет; новых видов 11 и 1 новый вариетет.

Голотипы и синтипы:

Heterotrypa yakovlevi Schoenmann.
№ 1а/2361. Табл. XXVI, рис. 1, 2
№ 2в/2361. Табл. XXVI, рис. 3

Heterotrypa yakovlevi var. *palmipedalis.*
№ 3, 3а, б/2361. Табл. XXV, рис. 7; табл. XXVI, рис. 4

Dekayia edelsteini.
№ 4, 4а, б/2361. Табл. XXV, рис. 11, 13; табл. XXV, рис. 14; табл. XXVI, рис. 14

Leptotrypa tubuliformis.
№ 5, 5а—в/2361. Табл. XXV, рис. 1, 2, 3; табл. XXVI, рис. 22

Batostomella (?) *irregularis.*
№ 6, 6а, б/2361. Табл. XXV, рис. 6; табл. XXVI, рис. 16

Batostomella parva.
№ 7, 7а, б/2361. Табл. XXV, рис. 5; табл. XXVI, рис. 15

Lioclema abacanensis.
№ 10, 10а, б/2361. Табл. XXVI, рис. 5, 6

Eridotrypa vasilievskiji.
№ 11, 11а, б/2361. Табл. XXV, рис. 4; табл. XXVI, рис. 21

Trematella (?) *macrospina.*
№ 12, 12а—д/2361. Табл. XXV, рис. 15—17; табл. XXVI, рис. 19, 20

Amplexopora (?) *minusinensis.*
№ 13, 13а—д/2361. Табл. XXV, рис. 10; табл. XXVI, рис. 11—13
Trematopora schiriensis.
№ 14, 14а, б/2361. Табл. XXV, рис. 21, 22
Batostoma sibirica.
№ 15а/2361. Табл. XXV, рис. 19, 20

305. ЭКТОВА Л. А. (колл. № 8283). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. II, ч. I, 1968, с. 97—99, 1 пал. табл.
Описано 2 новых вида фораминифер.

Голотипы:

Parathurammina kokschaalica Ektova.
№ 4а/8283 (3б/8283). Табл. 34, фиг. 1
Bithurammina sphaerica.
№ 1а/8283. Табл. 34, фиг. 2

306. ЮДИНА Ю. А., РЖОНСНИЦКАЯ М. А. (колл. № 12247). Брахиоподы афонинского горизонта среднего девона Западного склона Урала. В сб.: «Средний девон СССР, его границы и ярусное расчленение». АН СССР, 1985, с. 74—83.
Описан 1 новый род и 7 видов, из них 6 новых, кроме того, 2 новых подвида.

Голотипы:

Devonaria zenschneri archensis Yudina et Ržonsnickaja.
№ 2/12247. Табл. II, фиг. 2
Chonetipustula bejdensis.
№ 4/12247. Табл. I, фиг. 1
Leiorhynchus grandis.
№ 7/12247. Табл. II, фиг. 4
Desquamatia borysi.
№ 9/12247. Табл. I, фиг. 5
Spinatrypa alexandrina.
№ 15/12247 (14/12247). Табл. II, фиг. 5
Warrenella maureri uralica.
№ 21/12247 (16/12247). Табл. II, фиг. 6
Warrenella maureri brevisulcata.
№ 24/12247 (18/12247). Табл. II, фиг. 7
Rhynchospirifer markovskii.
№ 16/12247 (19/12247). Табл. I, фиг. 11
Cyrtinoides ajica.
№ 25/12247 (20/12247). Табл. II, фиг. 10

307. ЯВОРСКИЙ В. И. (колл. № 2877). *Actinostromidae* из девонских отложений окраин Кузнецкого бассейна и Урала. Изв.

Гл. геол.-разв. упр., т. XLIX, № 4, 1930, с. 473—496, 3 пал. табл.

В работе описано 11 видов строматопороидей, из них 4 новых вида. В колл. 9 видов и 2 вида новые.

Голотипы:

Actinostroma salairicum Yavorsky.
№ 6, 6а—в/2877. Табл. II, фиг. 1—3
Clathrodictyon tschusovensis Yavor.
№ 12а/2877. Табл. III, фиг. 3

308. ЯВОРСКИЙ В. И. (колл. № 3338). Некоторые девонские *Stromatoporoidea* из окраин Кузнецкого бассейна, Урала и других мест. Изв. Всес. геол.-разв. объед., вып. 94, 1931, 29 с., 5 пал. табл.

Приведены замечания о строении скелета строматопорат и описание 18 видов, из них 16 новых видов и 2 новых рода.

Голотипы и синтипы:

Actinostroma mamontovi Yavorsky.
№ 1, 1а—с/3338. Табл. I, фиг. 1, 3, 4
Gerronostroma elegans Yavor.
№ 3, 3а—d/3338. Табл. I, фиг. 12; табл. II, фиг. 3—6 *
Gerronostroma concentrica.
№ 5, 5а, в/3338. Табл. II, фиг. 7, 8 *
Gerronostroma batschatensis.
№ 6, 6а, в/3338. Табл. II, фиг. 9; табл. III, фиг. 1 *
Clathrocoilona abeona.
№ 7, 7а, в/3338. Табл. I, фиг. 9; табл. II, фиг. 1
№ 8, 8а, в/3338. Табл. I, фиг. 10, 11
Clathrodictyon praetenerum.
№ 10, 10а—с/3338. Табл. I, фиг. 5, 6 *
Clathrodictyon pseudostriatellum.
№ 11, 11а—в/3338. Табл. V, фиг. 7—10 *
Labechia mougodjyrica.
№ 12а, в/3338. Табл. I, фиг. 7, 8 *
Stromatoporella lontougnini.
№ 17, 17а, в/3338. Табл. III, фиг. 7, 8 *
Stromatoporella sniatkovi.
№ 16а, в/3338. Табл. III, фиг. 9 *
Stromatoporella pankratovi.
№ 18, 18а, в/3338. Табл. IV, фиг. 2, 3 *
Syringostroma tschichatschevi.
№ 19, 19а, в/3338. Табл. IV, фиг. 4, 5 *
Syringostroma geba.
№ 20, 20а, в/3338. Табл. IV, фиг. 6—9 *

Syringostroma strahlenbergi.
№ 21, 21а, в/3338. Табл. IV, фиг. 10, 11 *
Hermatostroma sibirica.
№ 22а, в/3338. Табл. V, фиг. 1, 2 *
Hermatostroma dolica.
№ 23, 23а, в/3338. Табл. V, фиг. 3, 4 *

309. ЯВОРСКИЙ В. И. (колл. № 6337). Девонские *Stromatoporella* и их значение для стратиграфии. Вопр. палеонтологии, т. I, 1950, с. 243—263, 7 пал. табл.

Изучена коллекция представителей одного рода строматопорат из девонских отложений Кузнецкого бассейна. Описано 19 видов и 1 вариетет, из них 17 видов и вариетет новые.

Голотипы:

Stromatoporella convicta Yavorsky.
№ 2, 2а, б/6337. Табл. I, фиг. 3—5
Stromatoporella tchernyshevi Yavor.
№ 3, 3а, б/6337. Табл. I, фиг. 6, 8
Stromatoporella boutovi.
№ 5, 5а, б/6337. Табл. II, фиг. 1, 2; табл. VII, фиг. 9
Stromatoporella tyrganensis.
№ 6, 6а, б/6337. Табл. II, фиг. 3, 4
Stromatoporella batschatensis.
№ 7, 7а, б/6337. Табл. II, фиг. 5, 6
Stromatoporella voltschensis.
№ 10, 10а—в/6337. Табл. III, фиг. 3—5
Stromatoporella kuznetskensis.
№ 11а, б/6337. Табл. III, фиг. 6, 7
Stromatoporella tschernyshevi var. *kostenkovensis.*
№ 12а, б/6337. Табл. III, фиг. 8; табл. IV, фиг. 1
Stromatoporella regularis.
№ 13, 13а/6337. Табл. IV, фиг. 2, 3
Stromatoporella chomutinkensis.
№ 14а, б/6337. Табл. IV, фиг. 4, 5
Stromatoporella insolita.
№ 15а—в/6337. Табл. IV, фиг. 6; табл. V, фиг. 1, 2
Stromatoporella gapeevi.
№ 16а, б/6337. Табл. IV, фиг. 7; табл. V, фиг. 3, 4
Stromatoporella abensis.
№ 17, 17а, б/6337. Табл. V, фиг. 5—8
Stromatoporella undata.
№ 18, 18а, б/6337. Табл. V, фиг. 9, 10
Stromatoporella devonica.
№ 20, 20а, б/6337. Табл. VI, фиг. 3, 4

Stromatoporella mamelonsa.
№ 22а, б/6337. Табл. VII, фиг. 1—3
Stromatoporella basilii.
№ 23а, б/6337. Табл. VII, фиг. 4, 5
Stromatoporella ussowi.
№ 24а, б/6337. Табл. VII, фиг. 6—8

310. ЯВОРСКИЙ В. И. (колл. № 10528). Некоторые строматопороидеи Средней Азии. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 182, вып. 5, 1974, с. 246—249, 1 пал. табл.
Сохранность описанного материала не позволила автору установить форму ценостеума. Видов 4, новых 2.

Голотипы:

Gerronostroma sukhumense Yavorsky.
№ 2, 2а/10528. Табл. I, фиг. 3, 4
Cystostroma asiaticum Yavor.
№ 4, 4а, б/10528. Табл. I, фиг. 7, 8

311. ЯКОВЛЕВ Н. Н. (колл. № 8113). Морские лилии Воронежского девона. Изв. АН СССР, сер. биологическая, № 2, 1956, с. 91—93, 1 пал. табл.
Описано 3 новых вида морских лилий разных родов.

Голотипы и синтипы:

Lasiocrinus (?) *kon-kolodesae* Yakovlev.
№ 1/8113. Табл. I, рис. 3
Pycnosaccus semilukensis Yak.
№ 2/8113. Табл. I, рис. 4
№ 3/8113. Табл. I, рис. 5
Wachsmuthicrinus dubjanskii.
№ 5/8113. Табл. I, рис. 2
№ 6/8113. Табл. I, рис. 1

КАРБОН

312. ВАСИЛЬЕВА Г. И. (колл. № 12519). Морфология и систематика Восточноуральских нижнекарбоновых кардиоптерид. Палеонт. журн., № 2, 1988, с. 97—108.
Описаны остатки голосеменных растений 3-х новых видов.

Голотипы:

Cardiopteridium costatum G. Vassilieva.
№ 1/12519. Рис. 1д, г
Cardiopteridium verbitskayae.
№ 7/12519. Рис. 2г
Neuropteris ellipticus.
№ 16/6421 (19/6421). Рис. 4

313. ВЕРБИЦКАЯ Н. Г. (колл. № 9260). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Часть I, 1960, с. 122—125.
Описано 2 новых вида растительных остатков.

Голотипы:

Angarocarpus muraensis Verbitskaja.
№ 1/9260 (243/233—9260). Табл. 24, фиг. 8
Samaropsis anomala Verb.
№ 3/9260 (63/168—9260). Табл. 24, фиг. 14

314. ВЕРБИЦКАЯ Н. Г., РАДЧЕНКО Г. П. (колл. №№ 8259, 8269). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. II, ч. I, 1968, с. 26—36.
Описано 6 видов хвощевых растений из каменноугольных отложений ряда районов Сибири и Дальнего Востока.

Голотипы:

Paracalamites primaevus Radczenko.
№ 23/8259. Табл. 10, фиг. 1, 2
Paracalamites vicinalis Radcz.
№ 25/8259. Табл. 10, фиг. 4
Paracalamites pseudovicinalis.
№ 29/8259. Табл. 11, фиг. 1
Paracalamites evenkensis.
№ 9/8269. Табл. 12, фиг. 3
Paracalamites planicostatus.
№ 18/8269. Табл. 13, фиг. 6

315. ВЛАДИМИРОВИЧ В. П. (колл. № 9432). Новый род позднепалеозойских и раннемезозойских водорослей Сибири. Палеонт. журн., № 3, 1982, с. 119—122, 2 пал. табл.
Описаны остатки слоевищеподобных образований, отнесенных к новому формальному роду, дано его сравнение с современными бурыми водорослями.

Голотипы:

Korsakia triassica Vladimirovich.
№ 19/9432. Табл. XI, фиг. 1
Korsakia chunica Vlad.
№ 23/9432. Табл. XI, фиг. 5

316. ГАЛИЦКАЯ А. Я. (колл. № 12469). Ранне- и среднекаменноугольные продукты Северной Киргизии. АН Кирг.ССР, 1977, 168 с., 64 пал. табл.
Изученный палеонтологический материал явился обоснованием для расчленения и корреляции отложений, а также основой современной зональной схемы карбона Северной Киргизии. Описано 99 видов, из них 23 новых, 1 голотип выделен для вида Гладченко А. Я., новых родов 2, 3 формы с родовым определением.

Голотипы:

Chonetes karakiensis Galitzkaja.
№ 1/12464 (9/2). Табл. I, фиг. 9
Chonetes baschkiricus Gal.
№ 3/12464 (20/2). Табл. I, фиг. 19
Megachonetes kaindensis.
№ 21/12464 (12/2). Табл. I, фиг. 11
Acanthoplecta kirgisica.
№ 38/12464 (12/3). Табл. 4, фиг. 12
Acanthoplecta zangensis.
№ 39/12464 (10/3). Табл. 4, фиг. 10
Acanthoplecta akkudukensis.
№ 41/12464 (13/3). Табл. 4, фиг. 13
Avonia tekesensis.
№ 68/12464 (50/3). Табл. 7, фиг. 14
Kadraliproductus asiaticus.
№ 114/12464 (183/3). Табл. 20, фиг. 5
Productus tiekensis.
№ 164/12464 (128/3). Табл. 14, фиг. 11
Productus asiaticus.
№ 170/12464 (139/3). Табл. 15, фиг. 4
Echinoconchus (Karavankina) sonculensis.
№ 186/12464 (160/3). Табл. 17, фиг. 1
Marginatia kaindensis.
№ 223/12464 (190/3). Табл. 21, фиг. 9
Marginatia uchbulakensis.
№ 233/12464 (214/3). Табл. 24, фиг. 11
Dictyoclostus smirnovi.
№ 300/12464 (256/3). Табл. 32, фиг. 2
Antiquatonia tianschanensis.
№ 320/12464 (309/3). Табл. 40, фиг. 5
Reticulatia tekesensis.
№ 343/12464 (329/3). Табл. 43, фиг. 2
Inflatia kirgisica.
№ 355/12464 (412/3). Табл. 56, фиг. 2
Levitusia praehumerosa.
№ 365/12464 (275/3). Табл. 37, фиг. 1в
Linoproductus praelineatus.
№ 390/12464 (365а/3). Табл. 47, фиг. 7
? *Balakhonia moldotooensis.*
№ 398/12464 (356/3). Табл. 46, фиг. 7
Gigantoproductus tujucsuensis Gladtchenko.
№ 436/12464 (432/3). Табл. 61, фиг. 1
Gigantoproductus tjulekensis Galitzkaja.
№ 459/12464 (423/3). Табл. 59, фиг 1
Gigantoproductus sonculensis.
№ 462/12464 (411/3). Табл. 56, фиг. 1

Buleutella kirgisika.
№ 463/12464 (439/3). Табл. 64, фиг. 1

317. ГОР Ю. Г. (колл. № 8712). Атлас позднепалеозойской флоры Норильского района. НИИГА, 1969, 110 с., 31 пал. табл.

Приведен стратиграфический очерк верхнепалеозойских отложений, сводный стратиграфический разрез, материалы тафономических наблюдений, которые помогли скоррелировать и детально расчленить угленосные отложения. Описано 107 видов, из них 1 в открытой номенклатуре и 4 формы. Новых видов 30.

Голотипы:

Sphenophyllum (?) *primitivum* Gor.
№ 3/8712. Табл. I, фиг. 4, рис. 4
Koretrophyllites chantaica.
№ 9/8712. Табл. I, фиг. 10, рис. 5
Koretrophyllites talnachensis.
№ 10/8712. Табл. I, фиг. 6
Koretrophyllites subuliformis.
№ 12/8712. Табл. I, фиг. 12
Koretrophyllites (?) *longifolia.*
№ 14/8712. Табл. V, фиг. 2
Annularia (?) *tajmyrica.*
№ 30/8712. Табл. VI, фиг. 7
Annularia (?) *radczenkoi.*
№ 32/8712. Табл. VI, фиг. 2
Paraschizoneura arctica.
№ 35/8712. Табл. III, фиг. 8
Cardioneura norilskiensis.
№ 48/8712. Табл. IX, фиг. 8
Angaridium (?) *talnachense.*
№ 69/8712. Табл. VIII, фиг. 12, рис. 18
Callipteris grandifolia.
№ 84/8712. Табл. XIII, фиг. 1
Callipteris (?) *turumakensis.*
№ 86/8712. Табл. XII, фиг. 1
Comia arctica.
№ 95/8712. Табл. XVII, фиг. 1
Zamiopteris schwedovii.
№ 106/8712. Табл. XX, фиг. 10
Pursongia rarinervis.
№ 112/8712. Табл. XV, фиг. 9
Andonophyllum radczenkoi.
№ 115/8712. Табл. XV, фиг. 6
Petcheria (?) *kajerkania.*
№ 118/8712. Табл. XV, фиг. 5
Noeggerathiopsis incognita.
№ 168/8712. Табл. XXVIII, фиг. 19

Noeggerathiopsis kojerkanensis.
№ 171/8712. Табл. XXIV, фиг. 8
Noeggerathiopsis arctica.
№ 174/8712. Табл. XXVI, фиг. 6
Noeggerathiopsis norilskiensis.
№ 179/8712. Табл. XXVI, фиг. 12
Noeggerathiopsis fokinii.
№ 181/8712. Табл. XXI, фиг. 10
Grassinervia minuta.
№ 184/8712. Табл. XXV, фиг. 12
Crassinervia schorochovii.
№ 185/8712. Табл. XXIV, фиг. 10
Ginkgophyllum tajmyrica.
№ 191/8712. Табл. XXX, фиг. 32
Yavorskyia chachlovii.
№ 192/8712. Табл. XXXI, фиг. 4
Yavorskyia divinii.
№ 198/8712. Табл. XXXI, фиг. 2
Nephropsis norilskiensis.
№ 204/8712. Табл. XXIX, фиг. 11
Nephropsis enisseii.
№ 205/8712. Табл. XXIX, фиг. 9
Samaropsis talnachovi.
№ 233/8712. Табл. XXX, фиг. 16

318. ГОР Ю. Г. (колл. № 9400). Стратиграфия и флора верхнепалеозойских угленосных отложений Норильского района. Тр. НИИГА, т. 147, 1965, 140 с., 10 пал. табл.

Описан 31 вид, из них 2 новых, 2 новые формы, 1 форма с родовым определением.

Синтипы:

Angaridium daldykanensis Gor.
№ 17/9400. Табл. IV, фиг. 1
№ 18/9400. Табл. IV, фиг. 2
Angaridium norilskiensis.
№ 20/9400. Табл. IV, фиг. 4
№ 21/9400. Табл. IV, фиг. 5
№ 22/9400. Табл. VI, фиг. 9

319. ДАВЫДОВ В. И. (колл. № 11831). Новые виды среднекаменноугольных палеорейхелин. Палеонт. журн., № 3, 1981, с. 120—124.

Описано 3 новых вида фораминифер.

Голотипы:

Paleoreichelina (?) *igoi* Davydov.
№ 1/11831 (11831/1). Рис. 3а
Paleoreichelina ? *distincta.*
№ 7/11831 (11831/7). Рис. 3ж

Paleoreichelina ? *vozginensis.*
№ 10/11831 (11831/10). Рис. 3к

320. ДАВЫДОВ В. И. (колл. № 12121). К вопросу о происхождении швагерин. Палеонт. журн., № 4, 1984, с. 3—16, 1 пал. табл.
Изложена история выделения рода *Schwagerina,* причины возникновения гомонимии названия рода, рассмотрена филогения нового подсемейства, описан 1 новый род и 4 новых вида.

Голотипы:

Biwaella tschelamtshiensis Davydov.
№ 1/12121 (12121/1). Табл. I, фиг. 1
Dutkevichites ljangariensis.
№ 11/12121 (12121/11). Табл. I, фиг. 7
Dutkevichites darvasica.
№ 3/12121 (12121/2). Табл. I, фиг. 4
Dutkevichites ? *valeriani.*
№ 4/12121 (12121/4). Табл. I, фиг. 8

321. ДАВЫДОВ В. И. (колл. № 11795, 12235). Ю. Н. Чувашов, Э. Я. Левен, В. И. Давыдов и др. Пограничные отложения карбона и перми Урала, Приуралья и Средней Азии (биостратиграфия и корреляция). «Наука», 1986, 151 с., 25 пал. табл.
Из богатой обработанной коллекции фораминифер описано 43 новых вида.

Голотипы:

Triticites ortashensis Davydov.
№ 6/12235. Табл. XI, фиг. 6
Jigulites makbalensis.
№ 12/12235. Табл. XI, фиг. 12
Rugosofusulina kurnilensis.
№ 19/12235. Табл. XI, фиг. 19
Dutkevitchia ilinskensis.
№ 23/12235. Табл. XI, фиг. 23
Daixina nikolskiensis.
№ 39/12235. Табл. XII, фиг. 16
Daixina jaikensis.
№ 52/12235. Табл. XIII, фиг. 10
Daixina azantashiensis.
№ 47/12235. Табл. XIII, фиг. 5
Daixina kuvandykensis.
№ 57/12235. Табл. XIII, фиг. 15
Daixina martukensis.
№ 55/12235. Табл. XIII, фиг. 13
Paraschwagerina ? *sartauensis.*
№ 69/12235. Табл. XIV, фиг. 11
Paraschwagerina ? *esetensis.*
№ 74/12235. Табл. XV, фиг. 1

Pseudofusulina ? olkensis.
№ 97/12235. Табл. XVI, фиг. 2
Pseudofusulina ? iskrensis.
№ 95/12235. Табл. XVI, фиг. 1
Pseudofusulina ? sholaksaensis.
№ 91/12235. Табл. XV, фиг. 18
Pseudofusulina zhanatanensis.
№ 106/12235. Табл. XVI, фиг. 11
Pseudofusulina aktjubensis.
№ 107/12235. Табл. XVI, фиг. 12
Pseudofusulina buharchensis.
№ 83/12235. Табл. XV, фиг. 10
Triticites ? jakshoensis.
№ 3/11795. Табл. XVII, фиг. 3
Triticites iohchensis.
№ 2/11795. Табл. XVII, фиг. 2
Schagonella primitiva.
№ 13/11795. Табл. XVII, фиг. 13
Schagonella minor.
№ 19/11795. Табл. XVIII, фиг. 3
Schagonella safetgyrensis.
№ 14/11795. Табл. XVII, фиг. 14
Schagonella proimplexa.
№ 22/11795. Табл. XVIII, фиг. 6
Schagonella amplissima.
№ 24/11795. Табл. XVIII, фиг. 8
Schagonella gigantea.
№ 18/11795. Табл. XVIII, фиг. 2
Schagonella ? singularia.
№ 27/11795. Табл. XIX, фиг. 3
Dutkevitchia miniouensis.
№ 29/11795. Табл. XIX, фиг. 5
Dutkevitchia pjandzhjensis.
№ 33/11795. Табл. XX, фиг. 1
Ruzhenzevites praeferganensis.
№ 38/11795. Табл. XX, фиг. 6
Daixina (Daixina) licharevi.
№ 46/11795. Табл. XXI, фиг. 5
Daixina (Daixina) louensis.
№ 48/11795. Табл. XXI, фиг. 7
Daixina (Daixina) evoluta.
№ 50/11795. Табл. XXI, фиг. 9
Daixina (Ultradaixina) dashtidzhumica.
№ 120/11795. Табл. XXII, фиг. 8
Daixina (Ultradaixina) postsokensis.
№ 53/11795. Табл. XXII, фиг. 1
Pseudofusulina subrobusta.
№ 92/11795. Табл. XXV, фиг. 4

Pseudofusulina klunnikovi.
№ 65/11795. Табл. XXIII, фиг. 2
Pseudofusulina netchaevi.
№ 64/11795. Табл. XXIII, фиг. 5
Pseudofusulina manjuscula.
№ 71/11795. Табл. XXIII, фиг. 14
Pseudofusulina tumidula.
№ 69/11795. Табл. XXIII, фиг. 11
Pseudofusulina ? hovunensis.
№ 80/11795. Табл. XXIV, фиг. 4
Rugosochusenella shagonensis.
№ 100/11795. Табл. XXV, фиг. 14
Rugosochusenella sangoneliensis.
№ 101/11795. Табл. XXV, фиг. 10
Rugosochusenella kalaikuchnensis.
№ 95/11795. Табл. XXV, фиг. 7

322. ДАВЫДОВ В. И. (колл. № 12304). Описание видов фузулинид. В сб.: «Стратотипы и фауна унифицированных горизонтов верхнего карбона и нижней перми Средней Азии». Деп. ВИНИТИ, № 2434-В-87, 1987, с. 43—64.

Описано 29 видов и 2 подвида. Новых видов 9, 1 новый подвид.

Голотипы:

Ferganites gravis Davydov.
№ 41а/12304. Табл. I, фиг. 27
Ferganites praeferganensis.
№ 32а/12304. Табл. I, фиг. 18
Ferganites hauzensis.
№ 43а/12304. Табл. I, фиг. 29
Ferganites annae.
№ 59а/12304. Табл. II, фиг. 16
Ferganites ferganensis conspissatus.
№ 84а/12304. Табл. III, фиг. 19
Jigulites atypicus.
№ 88а/12304. Табл. IV, фиг. 1
Daixina (Daixina) markhamatiensis.
№ 90а/12304. Табл. IV, фиг. 3
Daixina (Daixina) sarytashensis.
№ 143а/12304. Табл. VI, фиг. 14
Occidentoschwagerina glabra.
№ 167а/12304. Табл. VIII, фиг. 14
Occidentoschwagerina kyzylkiensis.
№ 169а/12304. Табл. IX, фиг. 1
Licharevites paranitidus auritus.
№ 162а/12304. Табл. VIII, фиг. 7

323. ДАВЫДОВ В. И. (колл. № 12503). К уточнению происхождения и филогении тритицитесов и границы среднего и верхнего

отделов карбона. Палеонт. журн., № 2, 1990, с. 13—25, 3 пал. табл.

Изучение конкретных филогенезов нескольких родов фораминифер позволило смоделировать схемы их филогенетических взаимоотношений. Описан 1 новый вид.

Голотип:

Ferganites exortis Davydov.
№ 19а/12503. Рис. 4, фиг. а

324. ДЕДОК Т. А. (колл. № 8133). Брахиоподы нижнего карбона острова Вайгач. Сб. статей по палеонт. и биострат., вып. 22, НИИГА, 1960, с. 5—30, 11 пал. табл.

Изучение коллекции позволило автору сделать вывод, что несмотря на гигантские размеры раннекаменноугольные брахиоподы Вайгача почти тождественны одновозрастным с Новой Земли и сходны с комплексом фауны Урала, Донбасса и Подмосковного бассейна. Всего описано 28 видов, из них 6 в открытой номенклатуре и 2 формы с родовым определением. Новый вид 1.

Голотип:

Punctospirifer bonus Dedok.
№ 44/8133. Табл. XI, фиг. 6

325. ДЕДОК Т. А., ЧЕРНЯК Т. Е. (колл. № 9263). Брахиоподы нижнего карбона полуострова Таймыр. В сб.: «Палеонт. и биострат. Советской Арктики». Тр. НИИГА, т. 111, 1960, с. 52—72, 9 пал. табл.

Описано 52 вида брахиопод, из них 5 видов новых и 1 новый подвид.

Голотипы:

Linoproductus niigaensis Tschernjak.
№ 15/9263. Табл. II, фиг. 1
Gigantoproductus protvensis taimyrica Dedok.
№ 27/9263. Табл. IV, фиг. 1
Marginifera migai Tschernjak.
№ 37/9263. Табл. VI, фиг. 6
Spirifer zlobini Tsch.
№ 43/9263. Табл. VII, фиг. 4
Pseudosyrinx taimyricus.
№ 59/9263. Табл. VIII, фиг. 7
Punctospirifer orlovi.
№ 66/9263. Табл. IX, фиг. 7

326. ДЕДОК Т. А. (колл. № 9264). О некоторых представителях раннекаменноугольных брахиопод Новой Земли. Палеонт. журн., № 3, 1961, с. 57—60.

Описано 2 новых вида брахиопод из намюрских отложений и новый подвид из визейских.

Голотипы:

Buxtonia (?) *mirabilis* Dedok.
№ 1/9264. Рис. 1а, б
Brachythyris pseudogracilis.
№ 6/9264. Рис. 1в, д
Paulonia ranovensis arctica.
№ 33/9264. Рис. 1е, ж

327. ДОНАКОВА Л. М. (колл. № 10678). Визейские брахиоподы восточного склона Южного Урала (Магнитогорский синклинорий). Ежег. ВПО, т. XXI, 1978, с. 205—224, 4 пал. табл.
Описано 15 видов брахиопод и 1 новый подвид.

Голотип:

Spirifer (?) *trigonalis uralicus* Donakova.
№ 17/10678. Табл. II, фиг. 4

328. КОССОВАЯ О. П. (колл. № 12102). Тип *Coelenterata.* В сб.: «Атлас фауны верхнего карбона и нижней перми Самарской Луки». Казанский Университет, 1986, с. 62—68, 2 пал. табл.
Четырехлучевые кораллы изучались совместно с другими группами ископаемых организмов, характеризующими один из важнейших опорных разрезов границы карбон—пермь Восточно-Европейской платформы. Приведены общие сведения о группе, морфология, терминология, описано 9 видов, из них 4 новые.

Голотипы:

Caninophyllum grekae Kossovaja.
№ 3/12102 (3/112102). Табл. XV, фиг. 3
Arctophyllum minima Koss.
№ 4/12102 (4/112102). Табл. XV, фиг. 1
Bothrophyllum samaraense.
№ 6/12102 (6/112102). Табл. XIV, фиг. 4
Carinthiophyllum multicystatum.
№ 8/12102 (8/112102). Табл. XV, фиг. 5

329. КОССОВАЯ О. Л. (колл. № 12463). Кораллы. В сб.: «Стратотипы и фауна унифицированных горизонтов верхнего карбона и нижней перми Средней Азии». Деп. ВИНИТИ № 2434-В-87, 1987, с. 65—96.
Анализ распределения ругоз по разрезу позволил провести расчленение разреза, рассматриваются этапы развития кораллов, описано 5 видов, из них 2 новых и 1 новый подвид.

Голотипы:

Amplexocarinia delicata gigas Kossovaja.
№ 3а—в/12463. Табл. XII, фиг. 3

Timania karatchatyrica Koss.
№ 7а—е/12463. Табл. XIV, фиг. 1
Axolithophyllum uchbulakense.
№ 9а—г/12463. Табл. XIII, фиг. 1

330. КРОПАЧЕВА Г. С. (колл. № 12591). Новые Уралинииды ? (ругозы) из нижнекаменноугольных отложений хребта Сетте-Дабан. Ежег. ВПО, т. XXXIII, с. 40—48, 2 пал. табл.
Описан 1 новый род и его 4 новых вида.

Голотипы:

Yakutophyllum settedabanense Kropatcheva.
№ 1а, б/12591. Табл. I, фиг. 1
Yakutophyllum grande.
№ 7а—в/12591. Табл. II, фиг. 1
Yakutophyllum pumilum.
№ 11а—в/12591. Табл. II, фиг. 5
Yakutophyllum elegans.
№ 8а—г/12591. Табл. II, фиг. 2

331. КУРИЛЕНКО А. В. (колл. № 12506). Находки платикринитесов в нижнем карбоне Восточного Забайкалья. В сб.: «Проблемы изучения ископаемых и современных иглокожих». АН Эст.ССР, Таллин, 1989, с. 128—133, 1 пал. табл.
Описано 3 вида стеблевых фрагментов криноидей, из них 2 новых.

Голотипы:

Platycrinites ? *donicus* Kurilenko.
№ 1/12506. Табл., фиг. 1, рис. 1
Platycrinites ? *gazimiricus.*
№ 8/12506. Табл., фиг. 8, рис. 2

332. ЛИХАРЕВ Б. К. (колл. № 2365). *Palaeofusulina nana* sp. nov. из антраколитовых отложений Сев. Кавказа. Изв. Геол. Ком., т. XLV, № 2, 1926, с. 59—65, 1 пал. табл.
Детально описаны находки 1 нового вида своеобразных фораминифер из каменноугольных отложений Северного Кавказа. Выяснены отличия между кавказской и индокитайской формами.

Синтипы:

Fusulina (Palaeofusulina) nana Licharev.
№ 1/2365. Табл. II, фиг. 3
№ 2/2365. Табл. II, фиг. 5
№ 3/2365. Табл. II, фиг. 9
№ 4/2365. Табл. II, фиг. 12

333. ЛИХАРЕВ Б. К. (колл. № 8336). Скафоподы и гастроподы — *Archaeogastropoda* (исключая подотряды *Bellerophontina* и *Neritopsina*) верхнего палеозоя Южной Ферганы. Биострат.

сборник, вып. 2. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 116, 1967, с. 5—79, 17 пал. табл.

Описано 43 вида, из них 39 новых, 23 формы с родовым определением, 3 вида в открытой номенклатуре и 1 новый подвид. Приведена история изучения группы, стратиграфическая приуроченность остатков, вопросы терминологии.

Голотипы:

Straparollus (Euomphalus) marginatiformis Licharev.
№ 9/8336. Табл. I, фиг. 10
Straparollus (Straparollus ?) ornatus Lich.
№ 7/8336. Табл. I, фиг. 8
Turbonellina orientalis.
№ 15/8336. Табл. III, фиг. 1
Rhineoderma venustiformis.
№ 24/8336. Табл. IV, фиг. 1
Rhineoderma ? ferganica.
№ 27/8336. Табл. IV, фиг. 4
Baylea veberi.
№ 28/8336. Табл. IV, фиг. 5
Glabrocingulum ferganicum.
№ 38/8336. Табл. V, фиг. 2
Hesperiella ? tadchiniana.
№ 50/8336. Табл. VI, фиг. 2
Neilsonia ispharensis.
№ 51/8336. Табл. VI, фиг. 3
Karatshatyria nana.
№ 47/8336. Табл. V, фиг. 11
Shansiella (Shansiella ?) tuberculata.
№ 70/8336. Табл. VII, фиг. 8
Permoconcha ferganica.
№ 62/8336. Табл. VI, фиг. 14
Paragoniozona asiatica.
№ 74/8336. Табл. VIII, фиг. 4
Amaurotoma ? komishani.
№ 79/8336. Табл. IX, фиг. 1
Amaurotoma ? shabarovi.
№ 78/8336. Табл. VIII, фиг. 9
Amaurotoma ? kisilkiensis.
№ 82/8336. Табл. IX, фиг. 4
Yunnania romanovskyi.
№ 90/8336. Табл. X, фиг. 3
Yunnania semigranulosa.
№ 93/8336. Табл. V, фиг. 6
Microdoma gracile.
№ 96/8336. Табл. X, фиг. 10
Anomphalus rotulensis.
№ 103/8336. Табл. XI, фиг. 1

Anomphalus ? planus.
№ 107/8336. Табл. XI, фиг. 5
Murchisoma ? vjalovi.
№ 118/8336. Табл. XII, фиг. 9
Murchisonia (Hormotoma ?) sergunkovae.
№ 122/8336. Табл. XII, фиг. 13
Ferganispira gradussiformis.
№ 125/8336. Табл. XIII, фиг. 2
Cerithioides permicum.
№ 136/8336. Табл. XIII, фиг. 15
Glyphodeta karatshatyrensis.
№ 130/8336. Табл. XIII, фиг. 7
Stegocoelia ? kirhisica.
№ 115/8336. Табл. XII, фиг. 6
Stegocoelia ? diversicostata.
№ 113/8336. Табл. XII, фиг. 4
Stegocoelia (Stegocoelia) elegans.
№ 141/8336. Табл. XIII, фиг. 20
Stegocoelia (Stegocoelia) netschajewi.
№ 174/8336. Табл. XV, фиг. 12
Stegocoelia (Stegocoelia) duplicosta.
№ 160/8336. Табл. XIV, фиг. 19
Stegocoelia (Stegocoelia) minima.
№ 179/8336. Табл. XV, фиг. 17
Stegocoelia (Stegocoelia) bella.
№ 171/8336. Табл. XV, фиг. 9
Stegocoelia (Stegocoelia) minuta.
№ 209/8336. Табл. XVII, фиг. 16
Stegocoelia (Hypergonia) ambigua.
№ 149/8336. Табл. XIV, фиг. 8
Stegocoelia (Taosia) yini.
№ 142/8336. Табл. XIV, фиг. 1
Stegocoelia (Taosia ?) orientalis.
№ 207/8336. Табл. XVII, фиг. 14
Stegocoelia (Vebericochlis) maclayi.
№ 170/8336. Табл. XV, фиг. 8
Goniasma lasallensis vulgaris.
№ 184/8336. Табл. XVI, фиг. 4
Goniasma ferganica.
№ 191/8336. Табл. XVI, фиг. 11

334. ЛИХАРЕВ Б. К. (колл. № 8336). Скафоподы и гастроподы верхнего карбона и нижней перми Южной Ферганы. ВСЕГЕИ, М., «Недра», 1968, 119 с., 13 пал. табл.

Продолжает публикацию 1967 г. с описанием 48 видов, из которых 7 в открытой номенклатуре и, кроме того, 17 форм с родовым определением; новых видов 36. Дан общий обзор фауны, ее сравнение с фауной из других районов.

Голотипы:

Naticopsis (Naticopsis) protracta Licharev.
№ 270/8336. Табл. IV, фиг. 3
Naticopsis (Naticopsis) plebeja Lich.
№ 236/8336. Табл. I, фиг. 1
Naticopsis (Naticopsis) conica.
№ 244/8336. Табл. I, фиг. 9
Naticopsis (Iedria) ventricoformis.
№ 255/8336. Табл. III, фиг. 1
Trachydomia stuckenbergi.
№ 273/8336. Табл. IV, фиг. 6
Trachydomia subhorizontalis.
№ 281/8336. Табл. V, фиг. 1
Trachydomia ferganica.
№ 285/8336. Табл. V, фиг. 6
Trachydomia parva.
№ 279/8336. Табл. IV, фиг. 12
Loxonema laeve.
№ 288/8336. Табл. VI, фиг. 5
Palaeozygopleura rugosocostata.
№ 290/8336. Табл. VII, фиг. 1
Palaeozygopleura columnaris.
№ 307/8336. Табл. VII, фиг. 20
Palaeozygopleura irregularis.
№ 310/8336. Табл. VIII, фиг. 19
Palaeozygopleura retroflexa.
№ 316/8336. Табл. VIII, фиг. 11
Palaeozygopleura ferganica.
№ 327/8336. Табл. VII, фиг. 19
Palaeozygopleura variabilis.
№ 322/8336. Табл. VII, фиг. 7
Palaeozygopleura kushnarae.
№ 328/8336. Табл. VII, фиг. 15
Palaeozygopleura veberi.
№ 333/8336. Табл. VI, фиг. 13
Palaeozygopleura hemizygoides.
№ 338/8336. Табл. VI, фиг. 18
Palaeozygopleura knighti.
№ 340/8336. Табл. VI, фиг. 12
Palaeozygopleura gradata.
№ 342/8336. Табл. VII, фиг. 11
Palaeozygopleura gracilis.
№ 345/8336. Табл. VI, фиг. 20
Stephanozyga (?) *obtusa.*
№ 356/8336. Табл. VI, фиг. 10
Hemizyga particularis.
№ 357/8336. Табл. V, фиг. 13

Hemizyga ? *abnormalis.*
№ 358/8336. Табл. V, фиг. 11
Hypsipleura ? *carbonica.*
№ 365/8336. Табл. V, фиг. 9
Orthonema frequens.
№ 369/8336. Табл. XII, фиг. 3
Orthonema turris.
№ 389/8336. Табл. XIII, фиг. 4
Orthonema tentaculitoides.
№ 395/8336. Табл. XII, фиг. 20
Callispira (?) *conulus.*
№ 397/8336. Табл. XIII, фиг. 9
Callispira ? *nana.*
№ 399/8336. Табл. XIII, фиг. 10
Callispira ? *volgini.*
№ 406/8336. Табл. XIII, фиг. 19
Sphaerodoma veberi.
№ 417/8336. Табл. IX, фиг. 4
Sphaerodoma ferganense.
№ 423/8336. Табл. IX, фиг. 11
Sphaerodoma obtusatum.
№ 420/8336. Табл. IX, фиг. 7
Sphaerodoma kisilkiense.
№ 426/8336. Табл. IX, фиг. 6
Sphaerodoma commune.
№ 437/8336. Табл. X, фиг. 11

335. МАКСИМОВА З. А., ОКУНЕВА Т. М., ПРОКОФЬЕВ С. К. (колл. № 10895). Обнаружение визейских отложений в Среднем Приамурье. В сб.: «Стратиграфия и литология палеозойских и мезозойских отложений Дальнего Востока и Забайкалья». Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 263, 1976, с. 132—134.

Описаны остатки 1 нового вида трилобитов.

Голотип:

Archegonus (Phillibole ?*) orientalis* Z. Maximova.
№ 1/10895 (10895/1). Рис. 2

336. МИРОНОВА М. Г. (колл. № 8175). Новые виды раннекаменноугольных брахиопод Приколымья. Палеонт. журн., № 2, 1962, с. 80—86, 1 пал. табл.

Описано 4 новых вида брахиопод, принадлежащих четырем родам.

Голотипы:

Krotovia yasachnensis Mironova.
№ 11/8175. Табл. IV, фиг. 1
Gigantoproductus tulensiformis Mir.
№ 27/8175. Табл. IV, фиг. 3

Rhynchotetra (?) *rhomboidea.*
№ 42/8175. Табл. IV, фиг. 4
Neospirifer sinuatoplicatus.
№ 74/8175. Табл. IV, фиг. 7

337. МИРОНОВА М. Г. (колл. № 8491). Позднекаменноугольные брахиоподы Башкирии. ЛГУ, 1967, 59 с., 5 пал. табл.

Описано 58 видов брахиопод, 10 из которых в открытой номенклатуре, 2 вида новые, 1 форма с родовым определением. Приведена таблица распространения описанных видов, сделаны замечания о стратиграфической приуроченности фауны.

Синтипы:

Fluctuaria neoundata Mironova.
№ 26/8491. Табл. II, фиг. 7
№ 27/8491. Табл. II, фиг. 8
Kitakamithyris baschkiricus Mir.
№ 63/8491. Табл. V, фиг. 11 *

338. НЕЛЬЗИНА Р. Е. (колл. № 8947). Материалы по геологии и полезным ископаемым северо-запада РСФСР, 4, «Недра». Л., 1965, 118 с., 11 пал. табл.

Описаны средне- и позднекаменноугольные брахиоподы и пелециподы, характеризующие отдельные горизонты карбона, приводится корреляция с аналогичными отложениями других районов. Всего брахиопод 41 вид, из них 2 в открытой номенклатуре, 2 подвида, новый вид 1. Двустворчатых моллюсков 12 видов.

Голотип:

Choristites onegaensis Barchatova emend. Nelzina.
№ 55/8947. Табл. VIII, фиг. 1

339. НЕХОРОШЕВ В. П. (колл. № 10468). Мшанки верхов нижнего карбона Алапаевского района на Урале. Мат. ЦНИГРИ, Сб. № 6, палеонтология, 1939, с. 194—207, 1 пал. табл.

Описано 14 видов, из них 5 новых и 5 в открытой номенклатуре, 4 вариетета и 5 форм с родовым определением. Новых вариететов 3.

Голотипы:

Fenestella bidentata Nekhoroshev.
№ 1, 1а, б/10468. Табл. I, фиг. 1
Fenestella compressa var. *uralensis* Nekh.
№ 5, 5а/10468. Табл. I, фиг. 3
Fenestella polyporata var. *abundans.*
№ 7, 7а, б/10468. Табл. I, фиг. 5
Fenestella alapaevskensis.
№ 13, 13а, б/10468. Табл. II, фиг. 3
Fenestella membranaceaformis.
№ 16а, б/10468. Табл. II, фиг. 5

Fenestella mikheevi.
№ 17, 17а/10468. Табл. II, фиг. 6
Fenestella albidiformis.
№ 20, 20а, б/10468. Табл. II, фиг. 8
Septopora weberi var. *uralica.*
№ 23, 23а—в/10468. Табл. III, фиг. 3

340. ОШУРКОВА М. В. (колл. № 9454). Палеофитологическое обоснование стратиграфии верхних свит каменноугольных отложений Карагандинского бассейна. ВСЕГЕИ, «Наука», 1967, 152 с., 26 пал. табл.

Описана методика исследований, дан генетический анализ флоры, реконструкция основных типов сообществ, установлены закономерности распределения остатков в разрезе, выявлены стратиграфические комплексы растительных остатков. Описан 51 вид, из них 3 в открытой номенклатуре и 5 новых; 14 форм с родовым определением.

Голотипы:

Belenophyllum rhombeum Oschurkova.
№ 22/9454. Табл. VII, фиг. 3, 4
Stigmaria minor Oschurk.
№ 27/9454. Табл. VIII, фиг. 2, 3
Trigonocarpus elegans.
№ 86/9454. Табл. XIX, фиг. 4
Neuropterocarpus oblongus.
№ 89/9454. Табл. XIX, фиг. 7, 8
Tetragonocarpus ellipticus.
№ 93/9454. Табл. XX, фиг. 2

341. ПИРОЖНИКОВ Л. П. (колл. № 9002). Тельсон птериготуса из Западного Верхоянья. Мат. по геол. и полезн. ископаемым Северо-Востока СССР, № 4, 1960, с. 205—207.

Описаны остатки тельсона ракоскорпиона из каменноугольных отложений Верхоянья.

Голотип:

Pterygotus dzharanensis Pirozhnikov.
№ 1/9002. Рис. 2 в тексте.

342. РАДЧЕНКО Г. П. (колл. № 9259). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Часть I, 1960, с. 15—28, 31, 32, 39—42, 45—52, 61—63, 69—71, 80, 81, 84—90, 100—103, 113—122.

Описано 19 новых видов растительных остатков, в коллекции 18.

Голотипы:

Lepidodendropsis parvipulvinata Radczenko.
№ 1/9259 (96/9259). Табл. 3, фиг. 1

Lepidodendropsis concinna Radcz.
№ 8/9259 (273/9259). Табл. 3, фиг. 8
Prelepidodendron varium.
№ 10/9259 (243/9259). Табл. 4, фиг. 1
Tomiodendron (?) *ellipticum.*
№ 14/9259 (194/9259). Табл. 4, фиг. 5
Ursodendron chacassicum.
№ 20/9259 (178/9259). Табл. 5, фиг. 7
Ursodendron meleschtenkoi.
№ 22/9259 (173/9259). Табл. 6, фиг. 1
Neokoretrophyllites annularioides.
№ 26/9259 (57/9259). Табл. 1, фиг. 1
Schizoneura altaica Vladimirovich et Radczenko.
№ 28/9259 (64/9259). Табл. 8, фиг. 4
Chacassopteris concinna Radcz.
№ 33/9259 (10/9259). Табл. 10, фиг. 1
Todites korvunchanica Vladimirovich.
№ 38/9259 (100/9259). Табл. 12, фиг. 1
Rhodea yavorskyi Radcz.
№ 40/9259 (84/9259). Табл. 14, фиг. 3
Callipteris ivancevia Gorelova.
№ 44/9259 (142/9259). Табл. 16, фиг. 5
Glossozamites kryshtofovichi Prinada et Radczenko.
№ 45/9259 (110/9259). Табл. 17, фиг. 5
Noeggerathiopsis intermedia Radcz.
№ 47/9259 (39/9259). Табл. 18, фиг. 3
Noeggerathiopsis concinna.
№ 51/9259 (979/9259). Табл. 18, фиг. 8
Glottophyllum primaevum.
№ 73/9259 (117/9259). Табл. 21, фиг. 8
Nephropsis minuta.
№ 77/9259 (251/9259). Табл. 23, фиг. 1
Petcheria angusta.
№ 22/9259 (259/9259). Табл. 22, фиг. 2

343. РОГОЗОВ Ю. Г. (колл. № 9136). *Pseudouralinia* и *Cystophrentis* из верхнего турне Приполярного Урала. Палеонт. журн., № 2, 1960, с. 40—43, 1 пал. табл.
Описано 2 новых вида четырехлучевых кораллов.

Голотипы:

Pseudouralinia gorskyi Rogozov.
№ 4а, б/9136. Табл. IV, фиг. 1, 2
Cystophrentis uralica.
№ 5а—в/9136. Табл. IV, фиг. 3, 4

344. РОГОЗОВ Ю. Г. (колл. № 9136). Новый турнейский род *Neomicroplasma* (*Rugosae*). Палеонт. журн., № 3, 1960, с. 48—51, 1 пал. табл.

Описан 1 новый род и 2 новых вида четырехлучевых кораллов, относящиеся к семейству, представители которого известны из силура и девона.

Голотипы:

Neomicroplasma dobrolyubome Rogozov.
№ 1а, б/9136. Табл. II, фиг. 1
Neomicroplasma septata.
№ 8а—г/9139. Табл. II, фиг. 4

345. РОГОЗОВ Ю. Г. (колл. № 9191). Новый вид кораллов рода *Enygmophyllum* из турнейских отложений острова Вайгач. Сб. НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 18, 1960, с. 38—41, 1 пал. табл.

Описан 1 новый вид крупных одиночных кораллов, представленный одним экземпляром.

Голотип:

Enygmophyllum fomichevi Rogozov.
№ 1/9191. Табл. I, фиг. 1—4

346. РОГОЗОВ Ю. Г. (колл. № 8190). Новый род кораллов *Rugosa* из нижнего турне Приполярного Урала. Сб. НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 27, 1961, с. 5—10, 2 пал. табл.

Описаны остатки ругоз нового вида, принадлежащего к новому роду и семейству. Часть коллекции и типовой экземпляр утеряны, приведены списки синтипов с продольным и поперечным сечением коралла.

Синтипы:

Dagmaraephyllum patoki Rogozov.
№ 3а, б/8190. Табл. I, фиг. 4, 4а
№ 6а—в/8190. Табл. I, фиг. 8, 8а, б
№ 7а, б/8190. Табл. II, фиг. 1, 1а
№ 8а, б/8190. Табл. II, фиг. 4, 4а

347. РОГОЗОВ Ю. Г. (колл. № 8311). Новые виды четырехлучевых кораллов из отложений нижнего карбона Приполярного Урала. Уч. зап. НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 2, 1963, с. 63—74, 4 пал. табл.

Описано 7 новых видов ругоз, остатки двух видов на хранение в музей не поступили.

Голотипы:

Cyathoclisia carinata Rogozov.
№ 3а, б/8311. Табл. I, фиг. 2а, б
Carcinophyllum gorskyi.
№ 5а, б/8311. Табл. I, фиг. 3
Carcinophyllum proprium.
№ 6а—г/8311. Табл. I, фиг. 4

Tschernowiphyllum podchemiensis.
№ 7а, б/8311. Табл. III, фиг. 1
Tabulophyllum ? grandis.
№ 9а/8311. Табл. IV, фиг. 1а

348. РОГОЗОВ Ю. Г. (колл. № 9418). Кораллы опорного разреза нижнего карбона Восточного Таймыра. В сб.: «Опорный разрез нижнекаменноугольных отложений Восточного Таймыра». НИИГА, 1972, с. 38—56, 21 пал. табл.

Всего описано 38 видов раннекаменноугольных ругоз, ранее на Таймыре не изучавшихся. Новых видов 13, из них в коллекции 11.

Голотипы:

Multithecopora arctica Rogozov.
№ 6а, б/9418. Табл. IV, фиг. 6
Amplexizaphrentis concrescens.
№ 19а—в/9418. Табл. VII, фиг. 2
Amplexizaphrentis hastatus.
№ 22а—г/9418. Табл. VII, фиг. 5
Liardiphyllum longiseptatum.
№ 29а—в/9418. Табл. VIII, фиг. 7
Liardiphyllum cuneatus.
№ 31а—в/9418. Табл. VIII, фиг. 9
Lithostrotion rarecystosum.
№ 48а, б/9418. Табл. XI, фиг. 3
Lithostrotion cystosum.
№ 50/9418. Табл. XII, фиг. 1
Stylastraea taimyrica.
№ 55/9418. Табл. XIII, фиг. 3
Stylastraea columellata.
№ 56/9418. Табл. XIII, фиг. 4
Thysanophyllum acystosum.
№ 57/9418. Табл. XIV, фиг. 7
Canadiphyllum spumosum.
№ 59/9418. Табл. XIV, фиг. 3

349. СИЗОВА Е. Н. (колл. № 11782). Новые каменноугольные платикриниды Казахстана. Ежег. ВПО, т. XXIV, 1981, с. 205—214, 1 пал. табл.

Описано 6 видов и 1 подвид остатков криноидей, из них 5 видов и подвид новые.

Голотипы:

Platycrinites (?) *tumidus* Sisova.
№ 10/11782. Табл. I, фиг. 10
Platycrinites (?) *subaltaicus* Sis.
№ 11/11782. Табл. I, фиг. 11
Platyplateium providencense intermedius.
№ 9/11782. Табл. I, фиг. 9

Platyplateium tantaicus.
№ 1/11782. Табл. I, фиг. 1
Platyplateium (?) *nurvilosus.*
№ 5/11782. Табл. I, фиг. 4
Platyplateium (?) *longidentatus.*
№ 3/11782. Табл. I, фиг. 3

350. СИЗОВА Е. Н. (колл. № 12499). Позднетурнейские криноидеи Центрального и Южного Казахстана. Ежег. ВПО, т. XXXIV, 1991, с. 151—170, 2 пал. табл.

Описано 2 новых семейства, 5 новых родов и 16 новых видов.

Голотипы:

Poteriocrinites villosus Sisova.
№ 1/12499. Табл. I, фиг. 1
Poteriocrinites praecox Sis.
№ 3/12499. Табл. I, фиг. 3
Mediocrinus (?) *repandus.*
№ 4/12499. Табл. I, фиг. 4
Mediocrinus (?) *rabulatus.*
№ 5/12499. Табл. I, фиг. 5
Mediocrinus (?) *simplex.*
№ 6/12499. Табл. I, фиг. 6
Dacalobatocrinus laciniatus.
№ 8/12499. Табл. II, фиг. 8
Betpakdalacrinus cirriferum.
№ 10/12499. Табл. II, фиг. 9
Rhysocamax trunciformis.
№ 11/12499. Табл. I, фиг. 7
Cyclocaudex infundibularis.
№ 12/12499. Табл. I, фиг. 9
Tchucrinus densus.
№ 14/12499. Табл. II, фиг. 2
Tchucrinus biconvexus.
№ 16/12499. Табл. II, фиг. 1
Tchucrinus loricatus.
№ 17/12499. Табл. II, фиг. 4
Mustelocrinus mustelus.
№ 18/12499. Табл. II, фиг. 5
Dierocalipter surculosus.
№ 19/12499. Табл. II, фиг. 11
Bicyclocrinus polystichus.
№ 21/12499. Табл. I, фиг. 8
Cyclocyclicus elatus.
№ 22/12499. Табл. I, фиг. 11

351. СОЛОМИНА Р. В., ЧЕРНЯК Г. Е. (колл. № 9323). *Orulgania* новый род спириферид из верхнего палеозоя Арктики. Палеонт. журн. АН, № 3, 1961, с. 61—66, 1 пал. табл.

Изученная коллекция позволила брахиоподы, относившиеся к роду *Licharewia* из верхнего карбона Арктики, отнести к новому роду. Описано 3 вида, из них 2 — новые.

Голотипы:

Orulgania naumovi Solomina.
№ 1/9323. Табл. VI, фиг. 3
Orulgania einori Tschernjak.
№ 4/9323. Табл. VI, фиг. 6

352. СОЛОМИНА Р. В. (колл. № 7808) [1]. Тип *Brachiopoda*. В кн.: «Стратиграфия и фауна каменноугольных отложений реки Шартым». Изд. при Львовском Гос. университете, 1973, с. 86—131, 13 пал. табл.

Коллективом палеонтологов изучены богатые коллекции брахиопод из шартымских известняков. В дополнение к своим материалам автор изучил музейные коллекции Д. И. Яковлева и Л. С. Либровича. Эта часть коллекции к монографии и хранится в Музее. Всего имеется 194 экземпляра, из них 5 оригиналов (3 голотипа и 2 неотипа).

Голотипы и неотипы:

Schuchertella librovitchi Solomina.
№ 1/7808 (17/7808). Табл. XXXI, фиг. 2
Eomarginifera schartimiensis (Janischewsky).
№ 2/7807 (20/7808). Табл. XXXI, фиг. 7
Eomarginifera stepanovi Solomina.
№ 3/7808 (17/7808). Табл. XXXI, фиг. 8
Neospirifer grunewaldtianus (Janischewsky).
№ 4/7808 (59/7808). Табл. XXXII, фиг. 4
Pseudosyrinx rudicostus Solomina.
№ 5/7808 (24/7808). Табл. XXXII, фиг. 7

353. СОСНИНА М. И., НИКИТИНА А. П. (колл. № 11033). Каменноугольные фораминиферы Приморья. В сб.: Стратиграфия и палеонтология карбона. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 247, 1976, с. 16—68, 16 пал. табл.

Описано 30 новых видов фораминифер, в коллекции 29.

Голотипы:

Eotuberitina mikhailovi Sosnina.
№ 9/11033. Табл. I, фиг. 7
Eotuberitina sokolovi Sosn.
№ 13/11033. Табл. I, фиг. 13
Diplosphaerina involuta.
№ 19/11033. Табл. I, фиг. 19
Paratuberitina tumida.
№ 23/11033. Табл. I, фиг. 23

[1] Номера, указанные в Каталоге голотипов 1979 г. с. 145 — неверные.

Archaelagena nikitinae.
№ 8/11033. Табл. I, фиг. 6
Archaediscus grozdilovae.
№ 39/11033. Табл. II, фиг. 13
Asteroarchaediscus zhamoidai.
№ 33/11033. Табл. II, фиг. 7
Neoarchaediscus ussuricus.
№ 38/11033. Табл. II, фиг. 12
Howchinia minutissima.
№ 61/11033. Табл. III, фиг. 9
Lituotubella micula.
№ 59/11033. Табл. III, фиг. 5
Ammobaculites zarodensis.
№ 86/11033. Табл. IV, фиг. 10
Endothyranella grozdilovae.
№ 109/11033. Табл. V, фиг. 15
Janischewskina compressa.
№ 152/11033. Табл. VI, фиг. 6
Mediocris globiformis.
№ 166/11033. Табл. IX, фиг. 7
Mediocris compressus.
№ 179/11033. Табл. IX, фиг. 20
Mediocris umbilicatus.
№ 186/11033. Табл. IX, фиг. 27
Pseudostaffella trefilovae.
№ 197/11033. Табл. X, фиг. 9
Pseudoendothyra vissarionovae.
№ 199/11033. Табл. X, фиг. 11
Pseudoendothyra gracilis.
№ 204/11033. Табл. X, фиг. 16
Schubertella marijae.
№ 230/11033. Табл. XIII, фиг. 2
Schubertella samarkensis.
№ 259/11033. Табл. XVI, фиг. 7
Fusiella (?) *exsultata.*
№ 207/11033. Табл. XI, фиг. 1
Akiyoshiella fusulinoides.
№ 233/11033. Табл. XIII, фиг. 5
Fusulinella sokolovi.
№ 245/11033. Табл. XIV, фиг. 8
Fusulina elshanica ordinata Nikitina.
№ 243/11033. Табл. XIV, фиг. 4
Triticites aculeatus Sosnina.
№ 254/11033. Табл. XVI, фиг. 3
Triticites samarkensis.
№ 257/11033. Табл. XVI, фиг. 5
Triticites vetrennikovi Nikitina.
№ 264/11033. Табл. XV, фиг. 5

Triticites indefinitus.
№ 251/11033. Табл. XV, фиг. 8

354. СОЛОМИНА Р. В. (колл. № 11540). Некоторые средне- верхнекаменноугольные брахиоподы Северного Верхоянья. В сб.: «Биостратиграфия и палеобиогеография девона и карбона Азиатской части СССР». «Наука»., Сиб. отд., 1978, с. 99—123, 3 пал. табл.

Изучение брахиопод двух свит хребта Орулган позволило уточнить границы среднего и верхнего карбона Верхоянья и положение границы каменноугольной и пермской систем. Приведено описание 22 видов, из которых 3 в открытой номенклатуре, 4 новых вида, 1 новый вариетет, 1 форма с родовым определением.

Голотипы:

Camerisma rasililaterensis Solomina.
№ 27/11540 (27с—7/11540). Табл. IX, фиг. 27
Brachythyris praeufensis Solom.
№ 44/11540 (271—7/11540). Табл. X, фиг. 9
Brachythyris orulganicus.
№ 47/11540 (27с—7/11540). Табл. XI, фиг. 2
Tiramnia yakutica.
№ 56/11540 (33—8/11540). Табл. XI, фиг. 12

355. СПАССКАЯ И. С. (колл. № 8498). Новые находки алыкаевских пелеципод в Норильском районе. В сб.: «Вопросы геологии Красноярского края». МГУ, 1964, с. 174—193, 20 пал. табл.

Описана коллекция лагунно-пресноводных пелеципод ранее встречаемых только в угленосных отложениях Кузбасса. Всего 20 видов, из них 6 в открытой номенклатуре и 8 новых видов.

Голотипы:

Mrassiella animosa Spasskaja.
№ 6/8498. Табл. I, фиг. 3
Mrassiella sincera.
№ 7/8498. Табл. I, фиг. 15
Mrassiella indigena.
№ 8/8498. Табл. I, фиг. 5
Mrassiella larga.
№ 11/8498. Табл. I, фиг. 6
Mrassiella perfidae.
№ 12/8498. Табл. II, фиг. 8
Naiadites certus.
№ 24/8498. Табл. II, фиг. 7
Angarodon repentinus.
№ 25/8498. Табл. II, фиг. 2
Augea (?) *discordia.*
№ 29/8498. Табл. II, фиг. 1

356. СПАССКАЯ И. С. (колл. № 8946). О комплексах двустворчатых моллюсков угленосных отложений изыхского месторождения Минусинского угольного бассейна. В сб.: «Континентальный верхний палеозой и мезозой Сибири и Центрального Казахстана». (Биостратиграфия и палеонтология). АН СССР, «Наука», 1966, с. 5—39, 4 пал. табл.

Описана коллекция пресноводных пелеципод из отложений среднего—позднего карбона и ранней перми. Изученные комплексы сопоставляются с Кузбасским, позволяют уточнить и обосновать фаунистические границы. Всего 29 видов, из которых 5 в открытой номенклатуре, 1 форма с родовым определением и 1 вариетет. Новых видов 13.

Голотипы:

Anthraconauta arta Spasskaja.
№ 9/8946. Табл. III, фиг. 8
Anthraconauta angusta.
№ 10/8946. Табл. I, фиг. 7
Anthraconauta guttaeformis.
№ 11/8946. Табл. IV, фиг. 2
Anthraconauta lita.
№ 12/8946. Табл. II, фиг. 7
Anthraconauta opima.
№ 14/8946. Табл. II, фиг. 4
Anthraconauta obtusangula.
№ 16/8946. Табл. III, фиг. 7
Anthraconauta pyriformis.
№ 17/8946. Табл. III, фиг. 2
Anthraconauta paucula.
№ 18/8946. Табл. III, фиг. 1
Anthraconauta patelliforma.
№ 20/8946. Табл. I, фиг. 6
Anthraconauta quadrata.
№ 21/8946. Табл. II, фиг. 1
Anthraconauta retis.
№ 24/8946. Табл. I, фиг. 8
Anthraconauta magnoideae.
№ 36/8946. Табл. I, фиг. 1
Mrassiella minusinica.
№ 39/8946. Табл. IV, фиг. 7

СТУКАЛИНА Г. А. (колл. № 9707). См. № 207.

357. ЭКТОВА Л. А. (колл. № 12474). Новое семейство *Fusiellidae* (фораминиферы) и генетические связи некоторых среднекаменноугольных фузулинид. Ежег. ВПО, т. XXXII, 1989, с. 43—51, 2 пал. табл.

Описано новое подсемейство, род и 3 новых вида фораминифер из карбона Средней Азии.

Голотипы:

Neofusiella asymmetrica Ektova.
№ 1/12474. Табл. I, фиг. 1
Fusiella asiatica.
№ 6/12474. Табл. II, фиг. 1
Fusiella praelonga.
№ 9/12474. Табл. II, фиг. 4

ПЕРМЬ

358. БУРАГО В. И. (колл. № 11940). К морфологии листа рода *Psygmophyllum.* Палеонт. журн., № 2, 1982, с. 128—136.
Уточнен объем, дан исправленный диагноз рода и описан 1 новый вид голосеменных из перми Приморья.

Голотип:

Psygmophyllum vesnjankianum Burago.
№ 6/11940. Табл. XII, фиг. 1

359. ВАНИН В. С. (колл. № 11749). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 5, 1980, с. 119—122.
Описано 2 новых рода и 5 новых видов пермских криноидей из перми Среднего Урала и Восточно-Европейской платформы.

Голотипы:

Poteriocrinites vulgaris V. Vanin.
№ 1/11749. Табл. XXIV, фиг. 1
Stomiocrinus diligens.
№ 4/11749. Табл. XXIV, фиг. 4
Stomiocrinus strictus.
№ 9/11749. Табл. XXIV, фиг. 9
Kojvicrinus orciformis.
№ 11/11749 (10/11749). Табл. XXIV, фиг. 11
Pinegicrinus edemskji.
№ 14/11749. Табл. XXIV, фиг. 14

ВЕРБИЦКАЯ Н. Г. (колл. № 9260). См. № 313.

360. ВЛАДИМИРОВИЧ В. П. (колл. № 10950). Новые позднепермские папоротники Приуралья и Кузнецкого бассейна. Тр. ВСЕГЕИ, 204, 1980, с. 43—47.
Описано 2 новых вида папоротников.

Голотипы:

Prynadaeopteris (?) *minuta* Vladimirovich.
№ 1/10950. Табл. X, фиг. 3
Prynadaeopteris (?) *rhomboidea* Vlad.
№ 2/10950. Табл. X, фиг. 1, 2

361. ВЛАДИМИРОВИЧ В. П. (колл. № 11832). Артинская флора Урала. ВСЕГЕИ, Деп. ВИНИТИ № 2381, 1981, 50 с., 5 пал. табл.

Описано 15 видов растений, принадлежащих 8 родам. Новых видов 4.

Голотипы:

Paracalamites exilicostatus Vladimirovich.
№ 11/11832. Табл. II, фиг. 4
Pecopteris kruglovii Vlad.
№ 18/11832. Табл. III, фиг. 7
Callipteris snjatkovii.
№ 23/11832. Табл. IV, фиг. 3
Rufloria duvanica.
№ 32/11832. Табл. V, фиг. 5

362. ВЛАДИМИРОВИЧ В. П. (колл. № 12092). Типовая Уфимская флора Урала. ВСЕГЕИ, Деп. ВИНИТИ № 3470—82, 1982, 101 с., 10 пал. табл.

Описано 28 видов растительных остатков, из них 2 новых, 2 новых вариетета и 1 форма с родовым определением, 5 видов в открытой номенклатуре.

Голотипы:

Comia rarinervia Vladimirovich.
№ 51/12092. Табл. IX, фиг. 13, 14
Entsovia (?) *akluschensis* Vlad.
№ 65/12092. Табл. X, фиг. 9, 10

363. ВЛАДИМИРОВИЧ В. П. (колл. №№ 12230, 12271). Типовая казанская флора Прикамья. ВСЕГЕИ, Деп. ВИНИТИ, № 4571—84, 1984, 91 с., 8 пал. табл.

Описан 21 вид растений, из них 8 новых и 1 форма с родовым определением.

Голотипы:

Tundrodendron tatarica Vladimirovich.
№ 1/12230. Табл. I, фиг. 1
Annularia kamiensis Vlad.
№ 4/12271. Табл. I, фиг. 5
Pecopteris kazanica.
№ 4/12230. Табл. III, фиг. 6
Cladophlebis kamiensis.
№ 6/12230. Табл. III, фиг. 8
Tatarina (?) *tenuinervia.*
№ 28/12271. Табл. VI, фиг. 2
Cordaicarpus gusevii.
№ 46/12271 (45/12271). Табл. X, фиг. 1
Quasistrobus ramiflorus.
№ 10/12230. Табл. VII, фиг. 1

Sylvella magna.
№ 11/12230. Табл. X, фиг. 7, 8

364. ВЛАДИМИРОВИЧ В. П. (колл. № 12230). Высшие растения *Telomophyta.* Атлас характерных комплексов пермской фауны и флоры Урала и Русской платформы. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 331, 1986, с. 32—38, 59 пал. табл.

Описано 11 новых видов растений, описания некоторых из них опубликованы ранее (см. № 363).

Голотипы:

Calamites uralicus Vladimirovich.
№ 2/12230 (2/122330). Табл. 140, фиг. 1
Pecopteris tzekardensis Vlad.
№ 3/12230 (3/122330). Табл. 139, фиг. 6
Pecopteris kazanica.
№ 4/12230 (4/122330). Табл. 151, фиг. 4
Cladophlebis kamiensis.
№ 6/12230 (6/122330). Табл. 151, фиг. 6
Lepeophyllum sabanakovae.
№ 7/12230 (6/122330). Табл. 138, фиг. 7
Quasistrobus ramiflorus.
№ 10/12230 (10/122330). Табл. 153, фиг. 3
Slivkovia (?) *rigida.*
№ 8/12230 (8/122330). Табл. 142, фиг. 8
Sylvella magna.
№ 11/12230 (11/122330). Табл. 152, фиг. 4
Samaropsis dombrovskae.
№ 12/12230 (12/122330). Табл. 152, фиг. 13
Cordaicarpus gorskii.
№ 13/12230 (13/122330). Табл. 142, фиг. 12

365. ВУКС Г. П. (колл. № 12040). Первая находка гейнитцинит (фораминиферы) в перми Закавказья. Палеонт. журн., № 3, 1984, с. 131—133.

Описан 1 новый вид фораминифер.

Голотип:

Geinitzinita sosninae G. Vuks.
№ 1а/12040 (12040/1а). Рис. 1

366. ВУКС Г. П. (колл. № 12008). Фораминиферы. В сб.: «Позднепермский этап эволюции органического мира. Джульфинский и доратамский ярусы СССР». Г. В. Котляр, Ю. Д. Захаров, Б. В. Кочиркевич и др. Л., «Наука», 1984, с. 129—144, 11 пал. табл.

Описано 6 новых видов мелких фораминифер Закавказья и Северного Кавказа.

Голотипы:

Neoendothyra stricta G. Vuks.
№ 9а/12008. Табл. VI, фиг. 31
Dagmarita caucasica.
№ 20а/12008. Табл. VII, фиг. 6
Streblospira minima.
№ 34а/12008. Табл. VI, фиг. 34
Nodosaria transcaucasica.
№ 47а/12008. Табл. VI, фиг. 7
Nodosaria carabagljarensis.
№ 42а/12008. Табл. VI, фиг. 42
Colaniella densecamerata.
№ 61а/12008. Табл. VII, фиг. 12

367. ГЛУШЕНКО Н. В., ИВАНОВ В. К. (колл. № 8886). *Paleolimulus* из нижней перми Донбасса. Палеонт. журн. № 2, 1961, с. 128—130, 1 пал. табл.

Описан 1 новый вид древнего представителя класса меростомовых, представленый отпечатком спинной поверхности панциря.

Голотип:

Paleolimulus jakovlevi Glushenkoi et Ivanov.
№ 1/8886. Табл. XVI, фиг. 1

ГОР Ю. Г. (колл. № 8712). См. № 317.
ДАВЫДОВ В. И. (колл. № 11795, 12235). См. № 321.

368. ДАВЫДОВ В. И. (колл. № 12266). Фузулиниды и аммоноидеи в стратотипе кубергандинского яруса (Юго-Восточный Памир). Ежег. ВПО, т. XXIX, 1986, с. 28—53, 3 пал. табл.

Описано 2 новых вида фораминифер.

Голотипы:

Neofusulinella kobrigensis Davydov.
№ 4/12266. Табл. I, фиг. 10
Rugososchwagerina (?) *insolita.*
№ 14/12266. Табл. I, фиг. 19

ДАВЫДОВ В. И. (колл. № 12304). См. № 322.

369. ДЕДОК Т. А. (колл. № 11846). Некоторые раннебашкирские брахиоподы Новой Земли. Палеонт. журн. № 2, 1982, с. 62—68, 1 пал. табл.

Описано 4 вида брахиопод, из них 3 вида новые.

Голотипы:

Semicostella genuflexa Dedok.
№ 7/11846. Табл. V, фиг. 1
Waagenoconcha similis.
№ 18/11846. Табл. V, фиг. 2
Neospirifer bondarevi.
№ 46/11846. Табл. V, фиг. 4 — неотип

Purdonella (?) *ancestralis.*
№ 48/11846. Табл. V, фиг. 5

370. ДЕДОК Т. А. (колл. № 11846). Раннебашкирские брахиоподы юга Новой Земли (часть вторая). В сб.: «Новая Земля на ранних этапах геологического развития». ПГО «Севморгеология», 1984, с. 86—108.

Описано 13 видов, из них 2 новых и 9 в открытой номенклатуре, 4 формы с родовым определением.

Голотипы:

Camarotoechia dolium Dedok.
№ 81/11846. Табл. I, фиг. 1
Brachythyrina carskii.
№ 109/11846. Табл. IV, фиг. 1

371. ДОМБРОВСКАЯ Х. Р. (колл. № 8515). Опыт корреляции разрезов перми на основе изучения остатков семян голосеменных растений. В сб.: «Геология и полезные ископаемые Тимано-Печорской провинции». Вып. III, 1975, с. 88—98, 2 пал. табл.

Изученная коллекция состоит из 9 видов остатков семян голосеменных растений, из них 2 новых вида описаны.

Голотипы:

Samaropsis praevorcutana Dombrovskaja.
№ 33/8515. Табл. 2, фиг. 13
Samaropsis pseudoextensa Dombr.
№ 41/8515. Табл. 2, фиг. 21

372. ДОМБРОВСКАЯ Х. Р. (колл. № 8516). Семена пермских растений Печорского угольного бассейна и их стратиграфическое значение. «Мат. по геологии и пол. ископ. Северо-Востока Европейской части СССР». Сб. 8, 1976, с. 28—56, 3 пал. табл.

Детальное изучение 18 новых остатков семян из 6 родов позволило установить их стратиграфическое распространение и значение для корреляции разрезов пермских отложений Печорского бассейна. Новых видов в коллекции 17.

Голотипы:

Samaropsis postfrigida Dombrovskaja.
№ 1/8516. Табл. 1, фиг. 3
Samaropsis pajchoica Dombr.
№ 5/8516. Табл. 1, фиг. 6
Samaropsis petschorica.
№ 7/8516. Табл. 1, фиг. 8
Samaropsis cheijagensis.
№ 8/8516. Табл. 1, фиг. 9
Samaropsis syrjagensis.
№ 11/8516. Табл. 1, фиг. 4

Cordaicarpus parvus.
№ 10/8516. Табл. 1, фиг. 10
Cordaicarpus uralicus.
№ 12/8516. Табл. 1, фиг. 12
Cordaicarpus vorcutensis.
№ 13/8516. Табл. 2, фиг. 1
Cordaicarpus (?) *anceps.*
№ 18/8516. Табл. 2, фиг. 7
Cordaicarpus (?) *chalmerjanus.*
№ 22/8516. Табл. 2, фиг. 6
Cordaicarpus sejdaensis.
№ 23/8516. Табл. 2, фиг. 14
Bardocarpus synensis.
№ 35/8516. Табл. 2, фиг. 17
Nucicarpus triangularis.
№ 26/8516. Табл. 2, фиг. 19
Nucicarpus oviformis.
№ 28/8516. Табл. 2, фиг. 21
Carpolithus ruminatus.
№ 32/8516. Табл. 3, фиг. 1
Carpolithus permiensis.
№ 38/8516. Табл. 3, фиг. 6
Carpolithus giganteus.
№ 37/8516. Табл. 3, фиг. 3

373. ДУТКЕВИЧ Г. А. (колл. № 8559). Атлас руководящих форм ископаемых фаун СССР. V. Средний и верхний отделы каменноугольной системы. 1939, с. 43.
В коллекции 1 новый вид пермских фораминифер.

Голотип:

Parafusulina pseudojaponica Dutkevich.
№ 95/8559. Табл. V, фиг. 6

374. ДУТКЕВИЧ Г. А. (колл. № 8559). Атлас руководящих фаун СССР. VI. Пермская система, 1939, с. 26—47, 5 пал. табл.
Из 32 описанных видов в коллекции присутствует 4, из них 3 новых.

Голотипы и синтипы:

Polydiexodina darwasica Dutkevich.
№ 123/8559. Табл. III, фиг. 9
Doliolina dyhrenfurthi.
№ 129/8559. Табл. IV, фиг. 3
№ 128/8559. Табл. IV, фиг. 4
Pseudoschwagerina tumida Licharev.
№ 92/8559. Табл. IV, фиг. 1

375. КАЛМЫКОВА М. А. (колл. № 9145). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. I, ч. I, 1960, с. 146—148.

Описано 2 новых вида, 1 вариетет фузулинид Дарваза.

Голотипы:

Rugosofusulina vulgariformis Kalmykova.
№ 112/9145. Табл. 26, фиг. 1

Rugosofusulina vulgariformis var. *brevis* Kalm.
№ 116/9145. Табл. 26, фиг. 3

Pseudofusulina gundaraensis.
№ 101/9145. Табл. 26, фиг. 7

376. КАЛМЫКОВА М. А. (колл. № 8559). Пермские фузулиниды Дарваза. Биострат. сб. Вып. 2, ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 116, 1967, с. 116—287, 32 пал. табл.

Автор обобщает все сведения о пермских фузулинидах Дарваза, уточняет родовую принадлежность ранее описанных видов, дополняет кратко опубликованные описания, рассматривает историю изучения группы, приводит описание разрезов. Описано 56 видов, из них 6 в открытой номенклатуре, 5 подвидов; 2 вида и 1 подвид новые.

Голотипы:

Nankinella orbicularia minima Kalmykova.
№ 1/8559 (117/8559). Табл. I, фиг. 1

Yahgchienia (?) *antoninae* Kalm.
№ 2/8559 (118/9345). Табл. II, фиг. 7

377. КАЛМЫКОВА М. А. (колл. № 9145). Новые виды древних растений и беспозвоночные СССР. Вып. II, ч. I, 1968, с. 128—136.

Описано 7 новых видов и 2 новых вариетета фораминифер перми Дарваза.

Голотипы:

Pseudofusulina (?) *popovi* Kalmykova.
№ 119/9145. Табл. 32, фиг. 8

Pseudofusulina tschamdaraensis Kalm.
№ 120/9145. Табл. 32, фиг. 3

Pseudofusulina pulla asiatica.
№ 121/9145. Табл. 33, фиг. 1

Pseudofusulina cabudcuensis.
№ 122/9145. Табл. 32, фиг. 5

Pseudofusulina vosginaensis.
№ 124/9145. Табл. 32, фиг. 1

Pseudofusulina edelshteini.
№ 126/9145. Табл. 32, фиг. 9

Parafusulina kaerimisensis.
№ 127/9145. Табл. 33, фиг. 2

Parafusulina darvasica.
№ 128/9145. Табл. 33, фиг. 3
Parafusulina ravnovaensis.
№ 130/9145. Табл. 33, фиг. 4

КОССОВАЯ О. Л. (колл. № 12102). См. № 328.

КОССОВАЯ О. Л. (колл. № 12463). См. № 329.

378. КОТЛЯР Г. В. (колл. № 9211). Новые представители рода *Productus* из верхней перми Южного Приморья. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 93, 1964, с. 123—127, 3 пал. табл.

Описано 2 новых подрода и 2 новых вида брахиопод.

Голотипы:

Productus (Reedoconcha) sosninae Kotlar.
№ 213/9211. Табл. III, фиг. 1, 2
Productus (Waagenoconcha) nachodkensis Kotl.
№ 208/9211. Табл. III, фиг. 5

379. КОТЛЯР Г. В. (колл. № 9518). Г. В. Котляр и Л. И. Попеко. «Биостратиграфия, мшанки и брахиоподы верхнего палеозоя Забайкалья». Зап. Забайкальского ф-ла геогр. общ. СССР, вып. XXVIII, Тр. отд. геол. им. В. А. Обручева, № 5, 1967, 257 с., 57 пал. табл.

Описано 54 вида брахиопод, 3 подвида и 1 форма с родовым определением. Новых видов 20, в коллекции 19. Мшанки в ЦНИГР к работе в музее отсутствуют.

Голотипы:

Jakutoproductus maslennikovi Kotljar.
№ 86/9518. Табл. XVI, фиг. 13
Echinaria bereensis Kotl.
№ 117/9518. Табл. XXI, фиг. 2
Alifera zabaikalica.
№ 134/9518. Табл. XXIII, фиг. 5
Balakhonia licharewi.
№ 141/9518. Табл. XXV, фиг. 2
Cancrinella ostrogensis.
№ 161/9518. Табл. XXVIII, фиг. 5
Camarotoechia merhensis.
№ 191/9518. Табл. XXIX, фиг. 5
Leiorhynchus transversus.
№ 200/9518. Табл. XXX, фиг. 2
Syrigothyris (?) *popekae.*
№ 217/9518. Табл. XXXII, фиг. 9
Orulgania verkhotomica gunbiniana.
№ 230/9518. Табл. XXXV, фиг. 1
Orulgania lata.
№ 260/9518. Табл. XLI, фиг. 4
Neospirifer bereensis.
№ 305/9518. Табл. XLV, фиг. 4

Brachythyrina zabaicalica.
№ 343/9518. Табл. XLVII, фиг. 7
Kitakamithyris tutchaltuensis.
№ 299/9518. Табл. XLIX, фиг. 7
Tomiopsis tricostata.
№ 32/9518. Табл. LIII, фиг. 5
Tomiopsis rhombiformis.
№ 28/9518. Табл. LII, фиг. 9
Tomiopsis convexa.
№ 36/9518. Табл. LIII, фиг. 9
Tomiopsis laevis.
№ 44/9518. Табл. LIII, фиг. 15
Cleiothyridina tschironensis.
№ 397/9518. Табл. LV, фиг. 2
Plectospira orchonensis.
№ 422/9518. Табл. LV, фиг. 9

КОТЛЯР Г. В. (колл. № 11539). См. № 387.

380. КОЦУР Х., МОВШОВИЧ Е. В. (H. Kozur, колл. № 11704). Beiträge zur Conodontenfauna des Perm. Geol. Paläont. Mitt. Innsbruck. Bd. 5, N 4, 1975, S. 1—44.

Описано 4 новых рода и 13 видов и 1 подвид конодонтов. Новых видов 10, в коллекции 1.

Голотип:

Srepanovites meyeni Kozur et Movšovič.
№ 1/11704. Табл. 4, фиг. 7, 9, 10

381. КРОПАЧЕВА Г. С. (колл. № 11538). Позднепермские тетракораллы Южного Приморья. В сб.: Верхний палеозой Северо-Восточной Азии. 1978, с. 44—50, 4 пал. табл.

Описано 4 новых вида ругоз.

Голотипы:

Waagenophyllum (Waagenophyllum) orlensis Kropatcheva.
№ 1/11538. Табл. IV, фиг. 2
Waagenophyllum (Wenizelella) ussurica.
№ 2/11538. Табл. V, фиг. 1
Wentzelloides (Wentzelloides) primoricum.
№ 3/11538. Табл. VI, фиг. 1
Wentzelloides (Wentzelloides) grandicolumellatus.
№ 4/11538. Табл. VI, фиг. 2

382. КРОПАЧЕВА Г. С. (колл. № 12033). Тетракораллы. В сб.: «Позднепермский этап эволюции органического мира. Джульфинский и дорашамский ярусы СССР». Г. В. Котляр, Ю. Д. Захаров, Б. В. Кочиркевич и др. Л., «Наука», 1984, с. 145—147.

Описан 1 новый вид ругоз из перми Закавказья.

Голотипы:

Pentaphyllum araxense Kropatcheva.
№ 1а/12033. Табл. XII, фиг. 1

383. КУЛИКОВ М. В. (колл. № 8758). Моллюски из пермских отложений СССР. Биострат. сб. Вып. 3, ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 129, 1967, с. 114—129, 3 пал. табл.

Описано 25 новых видов и 1 подвид моллюсков из перми Верхоянья и Русской платформы.

Голотипы:

Bellerophon (?) *sibirica* Kulikov.
№ 1/8758. Табл. I, фиг. 3, 4
Bellerophon kharaulakhense Kul.
№ 2/8758. Табл. I, фиг. 5, 6
Laevidentalium (?) *wymensis.*
№ 3/8758. Табл. I, фиг. 2
Laevidentalium (?) *komiensis.*
№ 4/8758. Табл. I, фиг. 1
Polidevcia wymensis.
№ 5/8758. Табл. I, фиг. 7, 8
Pseudomonotis pinegensis.
№ 6/8758. Табл. I, фиг. 9
Liebea vaengensis.
№ 7/8758. Табл. I, фиг. 10—13
Kolymia (?) *permiana.*
№ 8/8758. Табл. I, фиг. 14, 15
Kolymia nebulae.
№ 9/8758. Табл. II, фиг. 1
Kolymia lenae.
№ 10/8758. Табл. II, фиг. 2
Aviculopinna (?) *sibirica.*
№ 11/8758. Табл. II, фиг. 3
Aviculopecten stepanovi.
№ 12/8758. Табл. II, фиг. 4, 5
Aviculopecten netschajewiformis.
№ 13/8758. Табл. II, фиг. 6
Aviculopecten koinensis.
№ 14/8758. Табл. II, фиг. 7
Aviculopecten sojanensis.
№ 15/8758. Табл. II, фиг. 8
Streblochondria kulojensis.
№ 16/8758. Табл. II, фиг. 11—14
Pecten (Aequipecten) komiensis.
№ 17/8758. Табл. II, фиг. 9, 10
Pecten (Pseudamussium) vaengensis.
№ 18/8758. Табл. III, фиг. 1

Netschajewia (?) *sibirica.*
№ 19/8758. Табл. III, фиг. 3
Schizodus licharewi.
№ 20/8758. Табл. III, фиг. 2
Edmondia sibirica.
№ 21/8758. Табл. III, фиг. 5
Edmondia maslennikovi.
№ 22/8758. Табл. III, фиг. 4 — паратип
Edmondia (?) *wymensis.*
№ 23/8758. Табл. III, фиг. 6, 7
Sanguinolites sibirica.
№ 24/8758. Табл. III, фиг. 8
Sanguinolites lenae.
№ 25/8758. Табл. III, фиг. 9, 10
Allorisma komiensis gigantea.
№ 26/8758. Табл. III, фиг. 11

384. КУЛИКОВ М. В. (колл. № 10110). О некоторых редких представителях моллюсков из нижнеказанских отложений Русской платформы. ДАН СССР, т. 241, № 1, 1978, с. 177—179.
Описан 1 новый вид двустворчатых моллюсков и 1 новый род с типовым видом брюхоногих моллюсков.

Голотипы:

Atomodesma menneri Kulikov.
№ 1/10110 (10110—1). Рис. 1, 1
Dickinsiella gigantea Kul.
№ 2/10110 (10110—2) Рис. 1, 2

385. КУЛИКОВ М. В., ТКАЧУК Г. А. (колл. № 11132). О находке *Claraia (Bivalvia)* в верхнепермских отложениях Северного Кавказа. ДАН СССР, т. 245, № 4, 1979, с. 905—908.
Описан 1 новый вид двустворчатых моллюсков.

Голотип:

Claraia caucasica Kulikov et Tkachuk.
№ 1/11132. Рис. 1

386. ЛИХАРЕВ Б. К. (колл. № 9210). Рихтгофении из перми Южного Приморья. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 93, 1964, с. 113—117, 2 пал. табл.
Описано 2 новых вида и 1 новая форма брахиопод своеобразного рода, встречающегося лишь в пермских отложениях теплых морей.

Голотипы:

Richthofenia (Prorichthofenia) ussurica Licharev.
№ 127/9210. Табл. I, фиг. 1
Richthofenia (Richthofenia) orientalis Lich.
№ 117/9210. Табл. I, фиг. 7

387. ЛИХАРЕВ Б. К., КОТЛЯР Г. В. (колл. №№ 9210, 9211, 11539). Пермские брахиоподы Южного Приморья. В сб.: «Верхний палеозой Северо-Восточной Азии». 1978, с. 63—75, 12 пал. табл.

Описано 14 новых видов брахиопод и 1 подвид.

Голотипы:

Meekella pacifica Licharev et Kotljar.
№ 80/9210. Табл. XIX, фиг. 7
Waagenites artemovkensis Lich. et Kotl.
№ 97/9210 (11/9210). Табл. XII, фиг. 2
Gislasia minor Kotljar.
№ 88/11539. Табл. XX, фиг. 9
Bathymyonia barabaschensis Kotl.
№ 69/11539. Табл. XVI, фиг. 1
Bathymyonia ussurica.
№ 70/11539. Табл. XVI, фиг. 2
Bathymyonia nevadensis komarovkensis.
№ 189/9211. Табл. XVI, фиг. 4, 5
Probolionia minor.
№ 18/11539. Табл. XII, фиг. 9
Spinomarginifera costata.
№ 64/11539. Табл. XV, фиг. 11
Megousia pobedensis.
№ 36/11539. Табл. XIII, фиг. 6
Leptodus kaluzinensis Licharev et Kotljar.
№ 112/9210. Табл. XV, фиг. 2
Primorewia reshetnikov Lich. et Kotl.
№ 4/11539. Табл. XI, фиг. 4
Spiriferella grandis Kotljar.
№ 79/11539. Табл. XVIII, фиг. 8
Spirifer reedi Licharev.
№ 212/9210. Табл. XXI, фиг. 13
Tomiopsis atlanichus Kotljar.
№ 7/11539. Табл. XI, фиг. 7
Hustedia longirostris Licharev.
№ 399/9210. Табл. XXII, фиг. 5

388. ЛОБАНОВА О. В. (колл. № 9365). Пермские пелециподы Гродековского района Западного Приморья. Сб. статей по палеонт. и биострат. НИИГА, вып. 25, 1961, с. 52—80, 4 пал. табл.

Описано 17 видов двустворчатых моллюсков, из них 7 в открытой номенклатуре и 2 новых.

Голотипы:

Parallelodon marinum Lobanova.
№ 3/9365. Табл. I, фиг. 4, 5

Lima (?) *formosa* Lob.
№ 22/9365. Табл. IV, фиг. 1, 2

389. ЛОБАНОВА О. В. (колл. № 9618). Новые виды двустворчатых моллюсков из пермских отложений Норильского района. Ученые зап. НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 16, 1966, с. 64—72, 1 пал. табл.

Описано 4 новых вида и 1 форма с родовым определением, принадлежащие к известным ранее родам, однако в данном районе представители 2-х родов встречены впервые.

Голотипы:

Taimyria norilica Lobanova.
№ 1/9618. Табл. I, фиг. 1, 2
Anthraconauta ornata Lob.
№ 2/9618. Табл. I, фиг. 3, 4
Microdontella (?) *pilula.*
№ 3/9618. Табл. I, фиг. 5
Kinerkaella arctica.
№ 4/9618. Табл. I, фиг. 8, 9

390. МИКЛУХО-МАКЛАЙ К. В. (колл. № 11030). Новые роды и виды древних растений и беспозвоночных СССР. ВНИГРИ, 1980, с. 61, 66, 67.

Описано 3 новых вида фораминифер из перми Восточно-Европейской платформы.

Голотипы:

Vasicekia obscura K. M.-Maclay.
№ 1/11030. Табл. 16, фиг. 1
Nodosaria mesensis.
№ 4/11030. Табл. 17, фиг. 17
Spandelina subtilis.
№ 6/11030. Табл. 17, фиг. 15

391. МИКЛУХО-МАКЛАЙ К. В. (колл. № 11788). Первая находка казанских фораминифер рода *Pachyphloia* в Бореальной провинции. Палеонт. журн. № 2, 1980, с. 133—135.

Описан 1 вид фораминифер.

Голотип:

Pachyphloia triangula K. M.-Maclay.
№ 1/11788 (11788/1). Рис. 1

392. МИРОНОВА М. Г. (колл. № 12054). Раннепермские гастроподы Урала (надсемейства *Bellerophontacea* и *Euomphalacea*). Ежег. ВПО, т. XXVIII, 1985, с. 118—133, 2 пал. табл.

Описано 10 видов, из них 7 новых и 2 формы с родовым определением.

Голотипы:

Euphemites permicus Mironova.
№ 1/12054. Табл. I, фиг. 1

Euphemitopsis granosus Mir.
№ 3/12054. Табл. I, фиг. 3
Bellerophon (Bellerophon) neicistatus.
№ 5/12054. Табл. I, фиг. 5
Bellerophon (Pharkidonotus) uralicus.
№ 10/12054. Табл. I, фиг. 10
Knightites uralicus.
№ 12/12054. Табл. II, фиг. 1
Retispira reticulata.
№ 19/12054. Табл. II, фиг. 8
Straparollus (Straparollus) subpermianus.
№ 25/12054. Табл. II, фиг. 14

393. МУРОМЦЕВА В. А. (колл. № 11570). В сб.: «Пермские отложения Новой Земли». Калашников Н. В., Молин В. А., Фефилова Л. А. и др. Л., «Наука», 1981, 152 с., 34 пал. табл.

Приведены основные разрезы, дано обоснование возраста отложений, описаны собранные остатки фауны и флоры. Двустворчатых моллюсков 33 вида, из них 5 новых.

Голотипы:

Palaeoneilo arctica Muromzeva.
№ 41/11570. Табл. VII, фиг. 1
Solemya (Janeia) solikamica Muromz.
№ 13/9523 (13/9323)[1]. Табл. VII, фиг. 12
Pernopecten vadegensis.
№ 647/11570 (660/11570). Табл. XI, фиг. 9
Pernophorus angustus.
№ 645/11570. Табл. XI, фиг. 6
Vacunella (?) *novosemelica.*
№ 595/11570 (594/11570). Табл. XI, фиг. 1

394. МУРОМЦЕВА В. А., ГУСЬКОВ В. А. (колл. № 11570). Пермские морские отложения и двустворчатые моллюски Советской Арктики. Тр. ВНИГРИ, 1984, 208 с., 53 пал. табл.

Рассмотрена биостратиграфия отложений, приведены сведения об истории изученности моллюсков. Описано 73 вида, из них 55 новых и 6 новых родов. В коллекции 48 новых видов.

Голотипы:

Nuculana undosa Muromzeva.
№ 35/11570. Табл. 2, фиг. 14
Solemya (Janeia) petschorica Guskov.
№ 52/11570. Табл. 24, фиг. 10
Vorkutella dembskaja Muromzeva et Guskov.
№ 53/11570. Табл. 51, фиг. 13
Parallelodon uralicus Muromzeva.
№ 64/11570. Табл. 36, фиг. 7

[1] Голотип выбран из коллекции Люткевич В. М., 1968.

Modiolus ellipticus Guskov et Pogorevitsch.
№ 69/11570. Табл. 5, фиг. 14
Modiolus magnus Guskov.
№ 73/11570. Табл. 5, фиг. 19
Myalina flexuosa Muromzeva.
№ 100/11570. Табл. 4, фиг. 21
Septimyalina sultanaevi Muromz.
№ 102/11570. Табл. 24, фиг. 12
Atomodesma minima.
№ 148/11570. Табл. 10, фиг. 4
Atomodesma pogorevitschi Muromzeva et Guskov.
№ 135/11570. Табл. 18, фиг. 1
Atomodesma stepanovi Muromz.
№ 158/11570. Табл. 10, фиг. 1
Atomodesma paichoica Guskov et Muromzeva.
№ 130/11570. Табл. 6, фиг. 2
Atomodesma licharewi Muromz.
№ 142/11570. Табл. 13, фиг. 2
Atomodesma sartangensis Muromzeva et Kusnezov.
№ 138/11570. Табл. 14, фиг. 2
Atomodesma bicarinata Muromz.
№ 156/11570. Табл. 12, фиг. 7
Atomodesma ? tenuistriata.
№ 188/11570. Табл. 6, фиг. 3
Kolymia pergamenti.
№ 186/11570. Табл. 19, фиг. 1
Aviculopecten sulaensis.
№ 251/11570. Табл. 27, фиг. 13
Aviculopecten nikolaevi.
№ 252/11570. Табл. 31, фиг. 10
Aviculopecten tompo.
№ 254/11570. Табл. 27, фиг. 12
Aviculopecten scheremetus Guskov.
№ 267/11570. Табл. 27, фиг. 8
Fasciculiconcha ascidiiformis.
№ 265/11570. Табл. 29, фиг. 1
Streblopteria bella.
№ 313/11570. Табл. 34, фиг. 22
Streblochondria ? mira.
№ 289/11570. Табл. 29, фиг. 4
Euchondria vorcutica.
№ 321/11570. Табл. 34, фиг. 27
Detopecten barchatovae Muromzeva.
№ 325/11570. Табл. 27, фиг. 11
Palaeolima afanasievi Muromz.
№ 628/11570. Табл. 53, фиг. 5
Scaphellina praeobscurus Guskov.
№ 373/11570. Табл. 35, фиг. 2

Astartella omolonica Muromz.
№ 429/11570. Табл. 38, фиг. 12
Cypricardella petschorica Guskov.
№ 452/11570. Табл. 5, фиг. 4
Cypricardinia borealica Muromz.
№ 450/11570. Табл. 37, фиг. 13
Edmondia omolonica.
№ 456/11570. Табл. 49, фиг. 3
Megadesmus dembskajea Guskov.
№ 460/11570. Табл. 49, фиг. 5
Megadesmus borealis Muromz.
№ 457/11570. Табл. 45, фиг. 6
Vacunella petschorica Guskov.
№ 475/11570. Табл. 42, фиг. 18
Myonia (Myinoa) orulganica Muromz.
№ 497/11570. Табл. 49, фиг. 2
Wilkingia androsovi Guskov.
№ 614/11570. Табл. 51, фиг. 2
Solenomorpha kogimica Muromz.
№ 576/11570. Табл. 5, фиг. 23
Sanguinolites lukjanovae.
№ 526/11570. Табл. 48, фиг. 5
Sanguinolites ? *bulkurensis.*
№ 523/11570. Табл. 51, фиг. 8
Praeundulomya leonidi.
№ 561/11570. Табл. 51, фиг. 5
Praeundulomya dibica.
№ 560/11570. Табл. 44, фиг. 6
Palaeocosmomya omoloniformica Guskov.
№ 569/11570. Табл. 40, фиг. 5
Pentagrammysia rogovica.
№ 572/11570. Табл. 40, фиг. 2
Verchojanogrammysia saphronovi Muromzeva.
№ 575/11570. Табл. 40, фиг. 4
Ragozinia dembskajae Muromzeva et Guskov.
№ 583/11570. Табл. 41, фиг. 5
Prothyris (Prothyris) cilindricus.
№ 586/11570. Табл. 48, фиг. 7
Conocardium ? *halmerjus* Guskov.
№ 591/11570. Табл. 2, фиг. 19

395. НЕЛЬЗИНА Р. Е. (колл. № 9315). Новые раннепермские виды пелеципод Башкирии. Палеонт. журн. № 1, 1961, с. 159—161. Описано 2 новых вида двустворчатых моллюсков.

Голотипы:

Parallelodon shachtauensis Nelzina.
№ 1/9315. Рис. 1

Astartella gigantea.
№ 2/9315. Рис. 2

396. НЕЛЬЗИНА Р. Е. (колл. № 10344). Стратиграфия перми северной части Московской синеклизы. М. А. Колмыкова, Д. С. Кашик, М. В. Куликов и др. Биострат. сборник. Палеонт. и страт. палеозоя СССР. 1978, с. 325, 1 пал. табл.

Описано 2 вида брахиопод, 7 видов двустворчатых моллюсков, из них 2 новых, 4 вида гастропод.

Голотипы:

Netschajewia kulogorae Nelzina.
№ 13/10344 (12/10344). Табл. I, фиг. 19
Wilkingia jakovlevi.
№ 16/10344. Табл. I, фиг. 9

397. ПИРОЖНИКОВ Л. П. (колл. № 9197). Остатки *Cycloidea* из отложений казанского яруса реки Кожим (Печерский каменноугольный бассейн). Сборник статей по палеонт. и биострат. НИИГА, вып. 17, 1959, с. 85—87, 1 пал. табл.

Описаны остатки панциря ракообразного нового рода и вида, принадлежащих к циклоидеям из перми р. Кожим (Приполярный Урал).

Голотип:

Petschorocaris kozhimensis Pirozhnikov.
№ 1/9197. Табл. I, фиг. 1—3

398. ПРОНИНА Г. П. (колл. № 12515). Фораминиферы зоны *Paratirolites kittli* дорашамского яруса поздней перми Закавказья. Ежег. ВПО, т. XXXII, 1989, с. 30—40, 2 пал. табл.

Описано 6 новых видов мелких фораминифер.

Голотипы:

Nodosaria doraschamensis G. Pronina.
№ 27/12515. Табл. I, фиг. 27
Pseudolangella acus.
№ 69/12515. Табл. II, фиг. 36
Pseudolangella doraschamensis.
№ 65/12515. Табл. II, фиг. 32
Geinitzina araxensis.
№ 36/12515. Табл. II, фиг. 2
Geinitzina gloria.
№ 46/12515. Табл. II, фиг. 12
Frondicularia (?) *arpaensis.*
№ 60/12515. Табл. II, фиг. 27

399. РЕДИЧКИН Н. А. (колл. № 11009). Новые роды и виды древних растений и беспозвоночных СССР. ВНИГРИ, 1980, с. 48.

Описан 1 новый вид пермских фораминифер.

Голотип:

Rugosofusulina kalitvensis Redichkin.
№ 1/11009. Табл. 12, фиг. 4

400. СКОРОПИСЦЕВА Л. Е. (колл. № 10019). Позднепалеозойские морские лилии Советской и Зарубежной Арктики. Уч. зап. НИИГА, палеонт. и биострат., вып. 25, 1969, с. 30—57, 7 пал. табл.

Описано 32 вида пермских остатков криноидей, из них 22 новых и 2 в открытой номенклатуре. В коллекции 18 новых видов.

Голотипы:

Stomiocrinus kolymensis Skoropisceva.
№ 3/10019 (10019—3). Табл. II, фиг. 1
Stomiocrinus verchoyanicus.
№ 2/10019 (10019/2). Табл. I, фиг. 4
Stomiocrinus rarus.
№ 21/10019 (9518/19). Табл. I, фиг. 1
Poteriocrinites verchoyanicus.
№ 17/10019 (10019—17). Табл. VII, фиг. 4
Pentagonocyclicus bytantaicus.
№ 5/10019 (10019—5). Табл. III, фиг. 3
Pentagonocyclicus profatilovi.
№ 6/10019 (10019—6). Табл. III, фиг. 6
Pentagonocyclicus burovi.
№ 9/10019 (10019—9). Табл. III, фиг. 10
Pentagonocyclicus suhonaensis Yeltyschewa et Skoropisceva.
№ 7/10019 (10019—7). Табл. III, фиг. 7
Pentagonocyclicus dorofeevi Skoropisceva.
№ 8/10019 (10019—8). Табл. III, фиг. 8
Pentagonocyclicus ostaschkini.
№ 1/10019 (10019—1). Табл. I, фиг. 7
Pentagonocyclicus verchojanicus.
№ 25/10019 (10019—25). Табл. II, фиг. 6
Pentagonocyclicus petschoraensis Yeltyschewa et Skoropisceva.
№ 27/10019 (10019—27). Табл. IV, фиг. 1
Pentagonocyclicus kharaulachensis Skoropisceva.
№ 24/10019 (10019—24). Табл. I, фиг. 8
Arenariocrinus incrustatus.
№ 11/10019. Табл. VI, фиг. 1
Arenariocrinus areniferus.
№ 15/10019. Табл. VI, фиг. 6
Cyclocyclicus ottuktachensis.
№ 12/10019 (10019—12). Табл. VI, фиг. 3
Cyclocyclicus orulganicus.
№ 13/10019 (10019—13). Табл. VI, фиг. 4

Cyclocyclicus punctatus.
№ 14/10019 (10019—14). Табл. VI, фиг. 5

401. СОЛОМИНА Р. В. (колл. № 8356). Некоторые новые виды из пермских отложений Пай-Хоя. НИИГА, сб. статей по палеонт. и биострат., вып. 6, 1957, с. 69—80, 3 пал. табл.

Описано 7 новых видов брахиопод семейства *Productidae* Gray из отложений трех свит перми Пай-Хоя.

Голотипы:

Waagenoconcha obscura Solomina.
№ 1/8356. Табл. I, фиг. 1
Kochiproductus saajagensis Solom.
№ 5/8356. Табл. II, фиг. 1
Cancrinella multicostata.
№ 6/8356. Табл. II, фиг. 2
Cancrinella multicostata var. *inconvexa.*
№ 7/8356. Табл. II, фиг. 3
Cancrinella magna.
№ 11/8356. Табл. III, фиг. 1
Linoproductus auritus.
№ 13/8356. Табл. III, фиг. 3
Muirwoodia vorcutensis.
№ 17/8356. Табл. III, фиг. 6

402. СОЛОМИНА Р. В. (колл. № 11828). Некоторые раннепермские продуктиды Верхоянья и их стратиграфическое значение. Палеонт. журн. № 2, 1981, с. 71—81, 2 пал. табл.

Описано 9 видов брахиопод, из них 2 новых.

Голотипы:

Anidanthus megensis Solomina.
№ 16/11828 (46/11828). Табл. VI, фиг. 4
Cancrinella grandis Sol.
№ 24/11828 (1405/11828). Табл. VI, фиг. 12

403. СОСНИНА М. И. (колл. № 8248). Некоторые пермские фузулиниды и лагениды Сихотэ-Алиня. Биострат. сборник, вып. 1. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 115, 1965, с. 142—160, 5 пал. табл.

Описаны представители двух отрядов фораминифер. Всего 16 новых видов.

Голотипы:

Sichotenella maichensis Sosnina.
№ 85/8248. Табл. I, фиг. 7
Kahlerina endothyraformis.
№ 88/8248. Табл. I, фиг. 5
Kahlerina maxima.
№ 87/8248. Табл. I, фиг. 6

Acervoschwagerina indolasa.
№ 89/8248. Табл. II, фиг. 1
Parafusulina stricta.
№ 91/8248. Табл. III, фиг. 5
Parafusulina tortila.
№ 93/8248. Табл. IV, фиг. 3
Parafusulina (?) *primoriensis.*
№ 92/8248. Табл. IV, фиг. 1
Monodiexodina wanganensis.
№ 96/8248. Табл. III, фиг. 2
Metadoliolina dutkevitchi.
№ 103/8248. Табл. V, фиг. 1
Cancellina zarodensis.
№ 99/8248. Табл. II, фиг. 2
Praesumatrina turgida.
№ 107/8248. Табл. V, фиг. 4
Praesumatrina (?) *taudemica.*
№ 106/8248. Табл. V, фиг. 5
Jabeina sphaerula.
№ 108/8248. Табл. IV, фиг. 4
Nodosaria vasiljevi.
№ 109/8248. Табл. I, фиг. 1
Nodosaria grande-camerata.
№ 110/8248. Табл. I, фиг. 4
Dentalina orienta.
№ 112/8248. Табл. I, фиг. 2

404. СОСНИНА М. И. (колл. № 8764). Новые виды лагенид Южного Приморья, изученные с применением лаковых пленок. Биострат. сб., вып. 3. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 129, 1967, с. 61—75, 6 пал. табл.

Описано 8 новых видов пермских фораминифер, 5 из которых относятся к новому роду.

Голотипы:

Geinitzina senkinensis Sosnina.
№ 1/8764. Табл. II, фиг. 1
Pachyphloia extensa Sosn.
№ 7/8764. Табл. III, фиг. 6
Pachyphloia langei.
№ 11/8764. Табл. III, фиг. 3
Marginulinella typica.
№ 14/8764. Табл. II, фиг. 3
Marginulinella composita.
№ 15/8764. Табл. V, фиг. 6
Marginulineila cubiformis.
№ 22/8764. Табл. V, фиг. 1
Marginulinella vulgaris.
№ 25/8764. Табл. VI, фиг. 1

Marginulinella amplituda.
№ 27/8764. Табл. VI, фиг. 2

405. СОСНИНА М. И. (колл. № 8248). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. II, ч. I, 1968, с. 99—128. Описано 28 новых видов фораминифер.

Голотипы:

Kahlerina consueta Sosnina.
№ 1/8248. Табл. 25, фиг. 1
Kahlerina globiformis Sosn.
№ 4/8248. Табл. 25, фиг. 4
Kahlerina circularis.
№ 7/8248. Табл. 25, фиг. 7
Kahlerina nautiloidea.
№ 9/8248. Табл. 27, фиг. 1
Pseudokahlerina discoidalis.
№ 11/8248. Табл. 26, фиг. 4
Pseudokahlerina compressa.
№ 13/8248. Табл. 27, фиг. 7
Pseudokahlerina latespiralis.
№ 16/8248. Табл. 25, фиг. 11
Pseudokahlerina implexa.
№ 17/8248. Табл. 26, фиг. 1
Pseudokahlerina crepida.
№ 19/8248. Табл. 25, фиг. 9
Parareichelina rhomboidea.
№ 20/8248. Табл. 27, фиг. 3
Parareichelina mira.
№ 25/8248. Табл. 26, фиг. 5
Parareichelina subangusta.
№ 29/8248. Табл. 28, фиг. 1
Sichotenella infirma.
№ 34/8248. Табл. 28, фиг. 6
Sichotenella ussurica.
№ 38/8248. Табл. 28, фиг. 10
Sichotenella discoidea.
№ 40/8248. Табл. 29, фиг. 1
Rauserella breviscula.
№ 44/8248. Табл. 29, фиг. 6
Rauserella ellipsoidalis.
№ 47/8248. Табл. 29, фиг. 8
Rauserella sphaeroidea.
№ 49/8248. Табл. 28, фиг. 12
Rauserella erratica ussuriensis.
№ 52/8248. Табл. 29, фиг. 10
Minojapanella fusiformis.
№ 54/8248. Табл. 30, фиг. 13

Codonofusiella golubinensis.
№ 56/8248. Табл. 30, фиг. 11
Codonofusiella parva.
№ 58/8248. Табл. 30, фиг. 8
Codonofusiella lipovensis.
№ 61/8248. Табл. 30, фиг. 1
Codonofusiella sphaerica.
№ 64/8248. Табл. 32, фиг. 6
Codonofusiella nachodkaensis.
№ 66/8248. Табл. 30, фиг. 4
Lantschichites exilis.
№ 70/8248. Табл. 31, фиг. 5
Lantschichites elegans.
№ 72/8248. Табл. 31, фиг. 1
Lantschichites tenuitheca.
№ 75/8248. Табл. 31, фиг. 7

406. СОСНИНА М. И. (колл. № 8248). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. II, ч. I, 1968, с. 146—150.
Описано 4 новых вида фораминифер Приморья.

Голотипы:

Nodosaria primoriensis Sosnina.
№ 76/8248. Табл. 34, фиг. 7
Nodosaria inventa.
№ 78/8248. Табл. 34, фиг. 8
Wanganella densa.
№ 79/8248. Табл. 34, фиг. 9
Wanganella crassisepta.
№ 80/8248. Табл. 34, фиг. 10

407. СОСНИНА М. И., НИКИТИНА А. П. (колл. № 11421). Мелкие фораминиферы верхней перми Южного Приморья. В сб.: «Ископаемая флора и фауна Дальнего Востока и вопросы стратиграфии фанерозоя». Владивосток, 1977, с. 27—52, 2 пал. табл.
Описано 22 новых вида фораминифер и 1 новый род.

Голотипы:

Arenovidalina vulgaris Sosnina.
№ 4/11421. Табл. I, фиг. 8
Arenovidalina rotunda Sosn.
№ 5/11421. Табл. I, фиг. 4
Arenovidalina crassa.
№ 6/11421. Табл. I, фиг. 3
Arenovidalina ovoidea.
№ 8/11421. Табл. I, фиг. 1
Lasiodiscus primoriensis A. Nikitina.
№ 30/11421. Табл. II, фиг. 16

Lasiotrochus parvus.
№ 32/11421. Табл. II, фиг. 13
Lasiotrochus filcatus.
№ 34/11421. Табл. II, фиг. 15
Glomotrocholina pojarkovi.
№ 36/11421. Табл. II, фиг. 10
Glomotrocholina galeiformis.
№ 37/11421. Табл. II, фиг. 11
Glomotrocholina semisphaerica.
№ 38/11421. Табл. II, фиг. 12
Neoendothyra compressa Sosnina.
№ 10/11421. Табл. I, фиг. 10
Neoendothyra ornata Sosn.
№ 11/11421. Табл. I, фиг. 11
Neoendothyra chomatifera.
№ 12/11421. Табл. I, фиг. 12
Bradyina micula.
№ 14/11421. Табл. I, фиг. 17
Bradyina ussurica.
№ 17/11421. Табл. I, фиг. 19
Bradyina novizkiana.
№ 20/11421. Табл. I, фиг. 16
Climacammina plurilocellata A. Nikitina.
№ 22/11421. Табл. II, фиг. 1
Climacammina aequilata.
№ 24/11421. Табл. II, фиг. 3
Dagmarita elegans Sosnina.
№ 25/11421. Табл. II, фиг. 8
Dagmarita cuneata Sosn.
№ 27/11421. Табл. II, фиг. 6
Dagmarita exilis.
№ 28/11421. Табл. II, фиг. 7
Dagmarita oblonga.
№ 29/11421. Табл. II, фиг. 4

408. СОСНИНА М. И. (колл. № 10919). Новые роды и виды древних растений и беспозвоночных СССР. ВНИГРИ, 1980, с. 63—70.

Описано 8 новых видов позднепермских фораминифер из Южного Приморья.

Голотипы:

Nodosaria liciuminiformis Sosnina.
№ 1/10919. Табл. 17, фиг. 7
Nodosaria shaigensis Sosn.
№ 3/10919. Табл. 17, фиг. 8
Nodosaria novizkiana.
№ 5/10919. Табл. 17, фиг. 4

Nodosaria globolocularis.
№ 9/10919. Табл. 17, фиг. 1
Dentalina porrecta.
№ 12/10919. Табл. 17, фиг. 12
Calvezina curta.
№ 13/10919. Табл. 17, фиг. 10
Eomarginulinella urbana.
№ 14/10919. Табл. 17, фиг. 11
Frondina ovoidea.
№ 17/10919. Табл. 17, фиг. 14

409. СОСНИНА М. И. (колл. № 11850). Некоторые пермские фузулиниды Дальнего Востока. Ежег. ВПО, т. XXIV, 1981, с. 13—34, 2 пал. табл.

Описано 2 новых рода и 9 новых видов.

Голотипы:

Sichotenella sandalina Sosnina.
№ 2/11850. Табл. I, фиг. 7
Sichotenella mucronata Sosn.
№ 6/11850. Табл. I, фиг. 17
Sichotenella ventricosa.
№ 9/11850. Табл. II, фиг. 9
Reichelina ulachensis.
№ 12/11850. Табл. I, фиг. 15
Reichelina chorensis.
№ 14/11850. Табл. I, фиг. 11
Rauserella oblonga.
№ 17/11850. Табл. II, фиг. 10
Minojapanella (Wutuella) lancetiformis.
№ 19/11850. Табл. II, фиг. 14
Minojapanella (Wutuella) concinna.
№ 22/11850. Табл. II, фиг. 15
Zarodella zhamoidai.
№ 32/11850. Табл. II, фиг. 2

410. СОСНИНА М. И. (колл. № 12071). Некоторые новые представители милиолид и нодозариид поздней перми Южного Приморья (фораминиферы). Ежег. ВПО, т. XXVI, 1983, с. 29—45, 2 пал. табл.

Описано 10 видов фораминифер, из них 3 принадлежат новым родам.

Голотипы:

Baisalina turgida Sosnina.
№ 1/12071. Табл. I, фиг. 4
Baisalina orbicula Sosn.
№ 5/12071. Табл. I, фиг. 7
Baisalina pressula.
№ 6/12071. Табл. II, фиг. 8

Baisalina flangensis.
№ 7/12071. Табл. I, фиг. 10
Baisalina consueta.
№ 8/12071. Табл. II, фиг. 11
Pseudobaisalina mirifica.
№ 22/12071. Табл. I, фиг. 1
Nikitinella septata.
№ 14/12071. Табл. I, фиг. 11
Nodosaria losovensis.
№ 16/12071. Табл. II, фиг. 1
Wanganella angusta.
№ 17/12071. Табл. II, фиг. 7
Pseudowanganella tenuitheca.
№ 18/12071. Табл. II, фиг. 2

СПАССКАЯ И. С. (колл. № 8946). См. № 356.

411. СТУКАЛИНА Г. А. (колл. № 12656). Характеристика пелагических криноидей рода *Neocamptocrinus* из пермских отложений Северо-Востока СССР. В сб.: «Опорный разрез перми Омолонского массива». Тр. МСК СССР, т. 21, 1990, с. 134—142, 2 пал. табл.

Изученная коллекция позволила уточнить данные о типовых экземплярах и типовых сериях изученных видов, сведения об их стратиграфическом распространении и пространственном размещении, расширить диагнозы видов. Описано 6 видов, из них 2 новых; выбраны необходимые лектотипы для видов, описанных Скорописцевой Л. Е. и Яковлевым Н. Н.

Голотипы и лектотипы:

Neocamptocrinus rarus (Skoropisceva).
№ 3/12656. Табл. XVI, фиг. 2
Neocamptocrinus rudicostatus Stukalina.
№ 9/12656. Табл. XVI, фиг. 3
Neocamptocrinus groschini (Skoropisceva).
№ 23/12656. Табл. XVII, фиг. 1
Neocamptocrinus magnus Stuk.
№ 21/12656. Табл. XVI, фиг. 10
Neocamptocrinus arcticus (Yakovlev in Yeltyschewa).
№ 22/12656. Табл. XVI, фиг. 11

412. ТРИЗНА В. Б. (колл. № 6125). Пермские мшанки с р. Сылвы. В сб.: «Микрофауна нефтяных месторождений СССР. Сборник I. Второе Баку и Западная Сибирь». Тр. ВНИГРИ, нов. сер., вып. 31, 1948, с. 137—188, 20 пал. табл.

Изучены различные типы рифов Уфимского плато и своеобразие фауны Сылвенских рифов, рассмотрено распределение мшанок в толщах рифов, приведены замечания о филогении двух родов и возрастных изменениях колоний. Описано 19 видов и 7 вариететов, в коллекции 9 видов и 6 вариететов, из них 5 видов и вариететы новые.

Голотипы:

Fenestella mariae Trizna.
№ 1, 1а, б/6125 (14/6125). Табл. XI, фиг. 7; табл. XII, фиг. 4
Fenestella ornata var. *postrobusta.*
№ 5, 5а, б/6125 (30/6125). Табл. XIII, фиг. 4
Fenestella vischerensis var. *gamovica.*
№ 7, 7а/6125 (47/6125). Табл. XIV, фиг. 4
Fenestella aridula.
№ 8, 8а, б/6125 (49/6125). Табл. XIV, фиг. 1—3
Polypora biarmica var. *pluscula.*
№ 11а/6125 (53/6125). Табл. XV, фиг. 4
Polypora sargaensis.
№ 14, 14а/6125 (55/6125). Табл. XVI, фиг. 1
Polypora sargaensis var. *prodigiosa.*
№ 29, 29а/6125 (163/6125). Табл. XIV, фиг. 5; табл. XVI, фиг. 4
Polypora sargaensis var. *magnotuberculata.*
№ 32а/6125 (169/6125). Табл. XVII, фиг. 1
Polypora sargaensis var. *visenda.*
№ 35а/6125 (176/6125). Табл. X, фиг. 10
Polypora kulikovi.
№ 37, 37а/6125 (180/6125). Табл. XVIII, фиг. 3, 5
Polypora pluriformis.
№ 43, 43а/6125 (185/6125). Табл. XIX, фиг. 3

413. ТУМАНСКАЯ О. Г. (колл. № 9733). Пермо-карбоновые отложения Крыма. Часть II. Пермо-карбоновые трилобиты Крыма. ЦНИГРИ, 1935, 63 с., 12 пал. табл.

Описано 18 видов трилобитов, из них 17 новых, 11 форм с родовым определением, 7 новых вариететов. Так как голотипы не выделены автором, в качестве синтипов указаны номера образцов, представленных головной частью панциря в тех случаях, где они имеются в наличии.

Синтипы:

Neogriffithides gemmellaroi Toumansky.
№ 1/9733. Табл. III, фиг. 12
№ 2/9733. Табл. VII, фиг. 1, 2
№ 3/9733. Табл. VII, фиг. 3, 4
№ 4/9733. Табл. VII, фиг. 5, 6
№ 5/9733. Табл. VII, фиг. 7, 8
№ 6/9733. Табл. VII, фиг. 9
№ 10/9733. Табл. VIII, фиг. 1
№ 11/9733. Табл. VIII, фиг. 2
№ 12/9733. Табл. VIII, фиг. 3

№ 13/9733. Табл. VIII, фиг. 4
№ 14/9733. Табл. VIII, фиг. 5
№ 15/9733. Табл. VIII, фиг. 6
№ 17/9733. Табл. VIII, фиг. 8
№ 18/9733. Табл. VIII, фиг. 9
№ 19/9733. Табл. VIII, фиг. 10
№ 20/9733. Табл. VIII, фиг. 11, 12
№ 21/9733. Табл. VIII, фиг. 13
№ 22/9733. Табл. VIII, фиг. 15
№ 23/9733. Табл. VIII, фиг. 16
№ 55/9733. Табл. VIII, фиг. 17

Neogriffithides almensis Toum.
№ 50/9733. Табл. XII, фиг. 5, 6 *

Neogriffithides ismailensis.
№ 51/9733. Табл. III, фиг. 13 *

Neogriffithides gemmellaroi var. *crimensis.*
№ 52/9733. Табл. IX, фиг. 18 *

Neogriffithides (Phillipsia) pulchella var. *mussemensis.*
№ 53/9733. Табл. II, фиг. 15 *

Paraphillipsia karpinskyi.
№ 59/9733. Табл. II, фиг. 1—7 *

Paraphillipsia weberi.
№ 60/9733. Табл. III, фиг. 1—3

Paraphillipsia tauricum.
№ 62/9733. Табл. IV, фиг. 1
№ 64/9733. Табл. IV, фиг. 3
№ 65/9733. Табл. IV, фиг. 4
№ 69/9733. Табл. IV, фиг. 9
№ 70/9733. Табл. IV, фиг. 10
№ 78/9733. Табл. V, фиг. 9, 10

Paraphillipsia netschaewi.
№ 83/9733. Табл. V, фиг. 1
№ 85/9733. Табл. V, фиг. 3
№ 89/9733. Табл. V, фиг. 7

Paraphillipsia kussicum.
№ 91/9733. Табл. V, фиг. 11, 12 *

Paraphillipsia tauricum var. *anfensis.*
№ 92/9733. Табл. II, фиг. 9, 10 *

Pseudophillipsia borissiaki.
№ 94/9733. Табл. I, фиг. 1—9

Pseudophillipsia borissiaki var. *martensis.*
№ 96/9733. Табл. I, фиг. 11 *

Pseudophillipsia mustafensis.
№ 97/9733. Табл. VI, фиг. 5, 6 *

Pseudophillipsia mustafensis var. *sarabansis.*
№ 98/9733. Табл. VI, фиг. 7 *

Pseudophillipsia elegans var. *ibrischensis.*
№ 99/9733. Табл. VI, фиг. 8, 9 *

Phillipsia nafensis.
№ 109/9733. Табл. VIII, фиг. 18 *
Phillipsia aliensis.
№ 110/9733. Табл. VIII, фиг. 19 *
Phillipsia kojensis.
№ 111/9733. Табл. II, фиг. 11
№ 112/9733. Табл. II, фиг. 12
Permoproetus teschi.
№ 114/9733. Табл. X, фиг. 1, 2
№ 115/9733. Табл. X, фиг. 3, 4
№ 116/9733. Табл. X, фиг. 5
Permoproetus gortanii.
№ 125/9733. Табл. XI, фиг. 1, 2
Permoproetus beschui.
№ 135/9733. Табл. XI, фиг. 15 *
Proetus (?) *girtyi.*
№ 137/9733. Табл. XII, фиг. 1
№ 138/9733. Табл. XII, фиг. 2
№ 139/9733. Табл. XII, фиг. 3
Proetus (?) *baltensis.*
№ 140/9733. Табл. III, фиг. 9
№ 141/9733. Табл. III, фиг. 10

414. ТУМАНСКАЯ О. Г. (колл. № 9568). Пермские аммонеи Заалайского хребта и их стратиграфическое значение для стратиграфии Памира. Пробл. палеонт., т. V, 1939, с. 93—122, 8 пал. табл.

Описано 4 вида, из них 2 новые, 11 форм с родовым определением и 1 новый вариетет.

Голотипы:

Papanoceras subalewskyanum var. *transalayensis* Toumansky.
№ 1/9568. Табл. II, фиг. 1—3
Artinskia sassykensis Toum.
№ 27/9568. Табл. I, фиг. 6, 7
Riphaeites schabalkini.
№ 30/9568. Табл. I, фиг. 1, 2

415. УСТРИЦКИЙ В. И. (колл. № 12204). *Burovia* — новый род хорридониид (*Brachiopoda*) из селандерской свиты архипелага Свальбард. Тр. НИИГА, 1980, с. 25—29, 2 пал. табл.

Описан 1 новый род и типовой вид брахиопод из перми Северо-Восточной Земли.

Голотип:

Burovia selanderensis Ustritsky.
№ 1/12204. Табл. I, фиг. 1, 2

416. УХАРСКАЯ Л. Б. (колл. № 10147). Первые находки песчаных фораминифер в казанских отложениях Русской платформы.

Биострат. сборн. палеонт. и стратиграф. палеозоя СССР, 1978, с. 26—40, 1 пал. табл.

Описано 9 видов, из них 8 новых и 1 в открытой номенклатуре, 3 формы с родовым определением.

Голотипы:

Rhabdammina licharevi Ucharskaja.
№ 1/10147. Табл. I, фиг. 2
Sorosphaera wagensis Uchars.
№ 2/10147. Табл. I, фиг. 3
Lagenammina? pusilla.
№ 3/10147. Табл. I, фиг. 4
Croneisella elongata.
№ 4/10147. Табл. I, фиг. 5
Hippocrepinella vercholensis.
№ 5/10147. Табл. I, фиг. 6
Turritellella regulata.
№ 6/10147. Табл. I, фиг. 9
Ammobaculites primarius.
№ 7/10147. Табл. I, фиг. 11
Trochammina brevicula.
№ 8/10147. Табл. I, фиг. 12

417. УХАРСКАЯ Л. Б. (колл. № 11031). Новые роды и виды древних растений и беспозвоночных СССР. ВНИГРИ, 1980, с. 25, 58.

Описано 2 новых вида пермских фораминифер.

Голотипы:

Hyperamminoides orenburgensis Ucharskaja.
№ 1/11031. Табл. 5, фиг. 1
Verneuilinoides kazanicus.
№ 2/11031. Табл. 15, фиг. 2

418. ЧЕДИЯ И. О. (колл. № 11834). О некоторых критериях выделения видов лепидолин. Вопросы микропалеонтологии, вып. 24, 1981, с. 60—75, 2 пал. табл.

Описано 3 вида фораминифер, из перми Южного Приморья. Новых вида 2.

Голотипы:

Lepidolina? clavata I. Chedija.
№ 9а/11834 (11834/9а). Табл. I, фиг. 9; табл. II, фиг. 5
Lepidolina? septulosa.
№ 7а/11834 (11834/7а). Табл. II, фиг. 8

419. ЧЕДИЯ И. О. (колл. № 11986). Фораминиферы. В сб.: «Позднепермский этап эволюции органического мира. Джульфинский и дорашамский ярусы СССР». Г. В. Котляр, Ю. Д. За-

харов, Б. В. Кочиркевич и др. Л., «Наука», 1984, с. 129—144, 11 пал. табл.

Описан 1 новый род, 1 подрод и 12 новых видов фораминифер Памира.

Голотипы:

Boultonia ogbinensis Chedija.
№ 27а/11986. Табл. II, фиг. 1

Boultonia avushensis.
№ 31а/11986. Табл. II, фиг. 4

Nanlingella? ardaglensis.
№ 34а/11986. Табл. III, фиг. 1

Pseudodunbarula dzhagadzurensis.
№ 48а/11986. Табл. V, фиг. 7

Paradunbarula (Shindella) shindensis.
№ 64а/11986. Табл. IX, фиг. 2

Paradunbarula (Shindella) dzhilgensis.
№ 70а/11986. Табл. IX, фиг. 7

Paradunbarula (Shindella) prolata.
№ 73а/11986. Табл. X, фиг. 2

Parananlingella labonsis.
№ 87а/11986. Табл. VIII, фиг. 4

Parananlingella rhombica.
№ 93а/11986. Табл. VIII, фиг. 10

Codonofusiella iniqua.
№ 109а/11986. Табл. II, фиг. 8

Codonofusiella dzhagrensis.
№ 113а/11986. Табл. III, фиг. 14

Colaniella exilis.
№ 5а/11986. Табл. X, фиг. 9

УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ КОЛЛЕКЦИЙ

Абушик А. Ф. 41, 136—145, 223—227
Авров Д. П. 146
Андреева О. Н. 1, 42—44
Балашов З. Г. 45—47, 228
Балашова З. А. 48—50, 228
Бергер А. Я. 51, 147, 229—231
Бондарев В. И. 52, 53
Бондаренко О. Б. 148—150
Борисяк М. А. 54, 151
Бульванкер Э. З. 232—235
Бураго В. И. 358
Бурский А. З. 52, 55—59
Бутусова И. П. 236
Ванин В. С. 359
Васильева Г. Н. 312
Вербицкая Н. Г. 313, 314
Владимирович В. П. 315, 360—364
Вологдин А. Г. 237
Востокова В. А. 60, 61
Вукс Г. П. 365, 366
Галицкая А. Я. 316
Глущенко Н. В. 367
Гор Ю. Г. 317, 318
Горянский В. Ю. 2, 3
Грикуров Г. Э. 27
Гуськов В. А. 394
Давыдов В. И. 319—323, 368
Дедок Т. А. 324—326, 369, 370
Домбровская Х. Р. 371, 372
Донакова Л. М. 327
Дуткевич Г. А. 373, 374
Егорова Л. И. 4
Елтышева Р. С. 62—64, 238
Ерина М. В. 65
Жижина М. С. 66—69, 152—155
Занина И. С. 239
Иванова В. К. 367
Кадлец Н. М. 156, 157
Калмыкова М. А. 375—377
Каплун Л. И. 240
Ким А. И. 158, 159
Ковалевский О. П. 70, 71, 160—162
Колобова И. М. 72—75, 161
Колосков К. Н. 52
Конева С. П. 5, 6
Корень Т. Н. 76, 77, 163—168, 241
Коссовая О. П. 328, 329
Котляр Г. А. 378, 379, 387
Коцур Х. 380
Кравцов А. Г. 17, 242—244
Кропачева Г. С. 330, 381, 382
Кузьмин А. М. 245—247
Куликов М. В. 383—385
Куликова В. Д. 248, 249
Куриленко А. В. 331
Лазаренко Н. П. 7—16
Лелешус В. П. 169—172
Лепехина В. Г. 250—252
Лесовская А. И. 78
Лихарев Б. К. 332—334, 386, 387
Лобанова О. В. 388, 389
Максимова З. А. 79, 80, 173, 253—255, 335
Машкова Т. В. 174, 256
Мельникова Л. М. 32
Менакова Г. Н. 175
Мизенс Л. И. 176
Миклухо-Маклай К. В. 390, 391
Миронова М. Г. 81, 257, 336, 337, 392
Мирошников Л. Л. 17
Михайлова Н. Ф. 77
Мовшович Е. В. 380
Модзалевская Е. А. 82—84, 177—179, 258
Модзалевская Т. Л. 180—186, 259, 260
Моисеева Т. И. 145
Муромцева В. А. 393, 394
Нельзина Р. Е. 338, 395, 396
Нехорошев В. П. 187, 339
Нехорошева Л. В. 52, 85—91, 188, 189, 261—265
Никитин И. Ф. 18, 92—94, 108
Никитина А. П. 353, 407
Никитина О. И. 95
Никифорова О. И. 96—100, 175, 190—194, 266
Нилова Н. В. 195
Обручев Л. В. 267
Обут А. М. 101, 102, 196
Окунева Т. М. 335
Орадовская М. М. 99—100, 103, 104, 116, 197

Ошуркова М. В. 340
Пегель Т. В. 4
Петросян Н. М. 268—271
Пирожников Л. П. 341, 397
Пламенская А. Г. 272
Попов Л. Е. 5, 6, 18—22, 32, 92, 98, 99, 104—110, 273
Попов Ю. Н. 23
Прокофьев С. К. 335
Пронина Г. П. 398
Радченко Г. П. 269—271, 314, 342
Редичкин Н. А. 399
Ржонсницкая М. А. 274, 306
Рогозов Ю. Г. 343—348
Розман Х. С. 111—115
Розов С. Н. 97
Рукавишникова Т. Б. 108, 110
Рябинин В. Н. 198, 275, 276
Самсонов В. В. 29
Сапельников В. П. 116
Сарв Л. 41
Сенкевич М. А. 277
Сизова Е. Н. 238, 278—280, 349, 350
Смирнова М. А. 153, 154, 199, 200, 281—284
Соболевская Р. Ф. 101, 196
Соколов Б. С. 117
Соловьев И. А. 19, 24—31
Соломина Р. В. 354, 404, 402
Соснина М. И. 403—410
Спасская И. С. 355, 356
Спасский Н. Я. 285—287
Спасский Я. Н. 288, 289
Староверов В. Н. 290
Стрельников С. И. 118, 201, 202
Стукалина Г. А. 62, 119—127, 203—208, 291—293, 411
Сытова В. А. 128, 209, 210
Тихонов Ю. А. 22
Ткачук Г. А. 385
Трандафилова Е. Ф. 226
Тризна В. Б. 412
Туманская О. Г. 413, 414
Устрицкий В. И. 415
Ухарская Л. Б. 416, 417
Хазанович К. К. 32
Храмова А. П. 33
Цай Д. Т. 77
Чедия И. О. 418, 419
Черкесова С. В. 259—261, 294, 302
Чернышева Б. Б. 211
Чернышева Н. Е. 4, 34—39
Черняк Т. Е. 325, 351
Чехович В. Д. 212—215, 303
Чугаева М. Н. 129
Шейнман Ю. М. 216, 304
Эктова Л. А. 305
Юдина Ю. А. 306
Яворский В. И. 40, 130—134, 217—222, 307—310
Яковлев Н. Н. 135, 311

УКАЗАТЕЛЬ ГОЛОТИПОВ НОВЫХ ВИДОВ ПО ГРУППАМ

Растительные остатки

Водоросли

Boroldaiphycus borovikovi 237
terektaensis 237
Korsakia chunica 315
triassia 315
Krupehenkella katbasensis 277
Orestovia lata 277

Высшие споровые растения

Angaridium daldykanensis 318
norilskiensis 318
(?) talnachense 317
Angarocarpus muraensis 313
Andonophyllum radczenkoi 317
Annularia kamiensis 363
(?) radczenkoi 317
(?) tajmyrica 317
Aphyllopteris robusta 271
tenuis 271
Balkhashiodendron elongatum 277
Bardocarpus synensis 372
Barinophyton sibiricum 271
Barrandeina karatanense 277
Barsassia grandis 277
plana 277
Belonophyllum rhombeum 340
Calamites uralicus 364
Callipteris ivancevia 342
grandifolia 317
snjatkovii 361
turumakensis 317
Callixylon kazakhstanum 251
Cardioneura norilskiensis 317
Cardiopteridium costatum 312
verbitskajae 312
Carpolithus giganteus 372
permiensis 372
ruminatus 372
Chacassopteris concinna 342
Cladophlebis kamiensis 363, 364
Comia arctica 317
Cordaicarpus (?) anceps 372
(?) chalmerjanus 372
gorskii 364
gusevii 363
parvus 372
sejdaensis 372
uralicus 372
vorcutensis 372
Condomaephyton gracile 269
Condrusia brevis 271
Crassinervia minuta 317
schorochovii 317
Dichophyton typicus 271
Estsovia (?) akluschensis 326
Ginkgophyllum taimyrica 317
Glossozamites krystofovichi 342
Glottophyllum primaevum 342
Koretrophyllites chantaica 317
(?) longifolia 317
subuliformis 317
talnachensis 317
Lepeophyllum sabanakovae 364
Lepidodenchopsis concinna 342
parvipulvinata 342
Maubasia notabilis 277
Moresnetia krischtofovichii 268
sibirica 268
Neokoretrophyllites annularioides 342
Nephropsis ellipticus 312
eniseevi 317
minuta 342
norilskiensis 317
Neuropterocarpus oblongus 340
Niayssia altaica 269
Nucicarpus oviformis 372
triangularis 372
Noeggerathiopsis arctica 317
fokini 317
incognita 317
intermedia 342
kajerkanensis 317
norilskiensis 317
Paracalamites evenkensis 314
exilicostatus 361
planicostatus 314
primaevus 314
pseudovicinalis 314

vicinalis 314
Pecopteris kazanica 263, 264
kruglovii 361
tzekardensis 364
Petcheria angusta 342
(?) kajarkani 317
Pietzchia timanica 252
Prelepidodendron varium 342
Prynadaepteris (?) minuta 360
Psilodendrion sibiricum 250
Psygmophyllum vesjakianum 358
Pynadaeopteris (?) rhomboidea 360
Pursongia rarinervis 317
Quasistrobus ramiforus 363, 364
Rhodea yakorskyi 342
Rufloria duvanica 361
Samaropsis anomale 313
cheijagensis 372
dombrovskae 364
paichoica 372
petschorica 372
postfrigida 372
praevorcutana 371
pseudoextensa 371
syrjagensis 372
talnachovi 317
Schizoneura altaica 342
Slivkovia ? rigida 364
Sphenophyllum (?) primitivum 317
Stigmaria minor 340
Svalbardia osmanica 270
Sylvella magna 363, 364
Taeniocrada orientalis 271
Tatrina (?) tenuinervia 363
Taxopitys karagandensis 251
Tentekiodendron elongatum 277
Tetragonocarpus ellipticus 340
Todites korvunchanica 342
Tomiodendron achmetbekense 277
akchokensis 277
(?) ellipticum 342
mirabile 277
radczenkoi 277
tschingizicum 277
zvontsovi 277
Trigonocarpus ellipticus 340
Tundrodendron tatarica 363
Uralia camdjalensis 270
minussinskiensis 270
Ursodendron chacassicum 342
meleschtenkoi 342
Yavorskyia chachlovii 317
divinii 317
Zamiopteris schwedovii 317

Тип ПРОСТЕЙШИЕ

Класс Фораминиферы

Acervoschwagerina indolasa 403
Akiyoshiella fusulinoides 353
Ammobaculites primarius 416
zarodensis 353
Archaediscus grozdilovae 353
Archaelagena nikitinae 353
Arenovidalina crassa 407
ovoidea 407
rutunda 407
vulgaris 407
Asteroarchaediscus zhamoidai 353
Baisalina consueta 410
flangensis 410
orbicula 410
pressula 410
turgida 410
Bithurammina sphaerica 305
Biwaella tschelemtshiensis 320
Boultonia avushensis 419
ogbinensis 419
Bradyina micula 407
novizkiana 407
ussurica 407
Calvezina curta 408
Cancellina zarodensis 403
Climacammina aequilata 407
plurilocellata 407
Codonofusiella dzhagrensis 419
golubinensis 405
iniqua 419
lipovensis 405
nachodkaensis 405
parva 405
sphaerica 405
Colaniella densecamerata 366
exilis 419
Croneisella elongata 416
Dagmarita caucasica 366
cuneata 407
elegans 407
exilis 407
oblonga 407
Daixina azantashiensis 321
jaikensis 321
kuvandykensis 321
martukensis 321
nikolskiensis 321
(Daixina) evoluta 321
licharevi 321
louensis 321
markhamatiensis 322
sarytashensis 322
(Ultradaixina) dashtidzhumica 321
postsokensis 321
Dentalina orienta 403
porrecta 408
Diplospharina involuta 353
Doliolina dyhrenfurthi 374
Dutkevichites darvasica 320
ljangariensis 320
? valeriani 320

Dutkevitchia ilinskensis 321
miniouensis 321
pjandzhjensis 321
Endothyranella grozdilovae 353
Eomarginulinella urbana 408
Eotuberitina mikhailovi 353
sokolovi 353
Ferganites annae 322
exortis 323
ferganensis conspissatus 322
gravis 322
hauzensis 322
praeferganensis 322
Frondicularia (?) arpaensis 398
Frondina ovoidea 408
Fusiella asiatica 357
(?) excultata 353
praelonga 357
Fusulina (Paraeofusulina) nana 323
Fusulinella elshanica ordinata 353
sokolovi 353
Geinitzina araxensis 398
gloria 398
senkinensis 404
Geinitzinita sosninae 365
Glomotrocholina galeiformis 407
pojarkovi 407
semisphaerica 407
Hippocrepinella vercholensis 416
Hyperamminoides orenburgensis 417
Howchinia minutissima 353
Jabeina sphaerula 403
Janischewskina compressa 353
Jigulites atypicus 322
makbalensis 321
Kahlerina circularis 405
consueta 405
endothyraformis 403
globiformis 405
maxima 403
nautiloidea 405
Lagenammina ? pusilla 416
Lantschichites elegans 405
exilis 405
tenuitheca 405
Lasiodiscus filcatus 407
parvus 407
primoriensis 407
Lepidolina ? clavata 418
? septulosa 418
Licharevites paranitidus auritus 322
Lityotubella micula 353
Marginulinella amplituda 404
composita 404
cubiformis 404
typica 404
vulgaris 404
Mediocris compressus 353
globiformis 353
umbilicatus 353
Metadoliolina dutkevitchi 403
Minojapanella fusiformis 405
(Wutuella) concinna 409
lancetiformis 409
Monodiexodina wanganensis 403
Nankinella orbicularia minima 376
Nanlingella ? ardaglensis 419
Neoarchaediscus ussuricus 353
Neoendothyra chomatifera 407
compressa 407
ornata 407
stricta 366
Nikitinella septata 410
Neofusiella asymmetrica 357
Neofusulinella kobrigensis 368
Nodosaria carabagljarensis 366
doraschamensis 398
globolocularis 408
grande-camerata 403
inventa 406
liciuminiformis 408
losovensis 410
mesensis 390
novizkiana 408
primoriensis 406
shaigensis 408
transcaucasica 366
vasiljevi 403
Occidentoschwagerina glabra 322
kyzylkiensis 322
Pachyphloia extensa 404
langei 404
triangula 391
Paleoreichelina ? distincta 319
? igoi 319
? vozginensis 319
Paradunbarula (Shindella) dzhilgensis 419
prolata 419
shindensis 419
Parafusulina darvasica 377
kaerimisensis 377
(?) primoriensis 403
pseudojaponica 373
ravnovaensis 377
stricta 403
tortila 403
Parananlingella labensis 419
rhombica 419
Paraschwagerina ? esetensis 321
? sartauensis 321
Parathurammina kokschaalica 305
Paratuberitina tumida 353
Polydiexodina darwasica 374
Praesumatrina (?) taudemica 403
turgida 403
Pseudobaisalina mirifica 410
Pseudodunbarula dzhagadzurensis 419
Pseudoendothyra gracilis 353
vissarionovae 353
Pseudofusulina aktjubensis 321

buharchensis 321
cabudcuensis 377
edelshteini 377
gundaraensis 375
? hovunensis 321
? iskrensis 321
klunnikovi 321
manjuscula 321
netchaevi 321
? olkensis 321
popovi 377
pulla asiatica 377
? sholaksaensis 321
subrobusta 321
tschamdaraensis 377
tumidula 321
vosginaensis 377
zhanatanensis 321
Pseudokahlerina compressa 405
crepida 405
discoidalis 405
implexa 405
latespiralis 405
mira 405
rhomboidea 405
subangusta 405
Pseudolangella acus 398
doraschamensis 398
Pseudoschwagerina tumida 374
Pseudostaffella trefilova 353
Pseudowanganella tenuitheca 410
Rauserella breviscula 405
ellipsoidalis 405
erratica ussuriensis 405
oblonga 409
sphaeroidea 405
Reichelina chorensis 409
ulachensis 409
Rhabdammina licharevi 416
Rosenella miniarensis 275
normalis 275
Rugosochusenella kalaikuchnensis 321
sangoneliensis 321
shagonensis 321
Rugosofusulina kalitvensis 399
kuruilensis 321
vulgariformis 375
vulgariformis var. brevis 375
Rugososchwagerina (?) insolita 368
Ruzhenzevites praeferganensis 321
Schagonella amplissima 321
gigantea 321
minor 321
primitiva 321
proimplexa 321
safetgyrensis 321
? singularia 321
Schubertella marijae 353
samarkensis 353
Sichotenella discoidea 405
infirma 405
maichensis 403
mucronata 409
sandalina 409
ussurica 405
ventricosa 409
Sorosphaera wagensis 416
Spandelina subtilis 390
Streblospira minima 366
Triticites aculeatus 353
indefinitus 353
iohchensis 321
? jakshoensis 321
ortashensis 321
samarkensis 353
vetrennikovi 353
Trochammina brevicula 416
Turritellella regulata 416
Verneuilinoides kazanicus 417
Wanganella angusta 410
crassisepta 406
densa 406
Yangchienia (?) antoninae 376
Zarodella zhamoidai 409

Тип ГУБКИ

Lenica unica 2

Класс Строматопораты

Actinostroma barlykense 133
colymense 131
crassulaminatun 133
crassum 219
egregium 130
ignotum 131
inopinatum 130
intermedium 217
istokense 219
jurmanense 130
khondelense 133
krekovi 130
kuzbassicum 130
labechiiforme var. uralica 130
laskarevi 130
malcevi 132
malevskii 130
mamontovi 308
mamontovi var. plana 130
miraculum 221
mirum 131
moldavancevi 130
nicholsoni 221
pexisum 217
podolicum 217
regulare 130
rugosum 130
salairicum 307

samskiense 130
singulare 133
tenaicolumnum 130
tenuipalum 132
timanicum 276
toschemkense 130
uralicum 218
Amphipora aiaiskiensis 130
amplevesiculosis 133
batochatensis 130
intexta 131
karmakensis 131
krekovi 130
messerschmidti 130
pinguis 131
pinguis var. izylensis 131
spissa 131
uralensis 131
Anostylostroma krapotkini 133
sibiricum 133
Atelodictyon anadyrense 133
bargatzkyi 221
batalovense 133
curvus 133
incertum 221
lopatini 133
nekhoroshevi 220
nikitini 221
obliquus 133
pulchrum 220
ruginosum 133
tenuicellulosum 220
urazovense 133
Beatricea bacula 130
conica 130
conosimilis 130
inaequalis 133
mediupustulis 133
sibirica 130
tenuipunctata 130
tenuipustulis 133
tenuitextilis 217
undulatadirecta 130
vulgaris 131
Bullalodictyon patokense 221
Burgundia barremensis 131
Chalazodes sibiricum 131
Clathrocoilona abeona 308
intscherepense 219
solida 130
Clathrodictyon angusta 133
argentovskyi 130
artyschtense 130
boutovi 131
burmantovskiense 130
compactum 130
compositum 131
convictum 217
corrugare 132
cylindricum 130
glubokense 131
izylense 131
kotuiense 130
krekovi 130
lazutkini 130
livenskense 131
lozvense 130
mamelonse 132
nelynense 221
nicholsoni 130
nikiforovae 130
obscurum 130
ottykense 133
pissarevae 220
praetenerum 308
primordium 130
primordium var. grandis 131
pseudostriatellum 308
pustulatum 131
sajanicum 40
salairicum 217
sibiricum 130
spissum 131
tenerum 131
teplovkense 130
tortuosum 131
tschusovensis 307
tumulosum 131
tumulum 132
tunguskanum 131
tyžnovi 130
uralicum 130
ussvense 130
variabile 275
variabile var. vilvense 219
voronovi 131
yavorskyi 276
Clathrostroma implicitum 132
jukkense 133
nelynense 133
petschorense 132
tumulum 132
vodorezovi 132
Cryptophragmus gracilis 130
Cystostroma asiaticum 310
diversum 220
kozhimense 133
ordovikense 134
regulare 133
rarus 132
sarytchelekense 132
tortuosum 133
Ecclimadictyon schachriomonum 78
Ferestromatopora krupennikova 130
krupennikova var. talovensis 130
tyrganensis 130
Gerronostroma batschanese var.
salairica 130
batschcatensis 308
boutovi 130

concentrica 308
dragunovi 132
elegans 308
gromotuchense 131
juresanense 130
kitatense 132
komiense 132
nikitini 132
obliquum 131
obliquum var. recta 131
opimum 131
pesteriovense 131
porkhovense 131
regulare 132
schelonense 131
solomenense 131
sukhumense 310
tablikense 132
tomiense 130
undatum 132
uralense 132
uralicum 132
Hermatostroma abense 132
bonum 132
concinum 132
derzavini 219
dolica 30
episcopale var. talovense 219
flexuosum 130
kumpani 130
latum 130
mamelonse 130
omulevskense 131
porkhovense 131
rectum 130
roullieri 130
safonovi 130
sibirica 308
stellagerum 130
tikhii 130
tschernyschevi 130
undulatum 130
usitatum 131
vulgares 130
Idiostroma concentricum 221
cumulus 130
elegans 219
subtile 221
tschernyschevi 221
uralicum 130
Intexodictyon barlykense 133
copulatum 133
densum 220
khalfinae 220
perplexum 133
rectum 221
tenuitextilum 220
usitatum 221
Labechia aequalis 221
astroides 131
communis 133
condensa 130
cumularis 131
densocolumna 134
devonica 275
duplexicis 221
elegestica 198
frutelosa 133
fusta 130
golikovensis 131
irregularis 132
koltubensis 132
kudukensis 132
kurganensis 132
mirabilis 132
modica 131
mongodjarica 308
mutabilis 132
obscura 130
ordovikensis 134
radiosa 131
regularis 275
regularis var. kotuensis 131
regularis var. tuvensis 131
sibirica 130
sirtensis 221
socialis 132
tschalbygensis 132
tumulosa 130
tunguskensis 133
tuvensis 134
vaigatschense 131
variabilis 275
venusta 130
vodorezovi 131
yakovlevi var. tungusskana 130
Parallelopora actaeonis 221
auschkulensis 133
crassa 133
iljinskiensis 133
kolymensis 132
kozhimensis 133
parva 276
ponomarevi 132
stricta 133
typica 132
ulatauensis 132
urazovensis 133
vojvensis 132
volensis 276
Paramphipora acteoni 220
amfioni 221
ampluporoides 221
blokhini 130
composita 220
corrupta 221
devonica 131
difficilis 131
dilicida 131
directura 221

hanimedi 221
humulis 130
facies 130
grandis 220
laxeperforata 133
levis 130
maculosa 3
mediocris 221
minuta 130
mirabilis 130
obluta 221
peculiaris 221
perforata 131
raris 130
raritatis 130
rasilis 130
recta 130
tenuis 131
tomiensis 131
tschussovensis 130
vesiculosa 130
vojvensis 221
Pseudolabechia caucasica 131
convexa 131
gracilis 131
monstrum 131
tuberculata 130
Rosenella irregularis 131
miniarensis 275
mogudjarica 130
normalis 275
uralensis 131
Rosenellinella bisyllaba 222
venusta 221
Stachyodes condenseporoides 221
discludois 221
disparvesiculosa 133
glubokensis 131
gracilis var. kurnetskensis 131
inexplorata 133
insolita 133
multiplex 221
odinekensis 131
sagittula 133
singularis 132
radiata 132
tenuitextilis 133
tomiensis 131
tschernovi 220
tschernyschevi 220
tuberosa 133
venusta 132
Stromatocerium kouliki 132
miraculum 133
Stromatopora adakensis 133
adleri 130
aequalis 133
angulata 217
artyschtensis 130
aspectabilis 132
baskuskanensis 130
boiarschinovi 132
carteri var. devonica 130
carteri var. podolica 219
compacta 130
concentrica var. minima 130
convicta 219
cylindrica 131
czekanowskii 130
derzavini 218
difficilis 133
dybowskii 130
elegestica 198
enissejensis 133
fedorovi 130
flexuosa 130
fortuita 130
gliadenensis 132
grintschukensis 219
gurjevskensis 132
ivanovi 130
karaensis 132
kirgisica 218
lamellosa 217
lenensis 130
membrosa 131
minima 130
nices 130
obrutschevi 130
obscura 132
pellucida 130
pellucida var. artyschtensis 130
pulchra 130
radiata 221
ramulosa 130
ržonsnickii 130
ržonsnickii var. njuilensis 131
schelomensis 130
sequanensis 131
socialis 130
sokolensis 219
sphaeroidalis 276
sternuntura 130
tenuitextilis 130
tcherskii 130
tchihatcheffi 130
tenuilacunosa 130
tenuitextilis 131
tuberculata 217
tumulus 130
tuvensis 132
tynijaensis 130
typica var. dnestrensis 130
tyrganica 218
venukovi 217
vorkutensis 132
yakovlevi 132
Stromatoporella abensis 309
annularis 130
artyschtensis 130

basilii 309
batschatensis 309
boutovi 309
bractealis 130
brylkini 130
chomutinkensis 309
compostia 130
conpulata 130
convicta 309
devonica 309
gapeevi 309
insolita 309
irregularis 130
ivdeliensis 130
izylensis 131
kinensis 130
kiritschenkoi 130
kuznetskensis 309
loutougnini 308
loutougnini var. uralensis 130
mamelonsa 309
mamontoviensis 130
mirabilis 130
pankratovi 308
redrini 130
regularis 309
sniatkovi 308
strelensis 130
tchernyshevi 309
tchernyshevi var. kostenkovensis 309
tomiensis 131
tortuosa 130
tschernensis 130
tuberosa 130
turensis 217
tyrganensis 309
undata 309
ussowi 309
voltschensis 309
yegorovi 217
Stylodictyon vaigatschense 131
Synthetostroma crassum 133
opimum 133
timanicum 133
tumulum 133
ukhtense 133
Syringoporinus sokolovi 132
Syringostroma centrotum var. kirgisica 218
devonicum 130
fedorowi 218
foveolatum 130
geba 308
kielzeense 130
padalkoi 130
rugosum 131
salairense 130
sibiricum 130
sibiricum var. prima 130
sibiricum var. secunda 130
singulare 130
strahlenbergi 308
subtilis 132
tschichatschevi 308
tyrganense 130
Trupetostroma compositum 221
diversum 221
gallowayi 221
irregulare 221
junkense 220
krusseri 221
lecomptei 221
obesum 221
spatiosum 133
tschernyschevi 221
undatum 221
Vicinustachyodes laginensis 221
microporoides 221
mirabilis 132
perforata 132

Тип КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ

Класс Сцифозои

Camptostroma datsenkoi 23

Класс Коралловые полипы

Acanthophyllum nikolaevi 234
Acervularia sokolovi 155
Agetolites asiaticus 158
Alveolitella ramifera 282
tarejaensis 28
Alveolites hemisphericus 211
račkovskii 211
taimyrensis 283
Amplexizaphrentis concrescens 348
hastatus 348
Amplexocarinia delicata gigas 329
Antherolites hemiseptosus 169
Arcophyllum yakovlevi 233
Arcotophyllum minima 328
Aulacophyllum cylindricum 234
pepelaievi 234
prjmum 244
priscum 242
tabulatum 244
Axolasma implicatum 118
Axolithophyllum uchbulakense 329
Bethanyphyllum maximum 287
Billinsastraea novozemelica 244
Bothrophyllum samaraense 328
Bozdonia syringoporoides 159
Calostylis laevis 65
Camurophyllum camurum 244
Canadiphyllum spumosum 348
Caninophyllum grekae 328
Cantrilla andreevae 128
archalykia 65

Carcinophyllum gorskyi 347
proprium 347
Carinthiophyllum multicystatum 328
Ciliapora pitchiensis 215
Coenites inventus 284
Columnaria septosa var. major 117
Crassilasma digitiforme 65
Cyathoclisia carinata 347
Cylindrostylus giganteus 171
turkmensaicus var. fistulata 171
Cyrtophyllum anomalus 67
lambeiformis 117
laxum 117
orthis 117
Cystilasma arcticum 118
Cystiphylloides bulvankerae 244
corneum 244
oblitterum 244
originale 244
porfirjevi 235
Dagmaraephyllum patoki 346
Dictyofavosites terrae-novae 282
Digonophyllum bifurcum 244
reductum 244
Dinelasma gratum 128
Diplochone kozhimica 201
sachaninensis 244
Dnestrites expectatus 148
transitus 148
Emmonsia antica 283
taimyrica 283
Enygmophyllum fomichevi 345
Fasciphyllum carinoferum 244
oblongulum 244
Favistina rozmanae 128
Favosites alashensis 211
barrandei disciformis 283
breviseptatus 281
brodyensis 152
clarum leptotheichus 212
concavdabulatus 153
favosiformis var. multitabulata 152
favosus var. multiporosus 117
forbesi var. tuvaensis 211
hirsutus var. regularis 153
incrassatus 153
mikhnevichi 160
notabilis 152
orassimuralis 153
pactum 212
polaris 214
prominens 153
ramiferus 214
rectiformis 153
sachaninensis 284
shiriktensis 212
slolini 153
subtarejaensis 212
syvjuensis 214
undulatus var. filvus 153
venustus 282
(Sapporipora) favositoides var. biserialis 153
Gazimuria ildicanica 285
Clossophyllum improcerum 244
Gracilopora prima 284
Grypophyllum arcticum 235
paraayregatum 235
Heliolites crassimurus 160
lebedevae 211
Heliophyllum paramirabile 235
tcherkessovae 235
varioseptatum 286
Heliplasma dnestriensis 149
Implicophyllum aitalievi 209
Kenelasma sibiricum 128
Kodonophyllum angustum 118
Kolymopora antiqua 71
Kysilites tchiraensis 215
Laceripora minima 214
Lamellaeoporella superba 284
Lamellophyllum bitecum 65
Liardiphyllum cuneatus 348
longiseptatum 348
Lindstromia minima 285
Lithostrotion cystosum 348
rarecystosum 348
Loyolophyllum crassispinosum 233
originale 233
Lyopora nikitini 70
Mesofavosites djaxanensis 159
insuetus 153
obliquus var. anquilonalis 153
plicatomuralis 159
Mesosolenia solenoidea 213
Minussiella asiatica 232
beliakovi 232
kulagaiensis 232
solida 234
Multicarinophyllum multicarinatum 287
Multisolenia mutosa 169
uralica 213
Multithecopora arctica 348
Nardophyllum clarum 243
Neobrachyelasma altaica 209
Neokyphophyllum calcareum 287
Neomicroplasma dobrolyubovae 344
septata 344
Neospongophyllum multivesiculosum 235
Novactis alius 157
Nyctopora canaliculata 68
concavotabulata 68
convexotabulata 68
costata 68
granulomuralis 68
vulgaris 68
Okopites okopinensis 148
okopinensis uniformis 148
Pachyfavosites kozlowskii minima 212
Pachyphyllum ibergenseformis 286

Palaeofavosites amoenus 153
elegans 117
mirabilis 211
indubius 158
indubius var. zeravschanica 158
turukhanicus 117
turukhanicus var. multitabulatus 117
Palaeohalysites parallelus var. minor 66
tarejensiformis 66
tollinoides 66
Parastriatopora admirabile 214
multiseptosa 154
(?) paradoxa 214
sokolovi 154
spinosa 214
tcherkesovae 281
uralica 214
Pentaphyllum araxense 382
Plicatomurus aceleatus 159
Phaulactis deciduus 244
semaiophylloides 210
Proheliolites koskolensis 70
Propora cancellatiformis 117
conferta var. tunicata 117
conferta var. vetula 117
obrutschewi 70
Pseudomicroplasma bizonata 244
compacta 242
cylindrica 244
momentaria 242
parakuznetskiensis 233
polarica 244
Pseudopilophyllum elegestum 210
Pseudoplasmopora karaespensis 160
Pseudoroemeria atbashiensis 303
shiriktensis 303
Pseudouralinia gorskyi 343
Pseudozonophyllum elegans 242
eohalli 242
imulum 242
primitivum 242
Reimanelasma elegans 128
Rhabdotetradium rhomboidalis 69
? tessulatiformis 69
? tessulatus 69
vaigatschensis 69
Rhizophyllum mongolicum 286
Romingerella (?) dolgovskaja 199
(?) septata 199
Scynophyllum clavum 202
Sogdianophyllum crassiseptatum 65
Sokoloviella delicata 210
Spumaeolites sokolovi 155
Spongophyllum gemmatum 287
separatum 243
Squameofavosites abonormis 281
attenuatus 281
betjuensis 214
cribratus 282
dubatolovi decrescus 282
ignotus 290
introrsus 283
isfaraensis 212
fluvialis 283
kokshalensis 212
kuniakensis 212
mixtissimus 283
nexus 283
nobulosus 281
orbicularis 281
pressus 290
proprius 281
rupestris 283
Squameolites aksarlensis 160
Stenophyllum taimyricus 242
Stereoxylodes argutus 202
Streptelasma tesakovi 128
Striatopora anuyensiformis 199
magna 283
iriumskiana 283
zlobini 283
Stringophyllum admirabile 287
tchernychevi 233
Strombodes tuvensis 210
Sumsarophyllum ellipsoidum 65
Stylastreae columellata 348
taimyrica 348
Syringoheliolites contrarius 150
Syringolites (?) favositoides 282
Syringopora tungusica 117
tuvaensis 211
Syringoporinus aequabilis 170
Tabularia magnifica 242
Tabulophyllum ? grandis 347
paranormale 233
uimense 286
Taimyrophyllum colymensis 234
Tenuiphyllum crassum 210
Tetradium elegans 66
quadratum 66
subapertum 66
Thamnopora arctata 282
singularis 282
rigens 282
Thecia fedotovi 200
Thysanophyllum acystosum 348
Timania karatchatyrica 329
Tryplasma alterna 243
devoniana 286
Tschernowiphyllum podchemiensis 347
Waagenophyllum (Waagenophyllum)
orlensis 381
(Wenizelella) ussurica 381
Wentzelloides (Wentzelloides)
grandicolumellatus 381
primoricum 381
Yacutiopora minutissima 284
Yakutophyllum grande 330
elegans 330
pumibum 330

settedabanense 330
Zelophyllum seraphimae 209
Zmeinogorskia sagsayica 286
tareica 242
zaisanica 286
Zonophyllum breviculum 242
caecum 244
dierectum 244
iongiseptatum 244
septentrionarium 242

Тип КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ

Tucolandia vermeticus 17

Тип ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

Класс Трилобиты

Aceroproetus acer 162
Acidaspides borealis 35
entis 33
Acidaspidina plana 10
Acontheus limbatus 4
patens 14
Acrocephalaspis orientalis 15
Acrocephalina borealica 10
Agnostus captiosus 15
Aiaiaspis modesta 4
Aldanaspis recata 14
venusta 11
Aldonaia cylindrica 31
Alokustocare faceta 13
Amgaspidella elongata 36
limbata 36
Amgaspis brevis 36
medius 34
rudis 36
Amginoyyia elegans 34
Amphoton longus 36
Ampyx borealicus 50
depressus var. otradnica 50
nordicus 50
Ampyxina taimyrica 50
Anabaraspis tenuis 13
Anomocarina obscura 35
Anomocarioides divulgatus 16
novus 4
Aphelaspis (Eugonocare) soholti 29
(Labiostria) antarctica antarctica 29
(Proaulacopleura) cylindrica 29
Aplexura lepida 16
Archegonus (Phillibole ?) orientalis 335
Aristoharpis taimyricus 50
Basilicus khamrensis 79
Bathynotellus jershovi 28
Bathynotus anabarensis 8
Bathyuriscellus quadratus 36
Belovia calva 34
punctata 4
Binodaspis rara 36
Biolgina brevis 79
sibirica 80
Blackwelderia (?) flerens 15
Blandicephalus heritidji 29
Blountia (Mindicrusta) advena antarctica 29
Bolaspidina ? insignis 35
rotunda 4
Bonneterrina conica 4
(?) convexa 38
Botomella sukharichensis 13
Brassicicephalus jakuticus 11
planus 11
Bronteopsis nannus 49
Buitella buitensis 14
olenekensis 14
Bulaiaspis vologdini 34
Bumastus holei var. taimyrica 49
nordicus 49
sibiricus 80
taimyricus 49
Buttsia pinga 15
Caganaspis unica 74
Calliops kimi 72
taimyricus 50
Calymene kokbaitalensis 173
taimyrica 49
weberi 173
Calymenia whittingtoni 72
Calyptaulax breviocolus 58
Caphyra (?) kluevkaensis 48
Carinopyge ensifera 79
fracta 79
obscica 79
spinifera 50
Catuniella lauta 10
(?) monstruosa 16
Caulaspina vera 4
Cedarellus felix 15
Centropleura lumbata 26
Ceratevenkaspis borealicus 50
parnaicus 50
pentagonus 50
taimyricus 50
Ceraurinus biformis 79
borealicus 50
kluevkaensis 50
nordicus 50
taimyricus 50
Charaulaspis prima 13
Cheirurus quenstedti orientalis 172
Chondragraulos angustus 36
granulatus 36
(Atagmopleura) arcuata 36
convexa 36
flerovae 36
Chondranomocare bucculentum 14
eminens 36

tenuis 36
Chorbusulina bella 13
Conolichas acerbigranum 57
Coosia coreanica angulata 29
ignota 29
soholti 29
sulca 29
? crassa 4
sukhanica 35
Corynexochus tersus 11
Crotalocephalus gibbus hexaspinus 172
(Crotalocephalina) pseudoexpansus 255
Cybele andreevae 80
Cyclolorenzella granulata 44
Cyclopagnostus asper 15
orientalis 15
Cyrtosymbole (Cyrtosymbole) granulifera 228
Dalmanites saryarkensis 172
septicostatus 173
Dechenellurus granifer 172
parvus 172
profusus 173
ursus 172
Diceratocephalina miranda 80
Dicranogmus gregalis 129
Dicranopeltis eopolytomus 72
Doropyge olenekensis 11
Edelsteinaspis plana 36
Ehmania shackletonia 27
Elrathia alexandrovi 35
Encrinuroides waigatschensis 56
Encrinurus creber 80
globosus 80
inusitatus 161
Eoacidasis amplicauda 16
Eobrenteus norilskensis 80
Eophacops nanus 80
Eoptychoporia manifesta 13
Eorobergia inferius 55
summa 55
Eospencia amgensis 36
Erbiopsis (?) parvus 13
Erkelina scita 13
Ermanella unicornis 79
Evenkaspis nikiforovae 80
norilskiensis 50
tchunensis 80
Forchhammeria acuta 4
dzhelindensis 31
normalis 4
picta 26
Formosocephalus savitzkyi 4
Gaphuraspis inflata 36
(?) levis 36
Garbiella urvantzevi 16
Glaphurina trapezialis 59
Glyptagnostotes elegans 15
Goldillaenoides taimyricus 49
Granularia grandis 36
Granulatagnostus granulatus 73
Harataspis ? lubrica 4
Harpes pansa 172
Hartshillia clivosa 14
pusilla 14
spinosa 16
taimyrica 14
Hebediscus granulosus 13
longus 13
Homotelus lenaensis 79
pregradnicus 48
taimyricus 48
Hypagnostus facetus 4
Idiomesus hantaiensis 16
Inikanella gracilis 11
Irinia fida 4
Irvingella norilica 16
perfecta 39
Isalaux bifolius 79
Isoteloides homalonotoides var. taimyrica 48
kimmswickensis var. nordica 48
Isotelus maximus sibiricus 80
Iwayaspis caelata 16
curta 16
longa 16
ventosa 16
Yakutus exiguus 36
priscus 13
Yudomia mattajensis 13
(?) spinosa 13
tera 11
Judomiella heba 13
Kaninia quadrata 10
Kazelia norilica 16
Koldiniella convexa 10
orbiculata 35
Kolpura aculeata 36
Komaspidella rara 16
Kontrastina binodosa 4
Kootenia amgensis 36
moori 13
ontoensis 36
Kooteniella acuta 36
mutabilis 36
Koptura lata 36
oblonga 36
Kuknamkites aciferus 12
insuetus 12
levis 12
quadratus 12
(?) tuberculatus 36
virgatus 34
Kuljumbina grandis 10
Kuraspis inops 4
obscura 35
similis 35
Ladadiscus granulatus 24
Lermontovia elegans 13
tumida 13

Linguagnostus sibiricus 4
Liostracus atlassovi 4
burgalensis 4
orientalis 11
pensus 4
suetus 4
suntensis 4
tenkensis 4
Lobopyge (Lobopyge) brevis 173
limbata 173
longiaxis 173
Lonchocephalus (?) vetus 35
Lonchodomas parvulus 58
rostratus var. taimyrica 50
triangulum 58
Lorenzella (?) prima 10
Lyriaspis antarctica 27
Maiaspis inflata 35
mirabilis 34
spinosa 14
Menomonia asiatica 16
Metanomocare brussense 16
Morotakos morkokensis 80
(?) nordicus 50
zlobini 50
Mucronaspis kolymica 129
Namanoia incerta 36
Neogriffithides almensis 413
gemmellaroi 413
gemmellaroi var. crimensis 413
ismaulensis 413
(Phillipsia) pulchella var. mussemensis 413
Neopagetina orbiculata 13
venusta 13
Norwoodia quadrangularis 29
Oculeus parvulus 4
Odontochile arcuata 173
batymarginata 173
bifurcata 173
carinata 173
crassa 172
frontale 173
idonea 173
kiikbaica 173
pristina 173
ulrichiasiatica 173
(Pacifina) kaplune 255
Olenoides laengatus 36
Olentella illustris 15
Olenus proximus 15
Onchonotellus conusoides 16
siligiricus 31
tchecurensis 15
Ontoella triangulata 36
Orloviella caucasica 38
(?) trapezoidalis 38
Oryctocara ovata 35
Oryctocephalites incertus 35
Oructocephalops frischenfeldi 24
frischenfeldi granulatus 31
Otarion kiikbaicum 173
simplex 72
Paciphocops (Viaphocops) mongolicus 254
Pagetides sibiricus 9
sibiricus var. calvus 9
spinosus 9
Pagetiellus anabarus 13
pervulgatus 13
porrectus 13
ultimus 13
Parabolina perlata 15
Parabolinella (?) fortunata 15
Parabolinina edita 15
Paracoosia pulchra 35
Paradoxides (Eccaparadoxides) subenormis 31
Paraorlovia sequens 34
torosa 4
Paraphillipsia karpinskyi 413
karpinskyi var. weberi 413
kussicum 413
netschaewi 413
tauricum 413
tauricum var. anfensis 413
Parapliomera njuensis 8
Parapoliella sulcata 36
Pedinocephalina divulgata 10
Pegelina maja 4
Permoproetus beschui 413
gortanii 413
teschi 413
Peronopsis bulkurensis 4
Pesaia (?) perfida 35
Phacops acutus 173
angulatus 173
dentatus 173
fecundus orientalis 173
logani balchashensis 173
? macropygus 80
praepipa 173
pustulatus 173
? rhinoceras 173
saryarkensis 173
(Phacops) malosalairicus 288
Pharostoma inermis 72
Phillipsia aliensis 413
kojensis 413
nafensis 413
Plakhinella quadrata 14
Plethopeltides magnus 80
Plicatolina lucida 15
perlata 15
Plimeroides defensus 52
Pliomerops unguis 79
weberi 79
Praedechenella kasachstanica 173
Prantlia polita 289
Proasaphicus ? insuetus 4
Proceratopyge captiosa 15

portentosa 15
tenuita 15
Prohedinia sibirica 25
Proetus (?) baltensis 413
enodus 79
(?) girtyi 413
Protagraulos priscus gribovae 30
priscus novozemelica 30
subpiscus 30
Protolenus jakutensis 13
Pseudagnostus quadratus 15
Pseudoacrocephalites ilgaensis 80
viluensis 80
Pseudoeteraspis aldanensis 36
Pseudoliostracus torosus 4
Pseudonericella pendula 4
Pseudonomocarina aogiformis 36
horrida 36
obunca 11
parva 36
plana 34
Pseudophillipsia borissiaki 413
borissiaki var. martensis 413
elegans var. ibrischensis 413
mustafensis 413
mustafensis var. sarabansis 413
Pseudoproetus bellus 80
tertius 80
Pseudosphaerexochus asiaticus 72
Ptychoparia magna 35
Radiolichas (?) asiaticus 254
Raymondella nordica 50
Reedops almaatensis 255
Rina longa 38
Sacha alata 4
Saryarkella radiata 255
Scapriscutellum boreum 172
miloradovitchi 172
Schistocephalus antiquus 36
juvenis 36
Schizoproetus borealis 172
Schmalenseeia spinulosa 11
Schoriella lata 10
optata 35
Scutellum alutaceum arcticum 253
michnevitchi 173
taimyricum 49
(Scutellum) haidingeri indefensum 172
Solenopleura elgensis 4
(?) lecta 4
raduginiformis 38
Sphaerexochus taimyricus 50
Stenopareia angulata 80
borealica 40
jugorskii 59
Synchomalonotus sulcatus 72
Tagenarella eniseica 16
Taimyraspis taimyrica 48
Tankhella aspera 4
devexa 36
Taynaella insolita 289
Tchabdania tchupachini 4
Tcherkesovae prima 289
Tetralichas taimyricus 49
Thysanopeltella tcherkessovae 253
Tomagnistus clarus 4
Toxotis (?) venustus 16
Triangulaspis granulosus 7
lermontovae 7
rarus 7
Tropidocare borealis 289
Uralichas schachriomonica 72
Usumunaspis convexa 13
Vega lecta 4
Vogdesia nordica 48
Warburgella angusta 289
dispersa 289
yolkini 289

Класс Меростомовые

Paleolimulus jakovlevi 367
Pterygotus dzharanensis 341

Класс Ракообразные

Acanthoscapha alata 138
subnavicula 138
Aechmina subcuspidata 225
Alveolella festa 144
nadinae 141
Baschkirina arta 225
longa 138
Beyrichia (Simplicibeyrichia) bispina 142
praeglobifera 141
Bingeria arctica 142
bispina 144
microrete 143
Bispinitia cymbiforme 141
uralica 136
Carbonita lipetzkensis 239
Cavellina bisulcifera 144
dubia 141
effecta 144
fabacea 139
idonea 138
Clavofabellina abunda miscella 227
attenuata 227
? dorsicostata 227
Coryellina imitatrix 239
Costokloedenia bicostata 227
Cryptophyllus triangulus 225
Cytherellina amaciata 144
effecta 144
Dizygopleura mira 225
? terra 142
Dolgitia triangula 141
Eashmidtella flexilis 41
Eocloedenia bacatiformis 143

punctata 142
subbacata 141
Eucloedenella clivula 144
? dizygopleuroides 141
partibile 139
posterioalta 141
Gibberella pretiosa 141
Hallatia infida 139
Hatangeus ambiquus 139
armatus 139
foveatus 139
Healdia ? obtusa 225
unicornis 225
Healdianella mutica 225
Herrmanina convexa 141
hebes 141
immensa 141
insignis 141
levitskii 137
moderata 223
orbiculata 141
Hexophthalmoides mirus 142
Illativella clivosa 239
Impostor pellax 239
Indivisia variolata 239
Ispharaella ispharaensis 138
Kiaeria alata 137
elegans 141
Kielciella sulcata 227
Kloedenia ? kozhimica 227
Leiocyamus complanatus 139
variabilis 141
Leperditia dorsocornuta 141
extrema 141
marinae 141
planula 223
prominetis 225
quinqueangulata 141
? submarinae 142
Longicula obliqua 41
Marginia costatiformis 239
Medianella turgida 41
Microcheilinella acuta 140
acutafiniformis 140
fabaria 140
moderata 138
mukschensis 140
nitida 138
planodorsa 140
subvariolaris 140
trapeziformis 140
Moierina tringula 138
Mollerita crassa 224
egorovi 223
nana 223
obliqua 223
quadrigibbera
rotunda 223
tenuis 224
Norilskinia binodosa 139
cuspidata 139
norilica 139
Nyhamnella ? gigantea 141
Oecematobolbina porrecta 41
Opabinia norilica 7
Opisthoplax guratus 225
subcompressa 225
Pachydomella anastasijae 139
Petschorocaris kozhimensis 397
Phlyctiscapha podolica 225
Platybolbina angustimarginata 143
Podolibolbina podolica 41
Poloniella alexanderi 226
cornuta 226
costata 226
deplanata 226
jucunda 226
margaritae 226
rara 226
Ponderodictya mirabilis 225
Pribylites tumefactus 144
Primitiopsella multifoveata 227
Pseudoraeylla angulare 144
ellipsoidea 144
trapeziale 144
Pullvillites laevis 41
planolateralis 41
famenniensis 239
Rectella ? proposita 41
Richina biconica 225
propria 225
varia 225
Scaldianella novosemelica 142
Schrenkia tuberculata 141
Scipionis armatus 144
? praecox 141
Semilukiella cosharica 239
Sigmobolbina ? cuneata 41
Signetopsis cardinata 139
lumbata 141
Silenis modestus 141
sulcatus 145
? trapeziformis 41
Simplicithlipsa deplanata 145
Tenebrion ? devonicus 239
Thlipsobellum terrenum 144
Thlipsura cognata 145
serotina 145
Thlipsurellina occlusa 145
Thlipsuritia aperta 145
umbonata 145
Thrallella bialveolata 139
Tollita acuta 141
minima 141
minuta 141
simplex 141
Tubulibairaia tumida 139
Ulrichia elegans 225
obliqua 225
Welleriella ventriumbonata 227

Youngiella grasiensis 239

Тип МОЛЛЮСКИ

Класс Брюхоногие

Amaurotoma ? kisilkiensis 333
? komishani 333
? shabarovi 333
Anomphalus ? planus 333
rotulensis 333
Baylea veberi 333
Bellerophon (?) sibirica 383
sibiricum 60
kharaulakhense 383
(Bellerophon) neocostatus 392
(Pharkidonotus) uralicus 329
Bucanella gurjevskensis 236
Bucanopsis carinifera salairica 236
Callispira (?) conulus 334
? nana 334
? volgini 334
Cerithoides permicum 333
Dickinsiella gigantea 384
Euphemites permicus 392
Euphemitopsis granosus 392
Ferganispira gradussiformis 333
Glabrocingulum ferganicum 333
Glyphodeta karatshatyrensis 333
Goniasma ferganica 333
lasallensis vulgaris 333
Hasperiella ? tadchikiana 333
Hemizyga ? abnormalis 334
particularis 334
Hypsipleura ? carbonica 334
Karatshatyrica nana 333
Knightites uralicus 392
Kokenospira kasachstanica 81
Loxonema laeve 334
Microdoma gracile 333
Modestospira (?) plicata 81
Murchisonia (?) vjalovi 333
(Hormotoma ?) sergunkovae 333
Naticopsis (Naticopsis) conica 334
plebeja 334
protracta 334
(Jedria) ventricoformis 334
Neilsonia ispharensis 333
Omulevia oradovskaiae 61
Orthonema frequensis 334
tentaculitoides 334
turris 334
Palaeozygopleura columnaris 334
ferganica 334
gracilis 334
gradata 334
hemizygoides 334
irregularis 334
knighti 334
kushnarae 334
retroflexa 334
rugosocostata 334
variabilis 334
veberi 334
Paragoniozona asiatica 333
Paramaclurites gravis 61
Permoconcha ferganica 333
Platyceras (Platyceras) mitkovense 257
nieczlavense 257
pararobustum 257
subnescium 257
tainaense 257
Raramaclurites ovalis 61
Retispira reticulata 392
Rhineoderma ? ferganica 333
venustiformis 333
Shansiella (Shansiella ?) tuberculata 333
Sphaerodoma commune 334
ferganense 334
kisilkiense 334
obtusatum 334
veberi 334
Stegocoelia ? diversicostata 333
? kirhisica 333
(Hypergonia) ambiqua 333
(Stegocoelia) bella 333
duplicosta 333
elegans 333
minima 333
minita 333
netschajewi 333
(Taosia) orientalis 333
yini 333
(Vebericochlis) maclayi 333
Stephanozyga (?) obtusa 334
Straparollus (Euomphalus) marginatiformis 333
Straparollus (Straparollus ?) ornatus 333
subpermianus 392
Strobeus arulatus sibiricus 236
Tetranota dulankarensis 81
Trachydomia ferganica 334
parva 334
stuckenbergi 334
subhorizontalis 334
Tremanotus akdombaki 81
Tropidodiscus pseudosecans 81
Turbonellina orientalis 333
Yunnania romanovskyi 333
semigranulosa 333

Класс Лопатоногие

Laevidentalium (?) komiensis 383
(?) wymensis 383

Класс Двустворчатые моллюски

Allorisma komiensis gigantea 383
Angarodon repentinum 355

Anthraconauta angusta 356
arta 356
guttaeformis 356
lita 356
magnoideae 356
obtusangula 356
opima 356
ornata 389
patelliforma 356
paucula 356
pyriformis 356
quadrata 356
retis 356
Astartella gigantea 395
omolonica 394
Atomodesma bicarinata 394
licharewi 394
menneri 384
minima 394
paichoica 394
pogorevitschi 394
sartangensis 394
stepanovi 394
? tenuistriata 394
Augea (?) discordia 355
Aviculopecten nikolaevi 394
scheremetus 394
tompo 394
Aiculopinna koinensis 383
netschajewiformis 383
(?) sibirica 383
sojanensis 383
stapanovi 383
Claraia caucasica 385
Conocardium ? halmerjus 394
Cypricardella petschorica 394
Cypricardinia borealica 394
Detopecten barchatovae 394
Edmondia maslennikovi 383
omolonica 394
sibirica 383
(?) wymensis 383
Euchondria vorutica 394
Fasciculoconcha ascidiiformis 394
Kinerkaella arctica 389
Kolymia (?) lenae 383
nebulae 383
pergamenti 394
(?) permiana 383
Leptodesma (Leiopteria) synjensis 249
Liebea vaengensis 383
Lima (?) formosa 388
Megadesmus borealis 394
dembskajea 394
Microdontella (?) pilula 389
Modiolus ellipticus 394
magnus 394
Mrassiella animosa 355
indigena 355
larga 355
minusinica 356
perfidae 355
sincera 355
Myalina flexuosa 394
Myonia (Myonia) orulganica 394
Naiadites certus 355
Netschajewia kulogorae 396
(?) sibirica 383
Nuculana undosa 394
Palaeocosmomya omoloniformica 394
Palaeolima afanasievi 394
Palaeoneilo arctica 393
Parallelodon marinum 388
shachtauensis 395
uralicus 394
Pecten (Aequipecten) komiensis 383
(Pseudamussium) vaengensis 383
Pentagrammysia rogovica 394
Pernopecten vadegensis 393
Pernophorus angustus 393
Polidevcia wymensis 383
Praeundulomya dibica 394
leonidi 394
Prothyris (Prothyris) cilindricus 394
Pseudomonotis pinegensis 383
Ragozina dembskajae 394
Sanguinolites ? bulkurensis 394
lenae 383
lukjanovae 394
sibirica 383
Septimyalina sultanaevi 394
Scaphellina praeobscurus 394
Schizodus licharewi 383
Solemya (Janeia) petschorica 394
solikamica 393
Solenomorpha kogimica 394
Streblochondria kulojensis 383
? mira 394
Streblopteria bella 394
Taimyria norilica 389
Tanaodon litvini 248
Vacunella (?) novosemelica 393
petschorica 394
Verchojanogrammysia saphromovi 394
Vorkutella dembskaja 394
Wilkingia androsovi 394
jakovlevi 395

Класс Головоногие

Actinoceras arbakutchense 46
kusmovkense 46
(?) problematicum 46
Albertoceras amplicameratum 46
Alpenoceras cruglovi 245
Anthoceras angarense 45
bajkitense 45
sibiricum 46
Archiacoceras rarum 246

Armenoceras evenkense 46
gurjevskense 46
lenaense 46
sibiricum 46
solenense 46
stolbovense 46
Bajkaloceras angarense 46
rozhkovense 46
Catoraphiceras carpyschevi 46
Clarkoceras angarense 46
Cyclendoceras viluense 46
Cycloceras novosemelicum 245
Cyrtactinoceras kolymense 47
Danaoceras crassum 246
Deiroceras kolymense 47
Ellesmeroceras tchunense 46
Ellinoceras septicurvatum 45
Endoceras angarense 46
kulumbekense 46
mangaseense 46
njuense 46
rozhkovense 46
tytchanense 46
viluense 46
Eothinoceras marchense 45
Evencoceras angarense 45
rozhcovense 45
Halloceras eifelense 245
torulosum 246
Hemibeloitoceras ellipsoidale 46
ellipsoidale nujense 46
Hercoceras aculeatum 246
Homoadelphoceras valnevense 245
Icriodus taimyricus 246
Intejoceras angarense 45
Kawasakiceras boreale 46
Kokujoceras anomalum 46
depressum 46
simmetricum 46
Kotoceras indigirkense 47
stolbovense 46
Kutorgoceras compressum 46
Lobendoceras asiaticum 46
Magadanoceras yasatschnense 47
Manchuroceras asiaticum 46
Mcqueenoceras ? chantajkense 46
Metactinoceras boreale 46
conditum 46
enisseense 46
siphoexcentricum 46
tchunense 46
Michelinoceras omulevskense 47
Mixosiphonoceras boreale 245
Mysterioceras tunguskense 46
Nathoceras russanovi 245
Ormoceras anomalum 46
kusmovkense 46
tunguskense 46
Padunoceras rugosaeforme 45
Panderodus devonicus 246
Paranoceras subalewskyanum var. transalayensis 414
Plagiotomoceras calvicense 245
Proterocameroceras bajkitense 46
delgejense 46
tunguskense 46
vichorevense 46
Protocycloceras krivolukense 46
mancum 46
Richardsonoceras nikiforovae 46
Rossicoceras kolymense 47
njuense 46
Rutoceras parvulum 246
Sactoceras artassense 46
stolbovense 46
Stereoplasmocerina pseudoseptata 47
Stolbovoceras boreale 46
Talassoceras kumyschtagense 45
Tallinoceras lasnamaense 45
Tarphyceras (?) excentricum 46
Tofangoceras kolymika 47
omulevka 47
submarginale 47
tunguskense 46
Tripleuroceras alferovi 245
Trochoceras ? chekandiense 47
Tunguskoceras centrale 46
sifoexcentricum 46
stolbovense 46
viluense 46
Vaginoceras sibiricum 46
ventrolobatum 46
Valcouroceras yasatschnense 47

Класс Тентакулиты

Costatulites abnormis 147
corniformis 147
homogenus 147
magnus 51
Echlotheimites reticulatus 147
Evenkyites rarus 147
Tentaculites (?) erassus 230
excellens 230
formalis 230
mitkevensis 230
Tiverites finitimus 231
polymorphus 231
Turmalites duplanullatus 229

Тип МШАНКИ

Amplexopora (?) minusinensis 304
simplicissima 177
subseptosa 178
Anaphragma vetustum 82
Anomalatoechus elegestica 177
Atactotoechus simplex 262
Batostoma sibirica 304

Batostomella (?) irregularis 304
parva 304
Ceramopora magna 177
Chasmotoporella tolmatchovensis 88
Clathropora sibirica 216
Cyclotrypa laminataformis 265
Cyphotrypa alexandrae 177
verae 177
Dekayia edelsteini 304
Dianulites janischewskyi 82
maculatus 82
magnicellularis 82
multimesoporicus 82
Diplotrypa petropolitana 82
Dittopora ramosa 82
Eidotrypa vasilievskiji 304
Eosemicoscinium burultobense 272
laticarinatum 272
tatjanae 272
Eridotrypa acifera 177
bondarevi 85
granuliformis 177
heteromera 178
versa 177
voroniensis 189
Esthoniopora clivosa 82
Esthonioporella crassimuralis 82
Fenestella alapaevskensis 339
albidiformis 339
aridula 412
balaensis 272
bidentata 339
compressa var. uralensis 339
longitorosa 272
mariae 412
membranaceaformis 339
mikheevi 339
ornata var. postrobusta 412
vischerensis var. gamovica 412
Fistulacanta acerosa 178
araaegensis 178
clausa 178
Fistulipora altaja 84
angustannula 261
apiata 261
grandibullata 265
multilamellataformis 264
nordica 261
nordica microalveolaris 261
subincerta 177
tarejaensis 261
tarejaensis carinata 261
Fistuliramus cyclotrypaeformis 261
Hallopora abnormis 82
Hemiphragma pitchishuensis 178
? tuberculata 85
Hemitrypa minima 272
Hennigopora pseudoflorida 178
Heterotrypa yakovlevi 304
yakovlevi var. palmipedalis 304
Hexaporites constellariformis 89
Homotrypa certa 83
dissimelaris 83
egregia 83
formosa 117
Homotrypella elenae 83
(?) flexuosa 83
subnonnulum 83
tumulosa mugurica 83
Leptotrypa ordinaria 262
saklaninensis 265
tubuliformis 304
Lioclema abacanensis 304
aciculata 179
eoexplanatum 178
explanodeum 178
spineum var. orbicularis 82
subasperum 179
waschurovae 188
Medisemicoscinium perelegantum 272
Mesotrypa bystrowi 82
bystrowi var. tuberculata 82
excentrica 82
volchovensis 82
volchovensis var. torosa 82
Mitoclemina rhombica 91
Monticulipora alashensis 178
elata 83
Monticuliporella lessnikovae 82
Monotrypa helenae 82
Moyerella isfaraensis 188
tjanshanica 188
Nekhorosheviella cribrosa 82
? silurica 178
Nicholsonella arborea 82
nelidovi 52
papillaris 82
rotundicellularis 82
rotundicellularis var. duplex 82
Orbignyella variabile 188
Orbipora hexagonalis 85
Ottoseetaxis devonicus 261
Phaenopora gregaria 216
kljuevskensis 87
minutissimaeformis 87
transenna 216
Plasopora insularis var. esthonica 82
juvenalis 178
propria 178
Polypora biarmica var. pluscula 412
bicarinata 272
kulikovi 412
pluriformis 412
sargaensis 412
sargaensis var. magnotuberculata 412
sargaensis var. prodigiosa 412
sargaensis var. visenda 412
Praesemicoscinium parvulum 272
spicatum 272
Profustulipora (?) microcellularis 178

(?) silurica 177
Ptilopora rara 272
Quadrisemicoscinium fungiforme 272
Reteporina podgorniensis 263
Rhinidictya alata 86
maculata 86
Rhombopora leptoclada 261
Saffordotaxis gracilis 264
Semicoscinium mimutum 188
(?) portentosum 272
praestriatum 261
Septopora weberi var. uralica 339
Spatiopora teres 216
Stigmatella buchtarmensis 84
singulare 177
Strictoporella rigida tajmyrica 90
Trematella (?) macrospina 304
Unitrypa balchashensis 272
rjabinini 187

Тип БРАХИОПОДЫ

Acanthoplecta akkudukensis 316
kirgisica 316
zangensis 316
Acculina villosa 95
Acrospirifer pseudomurchisoni 258
Adensu mostratum 110
Admixtella orientalis 113
Alifera zabaikalica 379
Alispira (?) deplanata 197
? rotundata 193
Alimbella armata 42
armata pagaensis 42
Altorthis kinderlensis 42
Ambardella anabarensis 1
Ambocoelia praecox 194
Ampyrella clavata 44
? Anaotambonites aktasensis 93
Anastrophia bedrovi 195
(Grayina) magnifica 194
Ancistrorhyncha modesta 98
prisca 98
Angarella laevis 52
plana 52
Anidanthus megensis 402
Anoptambonites orientalis 107
Antiquatonia aktasensis 93
tianschanensis 316
Apatobolus plicatus 106
Archaeorthis opima 93
(?) puerulus 42
Argella pirum 175
Asymmetrochonetes proliferus 194
Atrypa losvensis 176
nieczlawiensis 194
reticularia dzwinogrodensis 194
reticularia gravis 195
subarachnae 190
tajnensis 194
Atrypella camelina 176
subrecta 176
Atrypinella pseudogranulifera 176
Aulie convexa 93
Avonia tekesensis 316
Bajanhongorella variabilis 93
Balakhonia licharewi 379
? moldotooensis 316
Bathymyonia barabaschensis 387
nevadensis 387
ussurica 387
Bellimurina sibirica 111
? paucicostata 111
Biconostrophia kabaniensis 300
sinelnikovaensis 30
Bicuspina attrita 109
Billinsella akbulakensis 42
Bimuria longa 53
Brachythyrina carskii 370
zabaicalica 379
Brachythyris orulganicus 354
praeufensis 354
Brachyzya pentameroides 194
Brevilamnulella undatiformis 114
Bulentella kirgisica 316
Bumuria triquetra 93
Burovia selanderensis 415
Buxtonia (?) mirabilis 326
Camarotoechia dolium 370
mergensis 379
Cambrotrophia turukensis 1
Camerella praestens 93
Camerisma rasililaterensis 354
Cancrinella grandis 402
magna 401
multicostata 401
multicostata var. inconvexa 401
ostrogensis 379
Carolinites spinosus 44
Chile mirabilis 22
Chonetes baschkiricus 316
karakiensis 316
Chonetipustula bejdensis 306
Choristites onegaensis 338
Christiania egregia 109
tortuosa 105
Clarkella sokolyna 52
testudo 18
Cleiothyridina tschironensis 379
Clorinda garreti novosemelica 259
pseudolinguifera 194
undata kolymica 197
Conotreta apicalis monstrata 106
Cortezorthis valnevensis 299
Cranaena (Asiacrinaena) koldarensis 240
Craspidelia tata 105
Cristicoma sincera 106
Cuspidatella cuspidata 260

Cymostrophia (?) auriculata 258
Cyrtina praecedens 194
Cystinoides ajica 306
Dactylotreta solitaria 29
Dalejina frequens 194
Dalejodiscus minor kazachstanica 240
Delthyris besobensis 240
Desquamatia borysi 306
Devonaria zeuschneri archensis 306
Dictyoclostus smirnovi 316
Didymelasma ? incerta 115
Didymothyris plicatella 182
Diraphora simplex 20
Discomyorthis musculosa asiagenes 258
Dmitria subrotunda 296
Dnestrina gutta 192
Dolerorthis ? alaica 266
expressa 107
intermedius 96
tanta 184
Dorytreta insignis 93
Dubaria tenera 193
Echinaria bereensis 379
Echinoconchus (Karavankina) sonculensis 316
Ectenoglosa sorbulakensis 107
Engenella amakensis 1
sibirica 1
Eoanastrophia extenuata 93
primordialis 113
Eodalmanella extera 109
subita 93
Eodevonaria extrema 258
Eodinobolus transversus 96
Eomarginifera schartimiensis 352
stepanovi 352
Eoplectodonta hirnantensis 104
nesnakomkaensis 104
(Eoplectodonta) semirugata paucicostella 113
Eoorthis norilensis 1
Eospirifer (?) schidertensis 151
Espella kazachstanica 195
Esilia tchetvericovae 94
Euritreta kendyktassica 106
Euroatrypa kolymica 99
suspecta 99
tajmyrica 99
Eurytreta discors 6
evanda 6
(?) exigua
sublata 6
Evenkorhynchia dichotomians evenkensis 111
dulkumensis 111
tenuicostata 111
Experilingula divulgata 5
Fascicoma obscura 106
Fluctuaria neoundata 337
Gacina ? binata 260
Gigantoproductus protvensis taimyrica 325
sonculensis 316
tjulekensis 316
tujucsuensis 316
tulensiformis 336
Gipidula animus 190
Gislasia miror 387
Gladiostrophia verneuili 258
Glassina dissecta 180
pentagona 180
usitata 180
Glyptomena onerosa 107
Glyptorthis (?) bestamaki 93
Greenfieldia uberis 180
uberis ampla 180
uberis tanta 180, 182
uberis uberis 182
Günnarella gigantea 113
Hemitoechia ? bieniaszi 194
distincta 184
omirovi 197
serrata 184
Howellella angustiplicata angustiplicata 194
angustiplicata zaleszczykiensis 194
grandis 183
laeviplicata 194
latisinuata 194
orphana 194
Howellites wesenbergensis 100
Hustedia longirostris 387
Hyattidina ? acutisummitatus 193
lentiforme 197
Imbricata lessnikovae 42
Inflatia kirgisica 316
Ingria malinovensis 44
Iphidella alimbetica 42
Iridistrophia praeumbracula 194
Ishimia sumsarica 113
Issedonia procera 106
spinosa 106
Isophragma imperator 107
orientale 44
princeps 105
Isopoma isiliense 274
Isorthis czajnochai 194
Ivanothyris subgrandis 240
Jakutoproductus maslennikovi 379
Janius ? innatus 298
Junnanella ericksoni polaris 294
Junnanellina karina 294
Kadraliproductus asiaticus 316
Kajnaria derupta 93
Karbous delaleus 260
Kassinella globosa 54
Kitakamithyris baschkiricus 337
tutchultuensis 379
Kochiproductus saajagensis 401
Krotovia yasachnensis 336

Leiorhynchus grandis 306
transversus 379
Lenatoechia elegans nana 197
? prodigiosa 197
Lepidocycloides indivisus 115
indivisus striatus 115
nana 115
Leptellina conferta 109
seletensis 92
Leptodus kaluzinensis 387
Leptostrophia (?) aksarlyensis 195
Levitusia praehumerosa 316
Linoproductus auritus 401
niigaensis 325
praelineatus 316
Liorhynchus depressus 274
Lissatrypa caudata 190
compressaformis 176
leprosa 194
jucunda 197
philomelaformis 176
Lissostrophia amazarica 258
inermis 258
Ljudmilispirifer kabanijensis 298
latihuneruis 298
voroninensis 298
Lonchodomas eximius 44
Lurgiticoma singularis 106
Maakina paucirugosa 112
viluensis 112
Machaeraria althi 194
nalivkini 240
Macrocoelia insolita 95
Malinaspis tuvaensis 44
Malinella tavelensis 43
Marginata kaindensis 316
uchbulakensis 316
Marginifera migai 325
Mariaspirifer dolganensis 302
Mauispirifer gosselleti kazachstanensis 240
Medessia uralica 42
Meekella pacifica 387
Megachonetes kaindensis 316
Megousia pobedensis 387
Meifodia recta alta 96
Merista kazachuca 195
wisniowskii 194
Meristella plena 185
Meristina bilobata 181
hatanzeica 181
Mesodouvillina ? dzwinogrodensis 194
subinterstrialis seretensis 194
subinterstrialis subinterstrialis 194
Mesoleptostrophia (Paraleptostrophia)
lepsensis 240
Mimella panna tchukotica 103
Mirilingula mutabilis 5
Mormophynchus wieniukowi 194
Muirwoodia vorcutensis 401
Multispinula parvula 106
Munericoma electa 106
ornata 106
Naukat proprium 22
Neospirifer bereensis 379
bondarevi 369
granewaldtianus 352
sinuatoplicatus 336
Nicolella strasburgensis 113
Nisusia alaica 22
Nordotoechia tumida 295
Notiobolus tenuis 19
Notoparmella amurensis 258
Nucleospira agadyrensis 195
asiatica 191
robusta 194
Obolus rebrovi 32
ruchini 32
Ocnerorthis lopatini 1
Oepikina rugosa 95
Oepikites koltchanovi 32
macilentus 32
Oina rotunda 22
Oligorhyncha (?) mica 93
Opsiconidion minor 273
Orthambonites plana 53
rhaitensis 95
tuloica 43
tuvensis 43
Orulgania einori 351
lata 379
naumovi 351
verhotomica gunbiniana 379
Ovidiella plana 93
Oroplecia acutangula 53
asiatica 111
njukensis 43
Palaeostrophia angulata 18
fibrillosa 18
tecta 18
Palaeostrophomena necopina 107
Palaeotrimerella superba 93
Paraoligorhyncha reducta 98
Paraspirifer urkanensis 258
Parastrophina plena sibirica 114
Parastrophinella gracilis 104
Paratreta retracta 106
Parazyga argensis 190
mirus 190
Paulonia ranovensis arctica 326
Paurorthis altaica 43
Pholidostrophia (Mesopholidostrophia)
verrucosa 194
Phragmorthis conciliata 109
Phyzotreta rugosa 106
Platyorthis cimex 194
Platystrophia dentata trigonalis 53
lynx jugorensis 53
pseudocostata 53
rhynchonelliformis 53
Plectodonta mariae 194

Plectorthis akzarica 92
numerosa 92
Plectospira orchonensis 379
Plectotyrella mirnyensis 104
Podolella rensselaeroides 194
Polylasma subsciduum 106
Polytoechia planidorsata 52
Primorewia reshetnikov 387
Probolionia minor 387
Productus asiaticus 316
(Reedoconcha) sosninae 378
tiekensis 316
(Waagenoconcha) nachodkensis 378
Protatypa lepidota 193
Protatyris binarius 260
cordatus 260
flexuosus 260
praecursa 194
Protochonetes dniestrensis 194
Prototreta gribovensis 21
Protozeuga insueta 104
Pseudoglossinotoechia atalanta 297
Pseudocrania karatalensis 106
Pseudostrophochonetes mediocostatus 194
Pseudosyrinx rudicostus 352
tajmyricus 325
Ptychopleurella alata 100
Punctospirifer bonus 324
orlowi 325
Purdonella (?) ancestralis 369
Qilanotryma praecursor 93
Quadrisonia declivis 6
suspensa 6
Quadrithyris katbasensis 240
Radiomena parirregularis parirregularis 299
podgornensis 299
Risserella elegantuloides 194
Reticulariopsis savagei 259
Reticulatia tekesensis 316
Reuschella asiatica 113
Rhynchospirifer markovskii 306
Rhynchospirina simiradzkii 194
Rhynchotetra (?) rhomboidea 336
Rhysotreta prisa 106
Richthofenia (Prorichthofenia) ussurica 386
(Richthofenia) orientalis 386
Rostricellula burensis 111
sibirica 115
subrostrata 115
subrostrata acuticostata 115
Rowellella balchashensis 106
Salopina crassiformis 194
Saukrodictya thuanshanica 113
Scaphelasma pusilla 106
Scaphorthis recurva 95
Schachriomonia schachriomonica 96
Schizophoria fragilis 194
Schizotreta triangularis 106
Schuchertella librovitchi 352
Semicostella genuflexa 369
Septatrypa secreta 194
Shaleriella tenuis 194
Shlygina declivis 92
solida 93
Sibiria glabra 3
magna 3
squamosa 3
Sibirispira miranda posudensis 301
Siphonotreta mamatensis 106
Sowerbyella intricata 96
rukavishnikovae 107
verecunda 92
Spinatrypa alexandrina 306
(?) bobrovkensis 176
Spinomarginifera costata 387
Spirifer (Delthyris ?) favositicus var.
gissarensis 190
reedi 387
(?) trigonalis uralicus 327
zlobini 325
Spiriferella grandis 387
Spondylotreta parva orientalis 106
Stegerhynchus decemplicatus duplex 193
Stenocamara djakonovi 53
Stropheodonta (Eostropheodonta)
lineatoporosa 197
schilkaensis 258
Strophomena digna 94
lanx 109
lebediensis septata 113
medialis tchegitunica 103
Strophomenia rukavishnikovae 95
Squamathyris glacialis 183
Syringothyris (?) popekae 379
Tastaria pseudotasta 258
Tatjanospirifer daksanensis 302
variabilis 302
Tcharella amgensis 1
Tiramnia yakutica 354
Tomiopsis atlanichus 387
convexa 379
laevis 379
rhombiformis 379
tricostata 379
Triplesia globosa 94
Triseptata nelidovi 52
Tritoechia lermontovae 42
Tschatkalia unica 191
Turarella alleri 1
Tuvinia radiata 43
Ujukites altaicus 44
tarlykensis 44
Ussovia borissiakae 195
Ussunia incredibilis 93
Vellamo antiqua 53
medina 53
putukuniensis 103
(?) summa 53
Virgianella trivialis 186
Waagenites artemovkensis 387

Waagenoconcha obscura 401
similis 369
Warrenella maureri breviculata, 306
maureri uralica, 306
Westonia pupyshevi 106
Zygospira taskanensis 104

Тип ИГЛОКОЖИЕ

Класс Цистоидеи

Clivosocystis clivosus 123
tuberculatus 123
Communicystis communis 123
Oandacystis levis 127
Tenuicystis tenuis 127

Класс Криноидеи

Acanthodocrinus magnispinosus 63
makverensis 63
Acbastaucrinus aclastauensis 279
affectatus 278
(?) martynovae 280
quinquangularis 280
undosus 279
Anderkenicrinus antiquus 127
Angusticrinus excisus 123
Anthinocrinus carbonicus 238
costatus 207
florenus 238
florenus rotundus 238
lullowicus 204
Apiastrum unicum 63
Arenariocrinus areniferus 400
incrustatus 400
Babanicrinus tumefactus 127
Baltocrinus kazakhstanensis 122
Bazaricrinus stellatilobatus 207
Betpakdalacrinus cirriferum 350
Bicyclocrinus polystichus 350
Bilbocrinus bacillaris 126
Bystrowicrinus parvirugosus 63
pjriensis 63
Camtocrinus gutaensis 207
magnus 207
Caragachicrinus minutus 123
quinquipartitus 123
Catagraphiocrinus accolensis 123
altus 123
Cheirocrinus (?) tumefactus 119
Conspectocrinus dulancarensis 126
malkeldensis 126
simplex 126
Cordonicrinus petaloideus 123
Cyclomonile denticulata 63
Cyclopagoda alikhovae 63
anulata 63
tubuliforma 63
Ctenocrinus pusillus 207
Cuboidicrinus cuboides 126
Cupressocrinites (?) chingizensis 293
Cyclocaudex infundibularis 350
Cyclocion distinctus primus 278
Cyclocyclicus elatus 350
fastigatus 64
infacetus 203
orulganicus 400
ottuktachensis 400
punctatus 400
raikkülaensis 64
Dacalabatocrinus baciniatus 349
Dactylocrinus (?) unicum 278
Dastaricrinus digitatus 207
Decacrinus ornatus 206
ovalis 206
Decemicrinus dicelobatus 126
Dentiferocrinus coronoideus 64
miscellus 64
pirguensis 63
vermiculatus 63
visendus 63
wychmaensis 63
Desmidocrinus pjriensis 63
turgidus 64
Digiticrinus baculiformis 126
bellus 126
digitus 126
levis 126
Dienocalipter surculosus 350
Divisicrinus divisus 126
Dwortsowaecrinus antiquus 125
korjikensis 125
nanus 127
sculptus 125
simplex 125
tapaensis 63
Exaesiodiscus molodovensis 64
Excisocrinus excisus 127
Fascicrinus concavus 123
costatus 119
fasciculus 123
inflatus 123
lentiformis 123
ordinarius 120
stolbovensis 120
umbonatus 127
Ferulacrinus rigidus 119
Floricyclus candidus 280
insolitus 280
kaytasensis 280
kazangapicus 280
parvicostatus 280
Gliptocrinus elegans laevi 64
Goniostathmus olentensis 278
Granulosocrinus granulosus 127
Hexacrinites (?) inflatus 291
(?) subbiconcavus 291
(?) sverbilovi 291

Iocrinus männili 63
vostokovae 63
wesenbergensis 63
Karakolocrinus laticanalis 207
Kasachstanocrinus borsjiensis 207
formosus 238
pentamerus 238
soboleevi 238
stellatus 238
Kellericrinus angularis 127
torosus 127
Kitabicrinus longus 119
Kojvicrinus orciformis 359
Konicrinus compositus 278
Kstutocrinus primus 64
Kuzbassocrinus senkevitschae 293
Lasiocrinus (?) kon-kolodesae 311
Laticrinus incomptus 127
latus 123
Lunaricrinus lunaris 124
notus 123
Malovicrinus incrustatus 127
janischewskii 63
quinpergulatus 123
Medinecrinus vitreus 205
vulgaris 207
Mediocrinus medius 205
(?) rabulatus 350
(?) repandus 350
(?) simplex 350, 207
Mirabilicrinus lidievensis 126
Multifidocrinus multifidus 123
tenuicostatus 127
Mustelocrinus mustelus 350
Neocamptocrinus arcticus 411
groschini 411
magnus 411
rarus 411
rudicostatus 411
Nirundacrinus nirundaensis 120
Nuracrinus longilobatus 293
Obuticrinus bullosus 62
Ordinaricrinus ordinarius 126
Otaricrinus otaricus 123
Particrinus demshinensis 63
fascicularis 207
grumosus 127
pandus 205
verrucosus 64
Parvicrinus parvus 120
Pennatocrinus praepennatus 207
Pentagonocyclicus aktschetanensis 203
asymmetricus 207
burovi 400
bytantaicus 400
concavus 207
definites 204
dorofeevi 400
ellipticus 207
forus 204
kangilensis 207
kharaulachensis 400
koejimensis 207
kokajgyrensis 203
lenitus 203
lenticularis 204
monocostatus 204
ostaschkini 400
petshoraensis 400
priscus 207
pratilovi 400
rarispinatus 278
rugatus 204
salebrosus 204
subconcentricus 207
subhelenae 64
tajmirensis 62
tenuitas 62
tricostatus 204
uniformis 207
virgalensis 207
Pentagonopentagonalis bondarewi 62
catagraphus 203
concinnus 62
hrustalnjensis 62
proximus 62
quindecemlobatus 62
quinquespinosus 204
ramosus 62
tolenensis 203
tscherresovae 62
vitreus 204
Pentalobatocrinus simplex 119
Pinegicrinus edemskji 359
Platycrinites (?) amantovi 207
(?) altaicus 207
? donicus 331
? gazimuricus 331
(?) kleninae 207
(?) ovalis 207
(?) subaltaicus 349
(?) subtuberosus 207
(?) tuberosus 207
(?) tumidus 349
Platyplateium (?) longidentatus 349
(?) nurvilosus 349
providencense intermedius 349
tantaicus 349
Plummerantericrinus paratus 280
Porcunicrinus probatus 63
Poteriocrinites (?) mergensis 207
praecox 350
verchoyanicus 400
vulgaris 359
Pycnosaccus semilukensis 311
Ramosocrinus clivosus 120
convexus 127
tumsjikensis 123
Rhysocamax trinciformis 350
Ristnacrinus bifidus 126

kulunbulakensis 126
pusillus 126
tuberculatus 126
Rosulicrinus rosulus 123
Sartanicrinus sartanensis 127
Schizocrinus radiatus 126
Sellicrinus selliformis 126
Sibiricrinus disjunctus 123
Sidericrinus asperum 120
giganteus 123
Sigillatocrinus sigillatus 123
Squameocrinus tchunensis 120
Stenocrinus altus 278
Stomiocrinus diligens 359
kolymensis 400
rarus 400
strictus 359
verchoyanicus 400
Sumsaricystis radiatus 119
Syndetocrinus (?) naus 205
Taranshicrinus tatus 278
volgaris 278
Tatjanicrinus cruciformis 125
kozhimensis 125
Tchucrinus biconvexus 350
densus 350
loricatus 350
Tetragonotetragonalis altaicus 146
quadrihamatus 62
Trigonocyclicus vajgatschensis 62
Tschironocrinus tschironenensis 207
Vallaticrinus vallatus 126
Wachsmuthicrinus dubjanskii 311
Webericrinus variabilis 121
Xenocrinus ? corruptus 125
dentatus 124
explicatus 125
? lobus 125
? quadriangulatus 119
? quadrilobatus 125

Тип ГЕМИХОРДОВЫЕ

Класс Граптолиты

Aletograptus hyperboreus 101
Campograptus (?) absonus 164
Climacograptus acceptus 77
jideliensis 77
membraniferus 102
praesupernus 102
Clonograptus limatus 101
Cologratpus roemeri tenuis 196
Corymbograptus V-fragosus 102
Cryptograptus arcticus 102
Cyrtograptus sakmaricus 165
Didymograptus tenuiramis 101
Dicellograptus bondarevi 102
bungei 102
middendorfi 102
Dictyonema taimyrense 101
Diplograptus modestus primus 77
multithecatus 102
praemultidens 102
pulcher 102
Expansograptus taimyrensis 102
Glossograptus barbatulus 102
engelgardti 102
Glyptograptus maaernii 77
? ojsuensis 77
plurithecatus 102
posterus 77
Isograptus schrenki 102
Monograptus anerosus 167
balaensis 167
beatus 167
bessolaensis 168
elongato-concavus 196
fanicus 241
microdon 167
mironovi 167
nganasanicus 196
nimius 167
prognatus 167
supinus 167
Neolobograptus ? proprius 168
Oktarites compositus 166
Orthograptus illustris 77
nanus 102
Pacificograptus pacificus 76
pacificus affinis 77
Pernerograptus sidiachenkoi 196
Petalograptus crassus 164
Plegmatograptus nebula lautus 77
Pristiograptus emaceratus 196
moludensis 166
singularis 196
Pseudoclimacograptus (Metaclimacograptus) fidus 77
pictus 77
Pseudomonoclimacis cinctutus 168
lidiae 168
Rastrites orlovi 196
rotundus 166
subtilis 166
Rectograptus barcovaensis 102
insuetus 102
longissimus 102
Sagenograptus gagarini 101
Spirograptus enormis 164
Streptograptus distentus 166
Tetragraptus (Eotetragraptus) fragilis 102
Trigonograptus tenvis 102
Uralograptus insuetus 163

Тип ХОРДОВЫЕ

Класс Панцирные рыбы

Angarichtys hyperboreus 267

ПРОБЛЕМАТИКА

Arganatjiella indistinctus 292

Moyeronia belostotzkayae 97

КОНОДОНТЫ

Huddlella johni 174
Kimognathus alexeii 256
Kockelella suglobovi 174
Stepanovites meyeni 380

Часть II. МЕЗОЗОЙ, КАЙНОЗОЙ

ТРИАС

1. БУРИЙ И. В., ЖАРНИКОВА Н. К., ПОЛУБОТКО И. В. (колл. № 12082). Карнийские отложения Ольгинского района Приморья. «В кн.: Новые данные по детальной биостратиграфии фанерозоя Дальнего Востока». Владивосток, 1984, с. 62—71, 4 пал. табл.

   Описаны впервые установленные карнийские отложения района. Приведены описания 5 видов и 1 нового подвида галобий, позволяющих коррелировать рассматриваемые отложения с одновозрастными образованиями Северо-Востока Союза и Японии.

   Голотип:

   Halobia talajaensis primorica Polubotko et Zharnikova.
   № 1/12082. Табл. IX, фиг. 1

2. ВАСИЛЕВСКАЯ Н. Д. (колл. № 12163). Триасовые растения с о. Надежды (Свальбард). В сб. «Геология Шпицбергена». Л., 1983, с. 142—148, 6 пал. табл.

   Из карнийских отложений о. Надежды кратко описаны находки остатков растений, из которых выделен новый вид.

   Голотип:

   Paratatarina korchinskae Vassilevskaja.
   № 3/12163. Табл. I, фиг. 3

3. ВЛАДИМИРОВИЧ В. П. (колл. № 9262). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Ч. I. М., 1960, с. 52.

   Описан новый вид осмундового из отложений рэйтского яруса Челябинского бассейна.

   Голотип:

   Osmundopsis (?) *bojakivae* Vladimirovich.
   № 4/9262. Табл. II, фиг. 8

4. ВЛАДИМИРОВИЧ В. П. (колл. № 12528). Остатки некоторых представителей рода *Thinnfeldia*. Ежегодн. ВПО, т. XVII, 1965, с. 238—249, 6 пал. табл.

На основании монографического изучения остатков позднетриасовых растений из трех местонахождений Восточного Урала предложена схема биостратиграфического расчленения рассматриваемых отложений. Установлено два фитостратиграфических горизонта. Описаны виды рода *Thinnfeldia*. Выделено два новых вида.

Голотипы:

Thinnfeldia irregularis Vladimirovich.
№ 15/12528. Табл. V, фиг. 2
Thinnfeldia karpinskii Vladimir.
№ 19/12528. Табл. VI, фиг. 2

5. ВЛАДИМИРОВИЧ В. П. (колл. № 10180). О среднетриасовой флоре Оренбургского Приуралья. В сб.: «Платформенные образования Урала». Уральск. Н. Ц. Тр. Инст. геол. и геохим. Вып. 96, 1972, с. 87—98, 2 пал. табл.

Описываемые остатки растений происходят из разреза букобайской свиты в Соль-Илецком районе. Эндемичность этого комплекса растений и отсутствие связей с другими триасовыми флорами Приуралья указывает на особое положение изученной флоры. Описано 7 форм, 4 из которых являются новыми. Установлено 2 новых рода.

Голотипы:

Danaeopsis bukobaica Vladimirovich.
№ 2/10180. Табл. I, фиг. 2
Protoblechnum tuzhykovae Vladimir.
№ 4/10180. Табл. I, фиг. 4
Ketovia furcata.
№ 3/10180. Табл. II, фиг. 1
Tuzhykoviella elegans.
№ 9/10180. Табл. II, фиг. 2

6. ВЛАДИМИРОВИЧ В. П. (колл. № 11008). Раннетриасовые папоротники Западной Сибири (Кузнецкий бассейн). Часть I. Ежегодн. ВПО, т. XXIII, 1980, с. 265—285.

Впервые дан обзор папоротников нижнего триаса Кузнецкого бассейна. Описано 8 видов, 6 из которых являются новыми. По морфологическим признакам род *Cladophlebis* подразделен на 3 подрода.

Голотипы:

Prynadaeopteris schwedovii Vladimirovich.
№ 1/11008. Табл. I, фиг. 1
Cladophlebis (Cladophlebis) pusilla Vladimir.
№ 5/11008. Табл. II, фиг. 1
Cladophlebis (Cladophlebis) platyphylla.
№ 7/11008. Табл. II, фиг. 3

Cladophlebis (Cladophlebis) tomiensis.
№ 11/11008. Табл. III, фиг. 1
Cladophlebis (Cladophlebis) densinervis.
№ 13/11008. Табл. III, фиг. 3
Cladophlebis (Diversifolia) mutnaensis.
№ 17/11008. Табл. IV, фиг. 3

7. ВЛАДИМИРОВИЧ В. П. (колл. № 11146). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Растения. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 204, 1980, сс. 32, 37.

Описано три вида ископаемых членистостебельных из отложений нижнего триаса Кузнецкого бассейна.

Голотипы:

Phyllotheca oligophylla Vladimirovich.
№ 1/11146. Табл. VII, фиг. 1
Neocalamites primoris Vladimir.
№ 4/11146. Табл. VII, фиг. 4
Paracalamites taradanicus.
№ 7/11146. Табл. VIII, фиг. 6

8. ВЛАДИМИРОВИЧ В. П. (колл. № 11008). Папоротники раннего триаса Западной Сибири. Ежег. ВПО, т. XXIV, 1981, с. 215—222, 3 пал. табл.

Описаны новые представители 2-х родов. Установлен новый род — *Kedroviella*. Впервые для Кузнецкого бассейна описывается представитель рода *Pecopteris*. Выделено 3 новых вида.

Голотипы:

Pecopteris angustipinnula Vladimirovich.
№ 18/11008. Табл. I, фиг. 1
Kedroviella corsakii Vladimir.
№ 21/11008. Табл. I, фиг. 6
Katasiopteris stenophylla.
№ 22/11008. Табл. I, фиг. 4

9. ГАВРИЛОВА В. А. (колл. № 11764). Некоторые позднеоленекские аммоноидеи Горного Мангышлака. Ежег. ВПО, т. XXIII, 1980, с. 16—27, 1 пал. табл.

Приводятся описания двух видов позднеоленекских аммоноидей, один из которых впервые встречен на территории Советского Союза, а второй является новым видом.

Голотип:

Eukashmirites karashekensis Gavrilova.
№ 7/11764. Табл. I, фиг. 4

10. ГАВРИЛОВА В. А. (колл. № 12524). О некоторых динаритидах (аммоноидеи) Мангышлака. Ежегодн. ВПО, т. XXXII, 1989, с. 162—177, 2 пал. табл.

Пять описанных видов динаритид имеют важное значение для создания зональной схемы верхнеоленекского подъяруса нижнего триаса Мангышлака. Выделен новый вид.

Голотип:

Dinarites (Dinarites) astachovae Gavrilova.
№ 3/12524. Табл. I, фиг. 3

11. ЖАРНИКОВА Н. К. (колл. № 9653). Новые анизийские цератиты семейства *Acrochordiceratidae* Южного Приморья. Палеонт. журн. № 1, 1981, с. 29—37, 1 пал. табл.

Охарактеризованы три местные фаунистические зоны анизийского яруса, средняя из которых содержит богатый комплекс аммоноидей. Особый интерес представляют акрохордицератиды. Описано 4 новых вида.

Голотипы:

Acrochordiceras (Acrochordiceras) kiparisovae Zharnikova.
№ 5/9653. Табл. I, фиг. 1
Acrochordiceras (Acrochordiceras) orientale Zharn.
№ 22/9653. Табл. IV, фиг. 4
Acrochordiceras (Paracrochordiceras) pacificum.
№ 13/9653. Табл. IV, фиг. 5
Acrochordiceras (Epacrochordiceras) korobkovi.
№ 16/9653. Табл. IV, фиг. 6

12. ЖАРНИКОВА Н. К., БУРИЙ И. В. (колл. № 10195). Аммоноидеи из тиролитовой зоны Южного Приморья. Палеонт. журн. № 3, 1981, с. 61—69, 1 пал. табл.

По комплексу фауны выделена зона *Tirolites cassinus* в верхнеоленекских отложениях Приморья. Из этого комплекса описано 5 видов аммоноидей, 4 из которых являются новыми.

Голотипы:

Kazakhstanites zakharovi Zharnikova.
№ 15/10195. Табл. VII, фиг. 1
Tirolites ussuriensis Zharn.
№ 14/10195. Табл. VII, фиг. 3
Bittnerites pacificus.
№ 17/10195. Табл. VII, фиг. 4
Dinarites (Plococeras) subdalmatinus.
№ 19/10195. Табл. VII, фиг. 5

13. KEYSERLING A. (колл. № 11129). Fossile Mollusken. В кн.: Миддендорф А. «Sibirische Reise». Band 1, Theil 1, 1848, с. 243—258, табл. I—VI.

Описаны органические остатки, собранные Миддендорфом из отложений триаса и юры на п-ове Таймыр и по р. Оленек. Всего изучено 34 вида моллюсков. Установлено новых видов: аммонитов — 6, двустворок — 2.

Синтипы:

Ceratites hedenströmi Keyserling.
№ 1/11129 (93/84). Табл. II, фиг. 6
№ 2/11129 (93/10). Табл. III, фиг. 1—3
№ 3/11129 (93/8). Табл. III, фиг. 4
№ 4/11129 (93/13). Табл. III, фиг. 5, 6
Ceratites middendorffi Keys.
№ 5/11129 (93/6). Табл. I; табл. II, фиг. 1
№ 6/11129 (93/85). Табл. II, фиг. 2
№ 7/11129 (93/11). Табл. II, фиг. 3
№ 8/11129 (93/12). Табл. II, фиг. 4
Ceratites euomphalus.
№ 9/11129 (93/7). Табл. III, фиг. 7—9
Ceratites eichwaldi.
№ 10/11129 (93/9). Табл. III, фиг. 11—14 *
Nautilus sub-aratus.
№ 11/11129 (93/2). Табл. IV, фиг. 1—3 *
Inoceramus retrosus.
№ 12/11129 (93/5). Табл. IV, фиг. 4, 5 *
Lima paupera.
№ 23/11129 (92/10). Табл. VI, фиг. 6 *

14. КИПАРИСОВА Л. Д. (колл. № 11012). Новые роды и виды древних растений и беспозвоночных СССР. ВНИГРИ, «Недра», Л., 1980, с. 152.

Описано 2 вида пектинид из отложений нижнего триаса Предкавказья и Мангышлака.

Голотипы:

Leptochondria plana Kiparisova.
№ 1/11012. Табл. 35, фиг. 5
Ornithopecten temirbabensis Kipar.
№ 3/11012. Табл. 35, фиг. 7

15. КОРЧИНСКАЯ М. В. (колл. № 11722). Распространение натгорститов в триасовых отложениях Свальбарда. В кн.: «Мезозойские отложения Свальбарда». Л., 1972, с. 64—72, 4 пал. табл.

Приводятся данные, свидетельствующие о том, что натгорститы встречаются на двух стратиграфических уровнях, соответствующих верхам ладинского и низам карнийского ярусов. Дано описание 5 видов, один из которых новый.

Голотип:

Nathorstites strongulatus Korchinskaya.
№ 23/11722. Табл. II, фиг. 10

16. КОРЧИНСКАЯ М. В. (колл. № 11887). Ранненорийская фауна архипелага Свальбард. В кн.: «Геология осадочного чехла архипелага Свальбард». НИИГА, Л., 1980, с. 30—41, 4 пал. табл.

По сходству комплекса фауны из свиты Флатсален с аналогами нижненорийских отложений других районов бореальной области подтверждается ранненорийский возраст изученных толщ. Описано 3 вида аммонитов (1 вид новый) и 5 видов двустворок (2 вида новые).

Голотипы:

Pteroceras (?) *svalbardense* Korchinskaja.
№ 13/11887. Табл. II, фиг. 7 *
Halobia petrenkoi Korch.
№ 24/11887. Табл. III, фиг. 9
Meleagrinella boehmi.
№ 29/11887. Табл. I, фиг. 7

17. КОРЧИНСКАЯ М. В. (колл. № 12035). Объяснительная записка к стратиграфической схеме мезозоя (триас) Свальбарда. «Севморгеология». Л., 1982, 99 с., 30 пал. табл.

Палеонтологическое обоснование стратиграфической схемы триасовых отложений архипелага Свальбард. Описание двустворчатых (1 вид) и головоногих (30 видов) моллюсков, имеющих наиболее важное стратиграфическое значение. Выделено 5 новых видов аммонитов.

Голотипы:

Nordophiceras (?) *costatus* Korchinskaja.
№ 4/12035. Табл. XI, фиг. 1
Keyserlingites wichensis Korch.
№ 26/12035. Табл. IX, фиг. 2
Arctoptychites popowi.
№ 45/12035. Табл. XXII, фиг. 5
Danubites tozeri.
№ 56/12035. Табл. XVI, фиг. 8
Pearylandites walbergensis.
№ 62/12035. Табл. XVII, фиг. 5

18. КОРЧИНСКАЯ М. В. (колл. № 10650). Находка новых цератитов оленекского яруса на Свальбарде (Шпицберген). Палеонт. журн. № 3, 1983, с. 109—112, 3 рис.

Находка представителей описываемых цератитов совместно с видом *Keyserlingites subrobustus*, являющимся руководящим для верхнеоленекских отложений Свальбарда, Канады и севера Сибири, позволяет считать вновь выделяемый род верхнеоленекским. Описано два новых вида.

Голотипы:

Proacrochordiceras kiparisovae Korchinskaja.
№ 1/10650. Рис. 1, фиг. ж, з
Proacrochordiceras negriense Korch.
№ 5/10650. Рис. 3

19. КОРЧИНСКАЯ М. В. (колл. № 12354). Фаунистическая характеристика триасовых отложений Земли Франца Иосифа. В кн.: «Стратиграфия и палеонтология мезозойских осадочных бассейнов севера СССР». ПГО «Севморгеология». Л., 1985, с. 16—22, 6 пал. табл.

Фаунистическая характеристика триасовых отложений приведена по материалам параметрических скважин. Дано описание трех видов двустворок, 1 форма приводится в открытой номенклатуре.

Голотипы:

Daonella parva Korchinskaja.
№ 39/12354. Табл. V, фиг. 1
Halobia graem-belliensis Korch.
№ 47/12354. Табл. VI, фиг. 1, 2[1]
Mytilus heisaensis.
№ 24/12354. Табл. III, фиг. 7

20. KOZUR H. (колл. № 11824). Neue Ostrakodenarten aus den Gemmanellenschichten des Prikaspigebietes. Geol. Paläont. Mitt. Innsbruck. Bd. 48, 1974, S. 1—36, 6 Taf.

Гемианеллиевые слои Прикаспия содержат солоноватоводную фауну, известную с триаса и доныне. Из этих отложений описаны новые виды и подвиды (в количестве 21) остракод, имеющих стратиграфическое значение при расчленении отложений триаса.

Голотипы:

Gemmanella (Praegemmanella) movschovitschi Kozur.
№ 1/11824. Табл. II, фиг. 1
Gemmanella (Praegemmanella) schleiferae.
№ 4/11824. Табл. I, фиг. 8
Gemmanella (Praegemmanella) minuta.
№ 6/11824. Табл. II, фиг. 5
Gemmanella (Gemmanella) magna.
№ 8/11824. Табл. II, фиг. 8
Gemmanella (Gemmanella) mocki.
№ 9/11824. Табл. III, фиг. 3
Gemmanella (Gemmanella) grammi.
№ 11/11824. Табл. II, фиг. 3
Gemmanella (Gemmanella) densistriata.
№ 13/11824. Табл. IV, фиг. 5
Gemmanella (Neogemmanella) oertlü.
№ 15/11824. Табл. IV, фиг. 3
Gemmanella (Neogemmanella) abuschiki.
№ 17/11824. Табл. I, фиг. 1

[1] № голотипа — 47/12354, а не 46/12354, как указано на стр. 20.

Gemmanella (Neogemmanella) parva primitiva.
№ 19/11824. Табл. I, фиг. 5
Blomella transita.
№ 21/11824. Табл. V, фиг. 1
Pulviella minima.
№ 23/11824. Табл. IV, фиг. 11
Pulviella? stykae.
№ 25/11824. Табл. VI, фиг. 4
Pajanites? ladinicus.
№ 27/11824. Табл. IV, фиг. 7
Lutkevichinella (Lutkevichinella) pseudopusilla.
№ 28/11824. Табл. VI, фиг. 1
Lutkevichinella (Cytherissinella) okrajantzi trammeri.
№ 30/11824. Табл. VI, фиг. 10
Lutkevichinella (Cytherissinella) ventronodosa.
№ 32/11824. Табл. VI, фиг. 11
Telocythere fischeri praefischeri.
№ 33/11824. Табл. IV, фиг. 9
Telocythere mostleri.
№ 35/11824. Табл. IV, фиг. 8
Bisulcocypris rubachae.
№ 36/11824. Табл. V, фиг. 5

21. МАРКОВИЧ Е. М. (колл. № 11259). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Растения. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 204, 1980, с. 35, 63.
Описано два представителя растительного мира раннего триаса и средней юры из Южной Якутии.

Голотипы:

Equisetites ishinae Markovitch.
№ 1/11259. Табл. VII, фиг. 7
Sphenobaiera polylobata.
№ 7/11259. Табл. XVI, фиг. 5

22. ОКУНЕВА Т. М. (колл. № 11079). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 5. «Наука», М., 1980, с. 31, табл. X.
Описан новый вид норийской кардинии из Южного Приморья.

Голотип:

Cardinia primorensis Okuneva.
№ 1/11079. Табл. X, фиг. 6

23. ОКУНЕВА Т. М. (колл. № 12267). О роде *Otapiria (Monotidae, Bivalvia).* В кн.: «Пермо-триасовые события в развитии органического мира Северо-Восточной Азии». Владивосток. ДВНЦ АН СССР, 1986, с. 57—73, 2 пал. табл.
Рассмотрены отапирии как род, имеющий важное значение при расчленении и датировке геттангского и синемюрского

ярусов Северо-Востока Союза. Описано 9 видов, 2 из которых выделены как новые.

Голотипы:

Otapiria tugurensis Okuneva.
№ 20/12267. Табл. XI, фиг. 17
Otapiria zeensis.
№ 32/12267. Табл. XII, фиг. 10

24. ОКУНЕВА Т. М. (колл. № 10974). Норийские пектиниды (двустворчатые моллюски) южных районов Востока СССР. Ежегодн. ВПО, т. XXXII, 1989, с. 145—155, 3 пал. табл.

Описаны норийские пектиниды из нескольких районов, представленные видами, распространенными в бореально-тихоокеанской области. Выделен новый вид.

Голотип:

Calvaentolium udensis Okuneva.
№ 1/10974. Табл. I, фиг. 2

25. ОЛЕЙНИКОВ А. Н., ПАЕВСКАЯ Е. Б. (колл. № 11050). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 5. «Наука», М., 1980, с. 22—23, табл. VII, VIII.

Описан новый вид двустворчатого моллюска из отложений позднего триаса (норийский ярус) Приморского края.

Голотип:

Monotis notabilis Oleynikov et Payevskaya.
№ 1/11050. Табл. VII, фиг. 16

26. ПОЛУБОТКО И. В. (колл. № 11779). Раннекарнийские галобии Северо-Востока Азии. Палеонт. журн. № 1, 1980, с. 47—54, 1 пал. табл.

Ревизия раннекарнийских видов галобий выявила два их комплекса, отвечающих двум нижним зонам яруса. Описано три новых вида.

Голотипы:

Halobia talajaensis Polubotko.
№ 1/11779. Табл. V, фиг. 1
Halobia popowi.
№ 11/11779. Табл. V, фиг. 11
Halobia seimkanensis.
№ 5/11779. Табл. V, фиг. 5

27. ПОПОВ Ю. Н. (колл. № 9335). Новые виды аммоноидей из оленекского яруса Верхоянья и Лено-Оленекского междуречья. Тр. НИИГА. Т. 127, 1962, с. 176—189, 3 пал. табл.

Комплекс аммонитов из оленекских отложений Верхоянья позволяют считать содержащие их слои эквивалентами слоев Альпийской области и исключают устаревшее представление

об эндемичности фауны Верхоянья. В статье описано 12 видов, 10 из них новые. Выделено три новых рода. Коллекция неполная.

Голотипы:

Pseudotirolites menensis Popow.
№ 39/9335 (59/9335). Табл. II, фиг. 4
Anasibirites raricostatus.
№ 40/9335 (60/9335). Табл. III, фиг. 6
Dieneroceras nikabitensis.
№ 41/9335 (44/9335). Табл. III, фиг. 1
Meekoceras contrarius.
№ 42/9335 (56/9335). Табл. III, фиг. 7
Hemiprionites costatus.
№ 43/9335 (49/9335). Табл. III, фиг. 2

28. ПОПОВ Ю. Н. (колл. № 8671). Белемнит из карнийских отложений Хараулахских гор. НИИГА. Уч. зап. Палеонтол. и биостр. Вып. 6, 1964, с. 72—74, 1 пал. табл.

Описан впервые встреченный в триасовых отложениях белемнит. Отнесен к новому роду.

Голотип:

Belemnococeras darcense Popow.
№ 3/8671. Табл., фиг. 3

29. ПОПОВ Ю. Н. (колл. № 9601). Нижнетриасовые аммоноидеи зоны *Prohungarites similis* на севере Якутии. Палеонт. журн. № 3, 1968, с. 134—137, 5 рисунков.

Приведено описание разрезов в устье р. Оленек с наблюдающимся в них контактом нижне- и среднетриасовых отложений. Описано 4 вида, 3 из них — новые. Установлен новый род — *Karangatites.*

Голотипы:

Prosphingites karangatiensis Popow.
№ 1/9601. Рис. 1
Stenopopanoceras primulum.
№ 2/9601. Рис. 3
Karangatites evolutus.
№ 5/9601. Рис. 4

30. ПРИНАДА В. Д., ТУРУТАНОВА-КОТОВА А. И. (колл. № 5556). Триасовые хвощи и папоротники Башкирии. Палеонт. журн. № 3, 1962, с. 111—122, 2 пал. табл.

Описывается ископаемая флора западного склона Южного Урала. Приводится обоснование триасового возраста рассматриваемых осадков. В коллекции имеется только один голотип (нового вида В. Д. Принады).

Голотип:

Cladophlebis yanschini Prynada.
№ 2/5556. Табл. XI, фиг. 9

31. СРЕБРОДОЛЬСКАЯ И. Н. (колл. № 9261). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. I. ч. I, М., 1960, с. 81—83, 121, табл. 17, 24.

Описано два вида нового рода цикодофитов и один вид голосеменных из отложений нижнего триаса Кузнецкого бассейна. Установлен новый род — *Tomia*. Из четырех описанных в статьях видов в коллекции имеются голотипы только двух видов.

Голотипы:

Tomia radczenkoi Srebrodolskaja.
№ 1/9261 (8/9261). Табл. 17, фиг. 1
Tersiella serrata.
№ 4/9261 (120/9261). Табл. 24, фиг. 4

32. СРЕБРОДОЛЬСКАЯ И. Н. (колл. № 9328). О семействе *Dipteridaceae* из верхнетриасовых отложений Южного Приморья. Палеонт. журн. № 1, 1961, с. 144—150, 2 пал. табл.

Определяется роль находок сем. *Dipteridaceae* для познания климатических условий того времени (ср. кейпер) в областях Южного Приморья. Описано три новых вида и один ранее известный.

Голотипы:

Clathropteris mongugaica Srebrodolskaja.
№ 1/9328. Табл. XVI, фиг. 1
Dictyophyllum mongugaicum Srebr.
№ 10/9328. Табл. XVII, фиг. 1
Dictyophyllum kryshtofovichi.
№ 16/9328. Табл. XVII, фиг. 8

33. СРЕБРОДОЛЬСКАЯ И. Н. (колл. № 11219). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Растения. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., вып. 204, 1980, с. 65—68, табл. XVI.

Описано 4 вида ископаемых растений из триасовых и меловых отложений Забайкалья и Южного Приморья. Установлен новый род голосеменного раннемелового возраста — *Ulangangia.*

Голотипы:

Drepanolepis squamulosa Srebrodolskaja.
№ 8/11219. Табл. XVI, фиг. 6
Conites ambabiraensis Srebr.
№ 9/11219. Табл. XVI, фиг. 10
Carpolithus mongugaicus.
№ 10/11219. Табл. XVI, фиг. 7

Ulangangia martinsonii.
№ 12/11219. Табл. XVI, фиг. 8

34. ШВЕДОВ Н. А. (колл. № 9248). Некоторые представители триасовой флоры Восточного Таймыра. НИИГА. Сб. статей по палеонт. и биостр. Вып. 7, 1958, с. 56—76, 4 пал. табл.

Ископаемые растительные остатки с мыса Цветкова на Восточном Таймыре собраны из разреза триасовой толщи, достаточно точно фаунистически охарактеризованной предыдущими исследователями.

Описано 12 видов хвощей, папоротников и голосеменных. Выделено 3 новых вида и одна комбинация.

Голотипы:

Cladophlebis zwetkoviensis Schwedov.
№ 6/9248 (72/560). Табл. II, фиг. 2
Podozamites zwetkovii Schwed.
№ 12/9248 (13/201). Табл. VIII, фиг. 5
Araucarites migayi.
№ 16/9248 (2/413). Табл. IV, фиг. 2

35. ШВЕДОВ Н. А. (колл. № 9519). Новые раннетриасовые растения из Норильского бассейна. НИИГА. Сб. статей по палеонт. и биостр. Вып. 32, 1963, с. 59—66, 3 пал. табл.

Из коллекции своеобразных растений, собранных в толще вулканогенных образований в Норильском районе, описано 4 новых вида и установлен новый род — *Kchonomakidium.*

Голотипы:

Kchonomakidium srebrodolskae Schwedov.
№ 2/9519. Табл. I, фиг. 3, 4
Tersiella jurakchensis Schwed.
№ 5/9519. Табл. I, фиг. 8
Yavorskya radczenkovii.
№ 9/9519. Табл. II, фиг. 3а
Yavorskya arctica.
№ 11/9519. Табл. II, фиг. 3б; табл. III, фиг. 1

37. ШОРОХОВА С. А. (колл. № 11697). Палеоэкологический анализ норийской флоры реки Амбы. В кн.: «Ископаемые флоры Дальнего Востока». Тр. Биол.-почв. ин-та АН СССР, н. с., т. 27 (130), 1975, с. 17—29, 3 пал. табл.

Описано 11 тафоценозов в разрезе норийских отложений Южного Приморья (р. Амба). Выявлены основные доминанты. Описано два вида беннеттитовых и один гинкгового. Выделен 1 новый вид и одна разновидность.

Синтипы:

Pterophyllum innae Schorochova.
№ 6/11697. Табл. II, фиг. 3

№ 7/11697. Табл. II, фиг. 4
№ 8/11697. Табл. II, фиг. 5
№ 9/11697. Табл. III, фиг. 1

37. ШОРОХОВА С. А., СРЕБРОДОЛЬСКАЯ И. Н. (колл. № 10264, 11698). Некоторые позднетриасовые растения Приморья. В кн.: «Ископаемые флоры Дальнего Востока». Тр. ДВНЦ. Нов. сер., т. 53 (156), 1979, с. 68—76, 6 пал. табл.

Монгугайская флора, восемь представителей которой описаны в статье, имеет большое значение при решении вопросов региональной стратиграфии благодаря приуроченности к твердо датированным отложениям. Выделено 4 новых вида.

Голотипы:

Cladophlebis ussuriensis Schorochova.
№ 6/11698. Табл. XIII, фиг. 1
Cladophlebis macrophylla Schor.
№ 4/11698. Табл. XI, фиг. 4
Acrostichopteris ? *rara.*
№ 11/11698. Табл. XIII, фиг. 4
Podozamites kiparisovkensis Srebrodolskaja et Schorochova.
№ 25/10264. Табл. XVI, фиг. 3

ЮРА

38. БОГДАНОВА Л. А. (колл. № 12167). Остатки водорослей в юрских углях Южной Якутии. Ежегодн. ВПО, т. XXVII, 1984, с. 124—129, 2 пал. табл.

Приводится описание нового вида водоросли, морфологически отличной от ранее известных и включенной в состав синезеленых водорослей.

Голотип:

Usmunia corzhenevskae Bogdanova.
№ 1/12167. Табл. I и II.

39. БУРАКОВА А. Т. (колл. № 8130). Стратиграфия, литология и флора юрских отложений Туаркыра. Часть II — Флора юрских отложений Туаркыра. Тр. ВСЕГЕИ. Нов. сер., т. 88, 1963, 232 с., 69 пал. табл.

Изложены результаты изучения стратиграфии и литологии юрских отложений Туаркыра. Приводится описание палеоботанического материала в количестве 77 форм, из которых выделено 5 новых видов, 5 форм приведены в открытой номенклатуре.

Голотипы:

Jacutiella dentata Burakova.
№ 172/8130. Табл. XLI, фиг. 3
Anomozamites turkmenicus Burak.
№ 190/8130. Табл. XLI, фиг. 1
Anomozamites bifurcatus.
№ 195/8130. Табл. XLVI, фиг. 7

40. БУРАКОВА А. Т. (колл. № 9337). Среднегорские папоротники из Западной Туркмении. Палеонт. журн. № 4, 1961, с. 138—143, 1 пал. табл.

Из отложений байосского яруса Туаркыра собрана коллекция ископаемых папоротников, один из которых принадлежит новому виду рода *Gonatosorus*, представитель другого отнесен к новому роду — *Tuarella.*

Голотипы:

Tuarella lobifolia Burakova.
№ 4/9337. Табл. XII, фиг. 2
Gonatosorus lobifolius Bur.
№ 8/9337. Табл. XII, фиг. 7

41. БУРАКОВА А. Т. (колл. № 9401). Юрские растения из опорных разрезов Кугитанга и Шураба. В кн.: «Палеонтол. обоснов. опорных разрезов юрской системы Узбекистана и сопредельных районов». «Недра», Л., 1971, с. 164—200, 23 пал. табл.

Краткие описания растений, характеризующих стратиграфически установленные подразделения в опорных разрезах юрской системы Средней Азии. А. Т. Бураковой описано три вида, один из которых рассматривается как новый.

Голотип:

Cladophlebis sherzhantus Burakova.
№ 5/9401. Табл. V, фиг. 1, 2

42. БУРАКОВА А. Т. (колл. № 9978). *Sogdiania abdita* из среднеюрских отложений Средней Азии — возможный предок цветковых растений. Вопр. палеонт. Т. VI, 1971, с. 3—7

Описывается остаток репродуктивного побега неизвестного растения, найденного в толще грингской свиты (байос) в Юго-Западном Дарвазе. Автор предполагает, что рассматриваемый побег принадлежит примитивному цветковому растению.

Голотип:

Sogdiania abdita Burakova.
№ 1/9978. Табл., фиг. 1

43. БУРАКОВА А. Т. (колл. № 11264). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР (Растения). Тр. ВСЕГЕИ. Нов. сер., т. 204, 1980, с. 54.

Описан вид юрского растения из Киргизского каменноугольного месторождения Кок-Янгак.

Голотип:

Sagenopteris verzilinii Burakova.
№ 1/11264. Табл. XIV, фиг. 1[1]

44. БУРАКОВА А. Т. (колл. № 12130). Два новых вида голосеменных растений из угленосной юры Киргизии (Кок-Янгак)[2]. Ежегодн. ВПО, т. XXVII, 1984, с. 140—144, 3 пал. табл.

Описаны два вида растений из юры Кок-Янгака. Один из них новый, для другого дается дополненная характеристика эпидермального строения листа.

Голотип:

Pityocladus afrikanii Burakova.
№ 7/12130. Табл. III, фиг. 2

45. ВАСИЛЕВСКАЯ Н. Д. (колл. № 9498). Хвощи и папоротники из угленосных отложений Сангарского района. (Ленский угленосный бассейн). НИИГА. Сб. ст. по палеонт. и биостр. Вып. 12, 1958, с. 50—72, 12 пал. табл.

Описано 20 видов хвощей и папоротников из 4-х свит угленосных отложений Сангарского района (р.р. Чегума и Леписке) средне-верхнеюрского—нижнемелового возраста.

Выделено 5 новых видов.

Голотипы:

Equisetites tschetschumensis Vassilevskaja.
№ 1/9498 (1191/1). Табл. I, фиг. 1
Osmundopsis acutipinnula Vassil.
№ 10/9498 (1151/1). Табл. II, фиг. 1
Gleichenia jacutica.
№ 16/9498 (1134/5). Табл. III, фиг. 1
Coniopteris ketovae.
№ 31/9498 (2345/1). Табл. V, фиг. 2
Sphenopteris lepiskensis.
№ 52/9498 (1781/2). Табл. X, фиг. 4

46. ВАСИЛЕВСКАЯ Н. Д. (колл. № 9501). Голосеменные растения из угленосных отложений Сангарского района (Ленский угленосный бассейн). НИИГА. Сб. отл. по палеонт. и биостр. Вып. 15, 1959, с. 56—88, 13 пал. табл.

Рассмотренные в работе формы (31) являются представителями гинкговых и хвойных. Голосеменные представлены цветками и семенами неопределенного систематического положения. Выделено 3 новых вида и одна разновидность.

---

[1] В работе 1979 г. описанный вид отнесен автром к новому роду *Nikitia.*
[2] В статье описан один новый вид, другой новым не является.

Голотипы:

Ginkgo papilionaceus Vassilevskaja.
№ 8/2501 (2368/1). Табл. II, фиг. 3
Cephalotaxopsis sangarensis Vassil.
№ 35/2502 (23/1). Табл. IX, фиг. 1
Taxocladus tschetschumensis.
№ 42/2501 (1134/1). Табл. XI, фиг. 1

47. ВАСИЛЕВСКАЯ Н. Д., ПАВЛОВ В. В. (колл. № 9872). К вопросу о систематическом положении юрских папоротников *Raphaelia.* Уч. зап. НИИГА. Вып. 19, 1967, с. 41—49, 2 пал. табл.

Выделен новый род и описан новый вид; приведены признаки сходства и различия нового рода с родом *Raphaelia.*

Голотип:

Osmundiella vachrameevii Vassilevskaja et Pavlow.
№ 2/9872 (117). Табл. I, фиг. 2

48. ВАСИЛЕВСКАЯ Н. Д. (колл. № 12044). Новая позднеюрская *Heilungia* из Южной Якутии. Палеонт. журн. № 3, 1978, с. 141—143, 2 рис.

Описан вид голосеменного, ранее неоднократно упоминавшийся в литературе, но нигде не описанный и не изображенный. Он происходит из отложений Южно-Якутского угленосного бассейна.

Голотип:

Heilungia angustisegmenta Vassilevskaja.
№ 1/1044 (1961—1—1). Рис. 1, фиг. б; рис. 2, фиг. а

49. ВЛАДИМИРОВИЧ В. П. (колл. № 8832). Новые виды древних расчленений и беспозвоночных СССР. М., Наука, 1972, с. 308.

Описан один вид хвощевого из отложений юры Кузнецкого бассейна.

Голотип:

Equisetites costatus Vladimirovich.
№ 5/8832. Табл. 68, фиг. 8

50. ВУКС В. Я. (колл. № 12189). О юрских фораминиферах, относимых к роду *Ceratolamarckina.* Вестн. ЛГУ № 18, вып. 3, 1983, с. 69—74, 3 рис.

Юрские цератоламаркины, выделенные автором в группу *C.* (?) *speciosa,* объединяют три подгруппы, различающиеся между собой. Описан новый вид.

Голотип:

Ceratolamarckina (?) *uncata* V. Vuks.
№ 1/12189. Рис. 3а—и

51. ВУКС В. Я. (колл. № 12220). Новые виды нодозаринид (фораминиферы) из байоса Малого Кавказа. Вестн. ЛГУ № 6, вып. 1, 1984, с. 78—80, 1 рис.

Описано 2 новых вида, характерных для отложений верхнего байоса.

Голотипы:

Nodosaria subuzdagensis V. Vuks.
№ 1/12220. Рис., фиг. а—д
Pseudonodosaria araxensis.
№ 4/12220. Рис., фиг. е—к

52. ВУКС В. Я. (колл. № 12228, 12281). В кн.: «Юрские отложения южной части Закавказья. (Фораминиферы)». Л., Наука, 1985, с. 71—101, 4 пал. табл.

Впервые для отложений юры юга Закавказья предложена региональная стратиграфическая схема и установлено присутствие палеонтологически охарактеризованного аалена. Разработанная региональная схема сопоставляется со стратиграфическими схемами смежных регионов. Приведены монографические описания трех групп ископаемых организмов.

В разделе «Фораминиферы» описано 28 видов, 3 из них являются новыми.

Голотипы:

Lingulina dzhagriensis V. Vuks.
№ 1/12228. Табл. II, фиг. 11
Falsopalmula ogbinensis.
№ 24/12281 (1929в/12281). Табл. III, фиг. 12
Marginulina? azariani.
№ 30/12281 (1628а/12281). Табл. IV, фиг. 4

KEISERLING A. (колл. № 11129). См. № 13.

53. КРИШТОФОВИЧ А. Н. (колл. № 12488). Шишка *Pityostrobus burejensis* sp. n. из мезозойских отложений Буреинского бассейна. Докл. АН СССР. Т. 131, № 5, 1960, с. 1147—1148.

Приводится диагноз и описание шишки хвойного растения, найденной в горизонте песчано-глинистых сланцев обнажения левого берега р. Таксы. Отнесена к новому виду.

Голотип:

Pityostrobus burejensis Kryshtofovich.
№ 1/12888. Табл., рис. 1

54. КЯНСЕП Н. П. (колл. № 11168). Теребратулиды лузитанского яруса и нижнего кимериджа Юго-Западного Крыма. Тр. Геол. музея АН СССР. Вып. 5, 1961, 102 с., 8 пал. табл.

Монографически описано 36 видов плеченогих, приведена методика их изучения, доказывается важность стратиграфиче-

ского значения этой группы. Установлено 2 новых рода и 15 новых видов.

Голотипы:

Taurothyris avundaensis Kjansep.
№ 1/11168 (2881/1). Табл. I, фиг. 1
Juralina procerus.
№ 2/11168 (2881/4). Табл. I, фиг. 2
Juralina graciosa.
№ 12/11168 (2881/134). Табл. II, фиг. 4
Juralina nalivkini.
№ 25/11168 (2881/201). Табл. VIII, фиг. 3
Juralina babugani.
№ 32/11168 (2881/247). Табл. II, фиг. 6
Juralina carus.
№ 37/11168 (2881/263). Табл. IV, фиг. 3
Lobothyris crimica.
№ 53/11168 (2881/343). Табл. VII, фиг. 7
Postepithyris tipica.
№ 65/11168 (2881/546). Табл. VII, фиг. 4
Postepithyris campestriensis.
№ 68/11168 (2881/579). Табл. IV, фиг. 1
Postepithyris subvalfinensis.
№ 86/11168 (2881/724). Табл. IV, фиг. 8
Neumayrithyris demircapuensis.
№ 93/11168 (2881/773). Табл. VII, фиг. 1
Zeillerina taurica.
№ 114/11168 (2881/1218). Табл. I, фиг. 6
Zeillerina quenstedti.
№ 118/11168 (2881/1294). Табл. VIII, фиг. 5
Zeillerina lorioli.
№ 122/11168 (2881/1416). Табл. III, фиг. 6
Zeillerina roemeri.
№ 124/11168 (2881/1425). Табл. III, фиг. 4

МАРКОВИЧ Е. М. (колл. № 11259). См. № 21.

55. МАРКОВИЧ Е. М. (колл. № 12112). Некоторые юрские растения из Южной Якутии. Ежег. ВПО, т. XXVII, 1984, с. 157—166, 3 пал. табл.

Из средней и поздней юры Южно-Якутского угольного бассейна описано шесть новых видов ископаемых растений.

Голотипы:

Equisetites nerjungrensis Markovitch.
№ 1/12112. Табл. I, фиг. 7
Coniopteris tchulmanensis.
№ 3/12112. Табл. I, фиг. 3

Cladophlebis kryshtofovichii.
№ 8/12112. Табл. II, фиг. 1
Cladophlebis pseudoargutula.
№ 6/12112. Табл. I, фиг. 1
Macrotaeniopteris vlassovi.
№ 16/12112. Табл. III, фиг. 3
Taxocladus mucronulatus.
№ 21/12112. Табл. I, фиг. 10

56. МАРТИНСОН Г. Г. (колл. № 12223). О новом роде пластинчатожаберных *Pseudocardinia.* Палеонт. журн. № 3, 1959, с. 33—40, 1 пал. табл.

Приводится характеристика нового рода юрских пресноводных пластинчатожаберных с территории Азии. Описано 8 видов нового рода, выделено 5 новых.

Голотипы:

Pseudocardinia submagna Martinson.
№ 1/12223 (12/1862). Табл. III, фиг. 1
Pseudocardinia carinata Martins.
№ 3/12223 (1711). Табл. III, фиг. 4
Pseudocardinia ovalis.
№ 5/12223 (2/54). Табл. III, фиг. 6
Pseudocardinia turfanensis.
№ 6/12223 (3/53). Табл. III, фиг. 7
Pseudocardinia elongata.
№ 9/12223 (51). Табл. III, фиг. 10

57. МАРТИНСОН Г. Г. (колл. № 12227). Мезозойские и кайнозойские моллюски континентальных отложений Сибирской платформы, Забайкалья и Монголии. СО АН СССР. Тр. Байк. лимнол. станции, т. XIX, 1961, 332 с., 26 пал. табл.

Рассмотрены вопросы биостратиграфии континентальных отложений на обширной территории. Указаны места сборов третичных пресноводных моллюсков, обоснован возраст отложений. Дано сопоставление стратиграфических схем континентальных отложений Восточной Азии. Монографически описано 100 видов двустворчатых (из них 19 новых) и 79 брюхоногих (13 новых) моллюсков. Установлено 2 новых рода.

Голотипы:

Pseudocardinia sibirensis Martinson.
№ 15/12227 (156/502). Табл. II, фиг. 12
Unio elongatus Martins.
№ 25/12227 (9/54). Табл. III, фиг. 7
Unio transbaicalensis.
№ 26/12227 (10/54). Табл. IV, фиг. 1
Unio collensis.
№ 29/12227 (61/54). Табл. IV, фиг. 4

Lamproscapha lacustris.
№ 51/12227 (5/22). Табл. VII, фиг. 6
Lamproscapha murtoica.
№ 52/12227 (6/22). Табл. VII, фиг. 7
Lamproscapha elliptica.
№ 54/12227 (169/2). Табл. VII, фиг. 8
Lamproscapha tugrigensis.
№ 55/12227 (51/53). Табл. VIII, фиг. 1
Limnocyrena obtusale.
№ 99/12227 (88/55). Табл. XIX, фиг. 8
Limnocyrena tignensis.
№ 101/12227 (29/55). Табл. XIX, фиг. 11
Limnocyrena rotunda.
№ 103/12227 (30/55). Табл. XIX, фиг. 14
Limnocyrena compacta.
№ 105/12227 (722—М). Табл. XIX, фиг. 23
Corbicula triangularis.
№ 109/12227 (395—М). Табл. XX, фиг. 12
Campeloma melampoides.
№ 134/12227 (370—М). Табл. XXI, фиг. 24
Lioplax conica.
№ 136/12227 (72—М). Табл. XXI, фиг. 27
Valvata (Tropidina) pusilla.
№ 140/12227 (44/53). Табл. XXII, фиг. 12
Valvata (Megalovalvata) protopiligera.
№ 141/12227 (45/53). Табл. XXII, фиг. 9
Hydrobia rectoides.
№ 144/12227 (48/53). Табл. XXII, фиг. 17
Bithynia jurassica.
№ 149/12227 (5/52). Табл. XXII, фиг. 23
Micromelania bicarinata.
№ 166/12227 (59/52). Табл. XXII, фиг. 47
Palaeobaicalia pumila.
№ 167/12227 (393—М). Табл. XXIII, фиг. 16
Palaeobaicalia turriformis.
№ 168/12227 (394—М). Табл. XXIII, фиг. 18
Choanomphalus (?) *parvus.*
№ 192/12227 (164—М). Табл. XXIV, фиг. 15
Physa mongolica.
№ 205/12227 (8—М/51). Табл. XXIV, фиг. 38

58. МАРТИНСОН Г. Г., ХУН-Ю-ЦУН (колл. № 12224). Новые верхнеюрские униониды Западного Забайкалья. Палеонт. журн. № 3, 1961, с. 28—34, 1 пал. табл.

Описано пять новых видов унионид из верхнеюрских отложений Гусиноозерской депрессии, принадлежащих двум родам.

Голотипы:

Cuneopsis lanceolata Martinson et Hong.
№ 1/12224 (ГО—206/59). Табл. V, фиг. 1
Cuneopsis hajanensis.
№ 8/12224 (ГО—220/59). Табл. V, фиг. 8
Unio martynovae.
№ 10/12224 (ГО—30/59). Рис. 1а
Unio bainzarchensis.
№ 12/12224 (ГО—203/59). Табл. V, фиг. 10

59. МИЛОВА Л. В. (колл. № 9963). Новые раннеюрские двустворчатые моллюски бассейна р. Большого Анюя. В кн.: «Иноцерамы юры и мела Северо-Востока СССР». Тр. СВКНИИ, вып. 32, 1969, с. 177—189, 3 пал. табл.

Описанные в работе двустворчатые моллюски из нижнеюрских отложений разреза берегового обнажения р. Нижний Вургувеем представлены 8-ю видами, 5 из которых выделены как новые.

Голотипы:

Lima (Plagiostoma) bilibini Milova.
№ 1/9963. Табл. II, фиг. 3
Lima (Plagiostoma) elongata.
№ 3/9963. Табл. II, фиг. 1
Aequipeczen (?) *anjuensis.*
№ 9/9963. Табл. I, фиг. 4
Chlamys (Chlamys) filiformis.
№ 18/9963. Табл. III, фиг. 1
Chlamys (Chlamys) vurguveemensis.
№ 20/9963. Табл. III, фиг. 3

60. НЕСОВ Л. А., КАЗНЫШКИН М. Н. (колл. № 12217). Двоякодышащая рыба и черепахи из поздней юры Северной Ферганы (Киргизская ССР). Вестн. зоол. № 1, 1985, с. 33—39, 1 рис.

Из комплекса фауны, обнаруженного в отложениях келловея (Сарыкамышсай, Ошская обл.) описаны остатки двоякодышащей рыбы, выделенной в новые род и вид, и двух видов черепах, один из которых также является новым.

Голотипы:

Ferganoceratodus jurassicus Kaznyshkin et Nessov.
№ 3/12217. Рис. 1, фиг. 3
Toxoheloides narynensis.
№ 18/12217. Рис. 1, фиг. 17

61. НЕСОВ Л. А., КАЗНЫШКИН М. Н. (колл. № 12397). Позднеюрские хрящевые рыбы Северной Ферганы. Ежег. ВПО, т. XXXI, 1988, с. 160—178, 2 пал. табл.

Описано три новых вида из трех родов хрящевых рыб из фаунистического комплекса лиманов юго-западной окраины азиатского массива суши в каспийское время.

Голотипы:

Polyacrodus balabansaiensis Nessov et Kaznyshkin.
№ 1/12397. Табл. I, фиг. 1
Polyacrodus prodigialis.
№ 18/12397. Табл. I, фиг. 18
Palaeobates verzilini.
№ 21/12397. Табл. II, фиг. 1

62. ОКУНЕВА Т. М. (колл. № 8459). Стратиграфия юрских морских отложений Восточного Забайкалья и ее палеонтологическое обоснование. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 219, 1973, с. 3—93, 11 пал. табл.

На основе палеонтологических и литологических исследований разработана стратиграфическая схема морских отложений юры Восточного Забайкалья. Установлено присутствие плинсбахского, тоарского и ааленского ярусов. Приведено описание 60-ти видов двустворок и аммоноидей. Выделено 5 новых видов и 1 новый род.

Голотипы:

Nucula ononica Okuneva.
№ 23/8459. Табл. I, фиг. 23
Modiolus schiviensis.
№ 82/8459. Табл. VIII, фиг. 5
Astarte talanguensis.
№ 94/8459. Табл. IX, фиг. 6
Homomya (Bureiamya) undensis.
№ 104/8459. Табл. IX, фиг. 17
Homomya (Bureiamya) atopczensis.
№ 109/8459. Табл. X, фиг. 2

63. ОЛЕЙНИКОВ А. Н. (колл. № 8116, 8627). Стратиграфия и филлоподы юры и мела Восточного Забайкалья. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 138, 1975, 172 с., 11 пал. табл.

Работа посвящена описанию филлопод из юрских и меловых отложений с приведением стратиграфической схемы и с корреляцией разнофациальных образований. Установлено восемь разновозрастных комплексов филлопод, стратиграфический анализ которых позволил уточнить возраст вмещающих отложений. Описано 70 видов листоногих ракообразных из восьми семейств. Выделено 29 новых видов (1 новый вид описан Л. И. Якобсон).

Голотипы:

Triops shilkaensis Oleynikov.
№ 13/8627. Табл. I, фиг. 1

Pseudestheria mailoensis.
№ 106/8627. Табл. II, фиг. 6
Pseudestheria halgataica.
№ 107/8627. Табл. II, фиг. 7
Paleoleptestheria submaleevi.
№ 51/8627. Табл. II, фиг. 12
Paleoleptestheria favosa.
№ 110/8627. Табл. II, фиг. 14
Paleoleptestheria savinaensis.
№ 43/8627. Табл. II, фиг. 13
Nestoria kutiensis.
№ 61/8627. Табл. III, фиг. 7
Nestoria orbicularis.
№ 56/8627. Табл. III, фиг. 5
Nestoria limnetica.
№ 59/8627. Табл. III, фиг. 9
Opsipolygrapta strojevi.
№ 4/8627. Табл. IV, фиг. 8
Brachygrapta borsiaensis.
№ 104/8627. Табл. V, фиг. 2
Bairdestheria andachudukensis.
№ 8/8627. Табл. VI, фиг. 5
Bairdestheria duroica.
№ 5/8116. Табл. VI, фиг. 8
Bairdestheria oblonga.
№ 96/8627. Табл. VI, фиг. 7
Bairdestheria aequialta.
№ 93/8627. Табл. VII, фиг. 2
Bairdestheria turgaensis.
№ 102/8627. Табл. VII, фиг. 5
Bairdestheria lutosa.
№ 91/8627. Табл. VII, фиг. 11
Bairdestheria zazaica.
№ 108/8627. Табл. VII, фиг. 12
Bairdestheria abbreviata.
№ 78/8627. Табл. VIII, фиг. 6
Bairdestheria planata.
№ 44/8627. Табл. VIII, фиг. 8
Liograpta lana.
№ 47/8627. Табл. VIII, фиг. 9
Paleolynceus tshernyshevi.
№ 30/8627. Табл. X, фиг. 1
Paleolynceus matakensis.
№ 35/8627. Табл. X, фиг. 14
Paleolanceus zergunicus.
№ 37/8627. Табл. X, фиг. 15
Paleolynceus brevulus.
№ 17/8627. Табл. X, фиг. 18

Paleolynceus oblongatus.
№ 18/8627. Табл. X, фиг. 19

64. ПОЛУБОТКО И. В., ХУДОЛЕЙ К. М. (колл. № 9300). О находке раннегетангских аммонитов на Северо-Востоке СССР. Палеонт. журн. № 3, 1960, с. 57—60, табл.

В бассейне р. Вилиги впервые на территории Советского Союза обнаружены раковины аммонитов рода *Psiloceras Hyatt* в комплексе с фауной двустворок, подтверждающей раннегеттангский возраст вмещающих пород. Описаны два новых вида аммонитов.

Голотипы:

Psiloceras suberugatum Chudoley et Polubotko.
№ 1/9300. Табл. IV, фиг. 1
Psiloceras viligensis.
№ 3/9300. Табл. IV, фиг. 3

65. ПРОЗОРОВСКАЯ Е. Л. (колл. № 12195). Первая находка титонских брахиопод на западе Средней Азии. Палеонт. сб. № 22, Львов, 1985, с. 40—44, 2 пал. табл.

Описано пять видов юрских брахиопод, собранных в титонских отложениях Больших Балхан и представленных своеобразным комплексом, сходным с позднетитонскими некоторых районов Европы. Выделено 4 новых вида.

Голотипы:

Tropeothyris vialovi Prozorovskaja.
№ 3/12195. Табл. I, фиг. 4
Tropeothyris pseudofarcinata Proz.
№ 6/12195. Табл. II, фиг. 2
Zeillerina tithonica.
№ 12/12195. Табл. I, фиг. 3
Terebrataliopsis lammaburunica.
№ 17/12195. Табл. II, фиг. 4

66. ПРОЗОРОВСКАЯ Е. Л. (колл. № 12282). В кн.: «Юрские отложения южной части Закавказья. (Брахиоподы)». Наука, Л., 1985, с. 101—117, 17 пал. табл.

В разделе «Брахиоподы» описано 16 видов, 6 из которых являются новыми. Установлено 2 новых рода.

Голотипы:

Monticlarella (?) *costata* Prozorovskaja.
№ 6/12282 (1166а/12282). Табл. XX, фиг. 6
Cubanirhynchia bilavaensis Proz.
№ 8/12282 (1203а/12282). Табл. XX, фиг. 8
Neocirpa armenica.
№ 10/12282 (1166а/12282). Табл. XXI, фиг. 1

Neocirpa nachitschevanica.
№ 11/12282 (1197а/12282). Табл. XXI, фиг. 2
Negramithyris negramensis.
№ 14/12282 (1187/12282). Табл. XXI, фиг. 5
Gusarella nana.
№ 8/12282 (1227а/12282). Табл. XXI, фиг. 9

67. ПЧЕЛИНЦЕВ В. Ф. (колл. № 11318). Брюхоногие мезозоя Горного Крыма. Геол. музей АН СССР. Л., 1963, 131 с., 22 пал. табл.

Приведен краткий геологический очерк, принципы систематики описываемых брюхоногих из отложений верхней юры и нижнего мела. Указывается на близкое родство Крымской фауны с западно-европейской. Описан 51 вид. Установлено новых: 2 семейства, 1 подсемейство, 4 рода, 29 видов.

Голотипы:

Neritopsis taurica Pčelincev.
№ 4/11318 (34). Табл. I, фиг. 4
Oncochilus sub-ovulus Pčel.
№ 9/11318 (50). Табл. I, фиг. 9
Ampullina koinautensis.
№ 17/11318 (532). Табл. VII, фиг. 3
Ampullina subautharis.
№ 20/11318 (541). Табл. VII, фиг. 7
Ampullospira subfournaeti.
№ 32/11318 (634). Табл. IX, фиг. 4
Ampullospira upensis.
№ 35/11318 (637). Табл. X, фиг. 4
Cernina angusta.
№ 42/11318 (648). Табл. XI, фиг. 4
Pictavia nikitensis.
№ 52/11318 (667). Табл. XI, фиг. 9
Pictavia barabanovensis.
№ 55/11318 (673). Табл. XII, фиг. 3
Trochonatica fridentalis.
№ 60/11318 (752). Табл. XII, фиг. 8
Trochonatica komarensis.
№ 62/11318 (754). Табл. XIII, фиг. 4
Eucyclus arginensis.
№ 72/11318 (30). Табл. XVI, фиг. 7
Tectus submoralinus.
№ 74/11318 (55). Табл. XVI, фиг. 9
Leviathania crimica.
№ 81/11318 (63). Табл. XIV, фиг. 2
Leviathania sulcata.
№ 82/11318 (68). Табл. XV

Spinigera inexpecta.
№ 93/11318 (784). Табл. XVIII, фиг. 1
Eustoma multituberculatum.
№ 96/11318 (84). Табл. IV, фиг. 4
Pseudomelania arginensis.
№ 97/11318 (76). Табл. XIX, фиг. 1
Pseudomelania taurica.
№ 100/11318 (80). Табл. XIX, фиг. 4
Pseudomelania mirabilis.
№ 101/11318 (79). Табл. XX, фиг. 1
Cylindrobullina karabijailensis.
№ 104/11318 (808). Табл. XXII, фиг. 1
Cylindrobullina lata.
№ 105/11318 (831). Табл. XXII, фиг. 6
Cylindrobullina angusta.
№ 106/11318 (838). Табл. XXI, фиг. 4
Retusa taurica.
№ 113/11318 (842). Табл. XXII, фиг. 9

68. ПЧЕЛИНЦЕВА Г. Т. (колл. № 9295). Стратиграфия и пелециподы юрских отложений Западного Приохотья. Тр. Геол. музея АН СССР. Вып. IX, 1962, 88 с., 18 пал. табл.

Описаны остатки пелеципод из юрских отложений Западного Приохотья. На основе их изучения предложено стратиграфическое расчленение юрских отложений указанного района. Рассмотрено 75 видов, 30 из которых даны в открытой номенклатуре. Установлено 16 новых видов.

Голотипы и синтипы:

Bureiamya irensis G. Pčelinceva.
№ 32/9295. Табл. III, фиг. 6
Bureiamya toromensis G. Pčel.
№ 33/9295. Табл. IV, фиг. 2
Bureiamya tylomensis.
№ 34/9295. Табл. IV, фиг. 3
Bureiamya suborientalis.
№ 41/9295. Табл. IV, фиг. 7
№ 42/9295. Табл. IV, фиг. 8
Anaucella minima.
№ 62/9295. Табл. VI, фиг. 1
№ 63/9295. Табл. VI, фиг. 3
№ 64/9295. Табл. VI, фиг. 4
Anaucella subbronni.
№ 65/9295. Табл. VII, фиг. 5
№ 66/9295. Табл. VI, фиг. 6
№ 67/9295. Табл. VI, фиг. 7
№ 68/9295. Табл. VI, фиг. 8
Anaucella ochotica.
№ 69/9295. Табл. VII, фиг. 1

Anaucella gerbicanensis.
№ 70/9295. Табл. VII, фиг. 2
№ 71/9295. Табл. VII, фиг. 3
Anaucella fischeri.
№ 84/9295. Табл. IX, фиг. 1
№ 85/9295. Табл. IX, фиг. 2
Anaucella elgaensis.
№ 88/9295. Табл. VII, фиг. 6
№ 89/9295. Табл. VII, фиг. 7
№ 90/9295. Табл. VII, фиг. 8
Anaucella toromensis.
№ 92/9295. Табл. VII, фиг. 10
№ 93/9295. Табл. VII, фиг. 11
№ 94/9295. Табл. VII, фиг. 12
№ 95/9295. Табл. VII, фиг. 13
№ 96/9295. Табл. VII, фиг. 14
№ 97/9295. Табл. VII, фиг. 15
Inoceramus subambiguus.
№ 124/4199. Табл. XI, фиг. 4[1]
Inoceramus subdepressus.
№ 102/9295. Табл. XI, фиг. 1
№ 103/9295. Табл. XI, фиг. 2
№ 104/9295. Табл. XI, фиг. 3
Modiola urmiensis.
№ 124/9295. Табл. XVII, фиг. 6
№ 125/9295. Табл. XVII, фиг. 7

69. RETOWSKI O. (колл. № 10916). Die titoneschen Ablagerungen von Theodosia. Moscou, 1983, 98 с., 6 пал. табл.

Описывается коллекция остатков ископаемых беспозвоночных из титонских отложений Крыма. Описано и частично изображено: 36 видов головоногих (из них 14 новых видов и 3 вариетета), 3 новых вида брюхоногих, 11 новых видов двустворок, 2 вида брахиопод (1 — новый), 3 вида иглокожих (1 — новый).

Голотипы и синтипы:

Tithonoceras zitteli Retowski.
№ 5/10916 (195/465). Табл. V, фиг. 2 *
Phylloceras mediterraneum var. *tauricum.*
№ 10/10916 (195/750). Табл. I, фиг. 5 *
Lytoceras liebigi var. *ponticum.*
№ 13/10916 (195/471). Табл. I, фиг. 8 *
Holcostephanus obliquenodosus.
№ 21/10916 (195/485). Табл. I, фиг. 18 *

[1] За типичный экземпляр автором принят образец из коллекции Н. С. Воронец, описанный ею в работе 1973 г. под названием *In. ambiguus* Eichw.

Holcostephanus mirus.
№ 24/10916 (195/506). Табл. II, фиг. 2 *
Holcostephanus (?) *proteus.*
№ 25/10916 (195/486). Табл. II, фиг. 3
Perisphinctes euxinus.
№ 26/10916 (195/470). Табл. II, фиг. 5
№ 27/10916 (195/469). Табл. II, фиг. 6
№ 28/10916 (195/472). Табл. II, фиг. 7

Perisphinctes subrichteri.
№ 29/10916 (195/463). Табл. II, фиг. 8 *
Perisphinctes ponticus.
№ 30/10916 (195/462). Табл. II, фиг. 9 *
Perisphinctes andrussowi.
№ 31/10916 (195/494). Табл. II, фиг. 10 *
Hoplites janus.
№ 38/10916 (195/480). Табл. III, фиг. 6
Hoplites obtusenodosus.
№ 42/10916 (195/458). Табл. III, фиг. 10
№ 43/10916 (195/459). Табл. III, фиг. 11
Hoplites consanguineus.
№ 44/10916 (195/481). Табл. IV, фиг. 1
№ 45/10916 (195/482). Табл. IV, фиг. 2
Hoplites subchaperi.
№ 46/10916 (195/512). Табл. IV, фиг. 3
№ 47/10916 (195/511). Табл. IV, фиг. 4
Hoplites perornatus.
№ 48/10916 (195/500). Табл. IV, фиг. 5 *
Hoplites incompositus.
№ 49/10916 (195/461). Табл. IV, фиг. 6
№ 50/10916 (195/478). Табл. IV, фиг. 8a
№ 51/10916 (195/475). Табл. IV, фиг. 8b
Hoplites incompositus var. *discrepans.*
№ 52/10916 (195/477). Табл. IV, фиг. 7
№ 53/10916 (195/460). Табл. V, фиг. 1
Spinigera zitteli.
№ 55/10916 (195/514). Табл. VI, фиг. 6
№ 56/10916 (195/513). Табл. VI, фиг. 7
Natica (Amauropsis) euxina.
№ 57/10916 (195/522). Табл. VI, фиг. 8
№ 58/10916 (195/521). Табл. VI, фиг. 9
Naticella (?) *tithonia.*
№ 59/10916 (195/523). Табл. VI, фиг. 10 *
Pholas tithonia.
№ 61/10916 (195/510). Табл. VI, фиг. 12 *
Neaera theodosiana.
№ 62/10916 (195/534). Табл. VI, фиг. 13
№ 63/10916 (195/532). Табл. VI, фиг. 14

Neaera boehmi.
№ 64/10916 (195/535). Табл. VI, фиг. 15 *
Neaera glabra.
№ 65/10916 (195/532). Табл. VI, фиг. 16 *
Neaera (?) *elongata.*
№ 66/10916 (195/531). Табл. VI, фиг. 17 *
Arca alata.
№ 69/10916 (195/540). Табл. VI, фиг. 20 *
Arca gracillima.
№ 70/10916 (195/539). Табл. VI, фиг. 21 *
Modiola zebrikowi.
№ 71/10916 (195/541). Табл. VI, фиг. 22 *
Pecten (Entolium) theodosianus.
№ 72/10916 (195/527). Табл. VI, фиг. 23 *
Pecten (Amusium) sokolowi.
№ 73/10916 (195/526). Табл. VI, фиг. 24
№ 74/10916 (195/525). Табл. VI, фиг. 25
№ 75/10916 (195/524). Табл. VI, фиг. 26
Pecten (Amusium) pawlowi.
№ 76/10916 (195/528). Табл. VI, фиг. 27 *
Lingula tithonia.
№ 77/10916 (195/509). Табл. VI, фиг. 28 *
Phyllocrinus verrucosus.
№ 81/10916 (195/537). Табл. VI, фиг. 32
№ 82/10916 (195/538). Табл. VI, фиг. 33

70. РОСТОВЦЕВ К. О. (колл. № 12284). В кн.: «Юрские отложения южной части Закавказья. (Аммоноидеи)». Наука, Л., 1985, с. 117—168, 17 пал. табл. См. № 52.
В разделе «Аммоноидеи» описано 56 видов, принадлежащих 30 родам, 4 вида новые.

Голотипы:

Calliphylloceras subdisputabile Rostovcev.
№ 8/12284 (1216а/12284). Табл. XXXI, фиг. 4
Spiroceras azariani.
№ 27/12284 (1004/12284). Табл. XXXIV, фиг. 3
Parkinsonia quenstedti.
№ 78/12284 (1190/12284). Табл. XLII, фиг. 6
Leptosphinctes ? *pomosus.*
№ 98/12284 (1160/12284). Табл. XLV, фиг. 7

71. САМЫЛИНА В. А., СРЕБРОДОЛЬСКАЯ И. Н. (колл. № 12393). Новые виды рода *Phoenicopsis* из мезозоя Азиатской части СССР. Ботан. журн, т. 71, № 9, 1986, с. 1262—1266, 2 пал. табл.
Описано два новых вида указанного рода из Южной Ферганы и Юго-Восточного Забайкалья.

Голотипы:

Phoenicopsis suluktensis Samylina.
№ 1/12393. Табл. I, фиг. 1
Phoenicopsis urtujensis Samyl. et Srebrodolskaja.
№ 2/12393. Табл. II, фиг. 1

72. СЕЙ И. И. (колл. № 10151). Представители раннеааленских иноцерамид Западного Приохотья (Дальний Восток). Зап. ЛГИ. Т. LXIII, вып. 2, 1972, с. 120—130, 2 пал. табл.

В низах ааленского яруса встречен своеобразный комплекс ретроцерамов, из наиболее характерных видов которого два описаны впервые.

Голотипы:

Retroceramus priscus Sey.
№ 1/10151. Табл. I, фиг. 2
Retroceramus subtilis.
№ 28/10151. Табл. II, фиг. 3

73. СЕЙ И. И. (колл. № 10854). Новые роды и виды древних растений и беспозвоночных СССР. ВНИГРИ. Недра, Л., 1980, с. 147, 155.

Три вида ранне- и среднеюрских двустворок описаны из Северной Сибири (р. Оленек) и Дальнего Востока (р. Бурея).

Голотипы:

Mytiloceramus bureiensis Sey.
№ 2/10854. Табл. 31, фиг. 1
Mytiloceramus subporrectus.
№ 5/10854. Табл. 31, фиг. 2
Camptonectes (Boreionectes) umaltensis.
№ 1/10854. Табл. 36, фиг. 1

74. СЕЙ И. И. (колл. № 12125). Позднеплинсбахские двустворчатые моллюски Буреинского прогиба. В кн.: «Новые данные по детальной биостратиграфии фанерозоя Дальнего Востока». Владивосток, 1984, с. 86—97, 2 пал. табл.

Монографически описываются позднеплинсбахские двустворки (9 видов), рассматривается их стратиграфическое распространение с привязкой к аммонитовым зонам. Установлено новых — 1 род и 1 вид.

Голотип:

Chlamys (Ochotochlamys ?) bureiensis Sey.
№ 17/12125. Табл. XVII, фиг. 1

75. СЕЙ И. И., КАЛАЧЕВА Е. Д. (колл. № 11511). Биостратиграфия нижне- и среднеюрских отложений Дальнего Востока. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 285, 1985, 143 с., 35 пал. табл.

Приводится описание фаунистически охарактеризованных разрезов. Дается детальная биостратиграфическая схема ниж-

ней и средней морской юры по всему региону и обоснование выделения ярусов. Впервые для Дальнего Востока монографически описан обширный комплекс ранне- и среднеюрских аммонитов (31 вид) и двустворок (37 видов). Выделен один новый вид двустворчатого моллюска.

Голотипы:

Pectinula (?) *solonensis* Sey.
№ 24/11511. Табл. XXXIII, фиг. 6

76. СЕЙ И. И., КАЛАЧЕВА Е. Д. (колл. № 12029). Об инвазиях тетических аммонитов в бореальные позднеюрские бассейны Востока СССР. В кн.: «Мезозой Советской Арктики». Тр. ин-та геол. и геогр. СО АН СССР. Вып. 555, с. 61—71, 3 пал. табл.

Рассматриваются случаи проникновения тетической фауны в бореальные области в различные периоды юрского времени. Описано 6 видов аммонитов: 4 в открытой номенклатуре, 1 — новый.

Голотип:

Ochetoceras elgense Chudoley et Kalacheva.
№ 12/12019. Табл. III, фиг. 1

77. СИБИРЯКОВА Л. В. (колл. № 8452). Стратиграфия морских юрских отложений Верхнего Приамурья и ее палеонтологическое обоснование. В кн.: «Стратиграфия и фауна мезозоя восточных районов СССР». Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 219, 1973, с. 119—201, 17 пал. табл.

Приводится описание юрских морских отложений в Верхнем Приамурье и их стратиграфическое подразделение, обоснованное изучением остатков фауны. Описаны двустворки (71 вид), белемниты (2 вида), гастроподы (1). 44 формы даны в открытой номенклатуре, 8 видов новых.

Голотипы и синтипы:

Isognomon freidini Sibirjakova.
№ 51/8452. Табл. II, фиг. 31
Modiolus portnjagini Sibir.
№ 190/8452. Табл. IX, фиг. 4
Modiolus bolscheneverensis.
№ 215/8452. Табл. X, фиг. 14
Modiolus reinovensis.
№ 225/8452. Табл. X, фиг. 16
Arcomytilus emeljanovi.
№ 250/8452. Табл. XI, фиг. 14
Taneredia ochurcovensis.
№ 404/8452. Табл. XVI, фиг. 12
Tancredia amurensis.
№ 391/8452. Табл. XVI, фиг. 18

Pleuromya voronetzae.
№ 427/8452. Табл. XVII, фиг. 15
№ 428/8452. Табл. XVII, фиг. 13
№ 429/8452. Табл. XVII, фиг. 17
№ 430/8452. Табл. XVII, фиг. 16
№ 432/8452. Табл. XVII, фиг. 10
№ 433/8452. Табл. XVII, фиг. 11
№ 434/8452. Табл. XVII, фиг. 12
№ 435/8452. Табл. XVII, фиг. 9

78. СОКОЛОВ Д. Н. (колл. № 10939). Мезозойские окаменелости острова Преображения и острова Бегичева. Тр. Геол. музея АН СССР, т. IV, 1910, с. 41—54, 1 пал. табл.

Коллекция окаменелостей с указанных островов состоит из аммонитов валанжина и двустворок келловея. Возраст установлен по составу фауны. Выделен 1 новый вид и новый вариетет вида Кейзерлинга.

Голотипы:

Olcostephanus diptychus var. *sibirica* Sokolov.
№ 8/10939 (570/138). Табл. I, фиг. 1
Olcostephanus bjegitschevi.
№ 11/10939 (570/60). Табл. I, фиг. 2

79. СОКОЛОВ Д. Н. (колл. № 3729). Aucellidae de la Province Transcaspienne et du Caucase. Зап. имп. Минер. общ-ва. Часть LI, 1961, с. 289—311, 1 пал. табл.

Работа является результатом изучения семейства *Aucellidae* из верхнеюрских и нижнемеловых отложений Закаспия (Мангышлак) и Северного Кавказа. Автором рассмотрены представители двух родов этого семейства: *Aucella* (20 видов) и *Aucellina* (8 видов). Выделен новый вид.

Голотип:

Aucellina renngarteni Sokolov.
№ 7/3729. Табл. XIV, фиг. 10

80. СРЕБРОДОЛЬСКАЯ И. Н. (колл. № 12085). Новые данные о позднеюрской флоре Забайкалья. В кн.: «Матер по страт. и палеогеогр. Вост. Азии». Сб. научн. трудов ДВНЦ. Владивосток, 1984, с. 40—47, 1 пал. табл.

Рассмотренный палеофлористический комплекс Восточного Забайкалья датируется поздней юрой. Описано 5 новых видов представителей хвощей, папоротников, цикадофитов, хвойных и голосеменных.

Голотипы:

Equisetum takschense Srebrodolskaja.
№ 1/12085. Табл. IV, фиг. 1

Coniopteris talanguica Srebr.
№ 7/12085. Табл. IV, фиг. 7
Weltrichia tergenica.
№ 15/12085. Табл. VI, фиг. 2
Schizolepis tergenica.
№ 21/12085. Табл. VI, фиг. 8
Strobilites takschensis.
№ 23/12085. Табл. VI, фиг. 10

81. СРЕБРОДОЛЬСКАЯ И. Н., ТЕСЛЕНКО Ю. В. (колл. № № 11219, 11651). О возрасте ичетуйского флористического комплекса Западного Забайкалья. В сб.: «Палеонт. и страт. Дальнего Востока». Владивосток, 1979, с. 80—91, 3 пал. табл.

Впервые описываемый комплекс ископаемой флоры представлен основными группами растений и включает 24 вида 13-ти родов; 6 видов являются новыми. Опровергается прежняя датировка (ранне-среднеюрская). Возраст ичетуйской свиты устанавливается как поздняя юра—ранний мел (?).

Голотипы:

Muscites samchakianus Srebrodolskaja.
№ 3/11219. Табл. X, фиг. 1
Equisetum minutissimum Srebr.
№ 6/11651. Табл. X, фиг. 8
Osmunda (?) *chudogensis.*
№ 18/11651. Табл. XI, фиг. 12
Heilungia iczetujensis Vachrameev et Srebrodolskaja.
№ 6/11219. Табл. XII, фиг. 1
Schizolepis kozubovae Srebr.
№ 35/11651. Табл. XII, фиг. 17
Schizolepis komarovii.
№ 36/11651. Табл. XII, фиг. 18

82. ТИХОМИРОВА Л. Б. (колл. № 12070). Морфология новых представителей юрско-меловых спонгокапсулид (радиолярии). Ежег. ВПО, т. XXVI, 1983, с. 48—65, 2 пал. табл.

Изучение 14-ти новых видов насселярий позволило установить типы морфологических структур стенок их скелетов, которые могут служить видовыми признаками. Выделено 4 новых рода и 2 подсемейства.

Голотипы:

Obesacapsula demersa Tikhomirova.
№ 1/12070 (30и—490). Табл. II, фиг. 9б
Obesacapsula nodulosa.
№ 2/12070 (30б—490). Табл. I, фиг. 8а
Bullacapsula aspera.
№ 3/12070 (200д—490). Табл. I, фиг. 1

Bullacapsula cephalotribua.
№ 4/12070 (200а—490). Табл. I, фиг. 2
Bullacapsula nuciformis.
№ 5/12070 (217—411). Табл. I, фиг. 3
Bullacapsula propria.
№ 6/12070 (200е—490). Табл. I, фиг. 4
Bullacapsula torosa.
№ 7/12070 (98—490). Табл. I, фиг. 5в
Cornucapsula robusta.
№ 8/12070 (127^{II}—490). Табл. I, фиг. 6а
Acatacapsula gassanovi.
№ 9/12070 (1015—548). Табл. II, фиг. 7а
Acutacapsula geisuensis.
№ 10/12070 ($30б^{I}$—490). Табл. II, фиг. 9б
Acutacapsula porrecta.
№ 11/12070 (658^{II}—543). Табл. II, фиг. 8а
Thecacapsula armenica.
№ 12/12070 (30л—490). Табл. II, фиг. 3б

83. ЧЕРНЫШЕВ Б. И. (колл. № 3963). Мезозойские *Branchiopoda* из Туркестана и Забайкалья. Геол. журн. Т. VII, вып. 3, 1940.
Описаны представители членистоногих из отложений юры, представленные 9-ю новыми видами пяти родов из четырех семейств.

Голотипы и синтипы:

Ketmenia schultzi Chernyshev.
№ 1/3963. Табл. I, фиг. 1 *
Ketmenia rotundata Chern.
№ 19/3963. Табл. I, фиг. 2
№ 20/3963. Табл. I, фиг. 3
Ketmenia gusewi.
№ 22а/3963. Табл. I, фиг. 4
№ 23а/3963. Табл. I, фиг. 5
Iliella spinosa.
№ 93/3963. Табл. I, фиг. 11
№ 94/3963. Табл. I, фиг. 12
№ 95/3963. Табл. I, фиг. 13
Prolepidurus daja.
№ 258а/3963. Табл. II, фиг. 35
№ 259/3963. Табл. II, фиг. 36
№ 260/3963. Табл. II, фиг. 37
№ 261а/3963. Табл. III, фиг. 38
№ 262/3963. Табл. III, фиг. 39
№ 263/3963. Табл. III, фиг. 40
№ 264/3963. Табл. III, фиг. 41
№ 265/3963. Табл. III, фиг. 42

Prolepidurus schewija.
№ 309/3963. Табл. III, фиг. 43
Prolipidurus kuenga.
№ 310/3963. Табл. III, фиг. 44
Estheria daja.
№ 324/3963. Табл. III, фиг. 46
№ 325/3963. Табл. III, фиг. 47
Lynceus (Lymnetis) stchukini.
№ 338/3963. Табл. III, фиг. 48
№ 339/3963. Табл. III, фиг. 49
№ 340/3963. Табл. III, фиг. 50
№ 341/3963. Табл. III, фиг. 51

84. ШУЛЬГИНА Н. И. (колл. № 9564). Титонские аммониты Северной Сибири. В сб.: «Пробл. палеонт. обосн. детальн. стратигр. мезозоя Сибири и Дальн. Востока». СО АН СССР. Инст. геол. и геоф. Наука, Л., 1967, с. 131—176, 17 пал. табл.

Приведено описание трех южных родов аммонитов, впервые встреченных в Северной Сибири, но широко распространенных в титонских и титон-берриасских отложениях Средиземноморской области. Описано 11 форм, 6 из которых являются новыми видами.

Голотипы:

Virgatosphinctes exoticus Schulgina.
№ 3/9564. Табл. IV, фиг. 1
Virgatosphinctes tenuicostatus Schulg.
№ 9/9564. Табл. VII, фиг. 1
Virgatosphinctes rudicostatus.
№ 27/9564. Табл. X, фиг. 1
Virgatosphinctes bicostatus.
№ 19/9564. Табл. VIII, фиг. 5
Aulacosphinctes tripartites.
№ 31/9564. Табл. XIII, фиг. 1
Berrisella (?) *borealis.*
№ 34/9564. Табл. IV, фиг. 3; табл. XVI, фиг. 1

85. ШУЛЬГИНА Н. И. (колл. № 10118). Аммониты севера Сибири. В кн.: «Границы юры и мела и берриасский ярус в бореальном поясе». «Наука», Новосибирск, 1972, с. 137—174, 25 пал. табл.

Обосновано отнесение берриасского яруса к меловой системе, учтены границы мела под берриасом. Рассмотрены разрезы морского берриаса в пределах Бореального пояса на территории Союза. Описано 19 видов аммонитов, 7 из которых являются новыми. Установлен новый подрод.

Голотипы:

Subcraspedites (Subcraspedites) anglicus Schulgina.
№ 1/10118. Табл. I, фиг. 1

Subcraspedites (Ronkinites) rossicus.
№ 16/10118. Табл. VII, фиг. 3
Surites (Surites) subanalogus.
№ 26/10118. Табл. XII, фиг. 3
Bojarkia bodylevskii.
№ 35/10118. Табл. XVI, фиг. 1
Bojarkia bodylevskii.
№ 45/10118. Табл. XX, фиг. 2
№ 48/10118. Табл. XXII, фиг. 1; табл. XXIII, фиг. 1
№ 50/10118. Табл. XXIV, фиг. 1

86. ШУЛЬГИНА Н. И. (колл. № 9843) (Захаров В. А., Нальняева Т. И., Шульгина Н. И.). Новые данные по биостратиграфии верхнеюрских и нижнемеловых отложений на полуострове Пакса (Анабарский залив). В кн.: «Палеобиография и биостратиграфия юры и мела Сибири». СО АН СССР. Труды, вып. 528, 1983, с. 56—99, 19 пал. табл.

Проведено зональное сравнение моллюсков по двум разнофациальным разрезам. Дано описание сводного разреза верхней юры и неокома. Уточнены границы и пересмотрен объем некоторых аммонитовых зон. Описано 7 новых видов аммонитов и 1 новый род.

Голотипы:

Neopolyptychites arcticus Schulgina.
№ 37/9843. Табл. X, фиг. 1
Neopolyptychites pachsensis Schulg.
№ 42/9843. Табл. XIII, фиг. 1
Neopolyptychites asiaticus.
№ 56/9843. Табл. XII, фиг. 1
Neopolyptychites bassovi.
№ 57/9843. Табл. XV, фиг. 1
Neopolyptychites fissuratoides.
№ 59/9843. Табл. XVI, фиг. 1
Neopolyptychites klimovae.
№ 60/9843. Табл. XVII, фиг. 1

87. ЯНИН Б. Т. (колл. № 12658). Юрские и меловые рудисты (стратиграфическое и географическое распространение). «Наука», М., 1989, 214 с., 16 пал. табл.

Произведен анализ стратиграфического распространения рудистов верхней юры и мела в Европе, Азии, Африке и Америке. Предложена межрегиональная схема по рудистам в пределах Альпийской складчатой области. Дан анализ палеозоогеографии этой группы на глобальном уровне. Предлагается возможность палеозоогеографического районирования по рудистам ак-

ваторий в пределах Тетического пояса. Описано 36 видов. Один вид — новый.

Голотип:

Heterodiceras crimicus Yanin.
№ 8/12658. Табл. V, фиг. 1

МЕЛ

88. АБРАМОВА Л. Н. (колл. № 11629). Новый вид дуба из верхнего мела Корякского нагорья. Палеонт. журн. № 1, 1979, с. 144—147, 2 рис.

Из комплекса ископаемой флоры описаны отпечатки листьев дуба, впервые обнаруженные в отложениях верхнего мела, что представляет большой интерес для решения вопроса их происхождения и стратиграфического значения.

Голотип:

Quercus tchucotica Abramova.
№ 1/11629 (185—5). Рис. 1, фиг. а, в, г

89. АБРАМОВА Л. И. (колл. № 12161). Позднемеловая флора бассейна реки Хатанги. В кн.: «Палеонтологическое обоснование расчленения палеозоя и мезозоя арктических районов СССР». ПГО «Севморгеология», Л., 1983, с. 118—127, 5 пал. табл.

В трех свитах верхнего мела в интервале сеноман—турон выделено четыре комплекса флоры, из которых описано 3 новых вида.

Голотипы:

Anemia rarinervis Abramova.
№ 3/12161. Табл. I, фиг. 3
Pseudoprotophyllum (?) *hatangaensis.*
№ 4/12161. Табл. II, фиг. 1
Pistia (?) *marginata.*
№ 5/12161. Табл. III, фиг. 1, 4

90. АБРАМОВА Л. Н. (колл. № 12126). Новые меловые хвойные севера Средней Сибири. Ежегодн. ВПО, т. XXVII, 1984, с. 210—214, 3 пал. табл.

Из альб-сеноманских континентальных отложений бассейна р. Анабар описано: 1 новый род *Anabarella* с типовым видом и 2 новых вида рода *Sciadopitys*.

Голотипы:

Sciadopitys brevifolia Abramova.
№ 6/12126. Табл. II, фиг. 5

Sciadopitys arctica.
№ 20/12126. Табл. II, фиг. 11
Anabarella kryshtofovichii.
№ 1/12126. Табл. III, фиг. 2

91. АБРАМОВА Л. Н. (колл. № 12356). Меловые хвойные из бунгинской свиты острова Фаддеевского (Новосибирские острова). В кн.: «Стратиграфия и палеонтология мезозойских бассейнов Севера СССР». ПГО «Севморгеология», Л., 1985, с. 104—107, 2 пал. табл.

Из нижней части бунгинской свиты (K_1) описаны два новых вида хвойных. Уточняется возраст нижней части свиты.

Голотипы:

Schizolepis arcticus Abramova.
№ 3/12356. Табл. II, фиг. 2
Schizolepis neosibiricus.
№ 2/12356. Табл. I, фиг. 2

92. АКОПЯН В. Т., ДЖАЛИЛОВ М. Р., КОРОТКОВ В. А. (колл. № 11930). В кн.: «Валанжин Мангышлака *(Gastropoda)*». Наука, М., 1983, с. 49—72, т. XX—XXII.

Монография — сводка результатов комплексного изучения стратиграфии и ископаемых органических остатков валанжина Мангышлака. Дано описание семи групп, история их изучения, палеогеографических особенностей и их роли в обосновании стратиграфического расчленения отложений валанжина Мангышлака.

В разделе «Gastropoda» описано 11 видов, 3 из них — новые.

Голотипы:

Funiptyxis luppovi Hacobjan et Djalilov.
№ 7/11930. Табл. XX, фиг. 5
Megaptyxis (?) *hacobjani* Djalilov.
№ 11/11930. Табл. XX, фиг. 9
Auroraella kugusemensis Hacobjan.
№ 15/11930. Табл. XXI, фиг. 2

93. АКОПЯН В. Т., ДЖАЛИЛОВ М. Р., КОРОТКОВ В. А. (колл. № 11661). В кн.: «Берриас Мангышлака. *(Gastropoda)*». «Наука», Л., 1988, с. 156—164, 2 пал. табл.

Монография представляет собой первую крупную сводку результатов комплексного изучения стратиграфии и ископаемых берриаса Мангышлака. Приводится монографическое описание шести групп ископаемых остатков с освещением для каждой группы истории ее изучения, палеогеографических особенностей и роли в обосновании стратиграфического расчленения указанных отложений.

В разделе «Gastropoda» описано 10 видов, один из которых новый.

Голотип:

Nerinea mangyschlakensis Hacobjan et Djalilov.
№ 1/11661. Табл. XXXII, фиг. 1

94. АТАБЕКЯН А. А. (колл. № 12134). К вопросу о сеномане района сел. Иджеван Армянской ССР. Докл. АН Армянской ССР. Т. XVII, № 1, 1953, с. 19—24, 2 пал. табл.

Палеонтологические данные, приведенные в статье, позволяют подтвердить сантонский (а не сеноманский, как считалось ранее) возраст отложений района сел. Иджеван. Описан новый вид рудиста.

Голотип:

Bournonia bobkovae Atabekjan.
№ 1/12134. Табл. I, II

95. АТАБЕКЯН А. А. (колл. № 11355). *Hacobjanella armenica gen. et* sp. nov. *(Rudistae)* из коньяк-сантонских отложений Армянской ССР. Изв. АН Арм. ССР. Науки о Земле. I, 1976, с. 13—18, 2 пал. табл.

Из коньяк-сантонских отложений северо-восточного побережья оз. Севан описан представитель *Rudistae*, выделенный в новый род и новый вид.

Голотип:

Hacobjanella armenica Atabekjan.
№ 1/11355. Табл. I, фиг. 1

96. АТАБЕКЯН А. А. (колл. № 11514). Иноцерамы пограничных слоев сантона и кампана Актюбинской области. В кн.: «Граница сантона и кампана на Восточно-Европейской платформе». АН СССР. Уральск. научн. центр. Тр. Инст. геол. и геохим., вып. 148, Свердловск, 1979, с. 42—60, 4 пал. табл.

Описано 13 представителей родов *Inoceramus* и *Sphenoceramus*. Их видовая принадлежность ставится автором под сомнение, исключая двух, один из которых является новым.

Голотип:

Sphenoceramus papulovi Atabekjan.
№ 7/11514. Табл. II, фиг. 4 *

97. АТАБЕКЯН А. А. (колл. № 9431). Туррилитиды позднего альба и сеномана юга СССР. Наука, Л., 1985, 112 с., 34 пал. табл.

Произведена ревизия известных в мировой литературе таксонов родовой и видовой групп туррилитид позднего альба и сеномана. Описана 31 форма. Два вида и подвид новые. Приведены уточненные диагнозы всех таксонов и их привязка к стратиграфическим разрезам. Дано описание разрезов верхнего альба и сеномана Большого Балхана, Туаркыра и Мангышлака.

Голотипы:

Hypoturrilites primus Atabekjan.
№ 164/9431. Табл. XVI, фиг. 1; табл. XVII, фиг. 1

Hypoturrilites tuberculatus laevisiformis Atab.
№ 101/9431. Табл. XXVI, фиг. 1

Hypoturrilites intersignus.
№ 100/9431. Табл. XXVI, фиг. 7

98. БЕЛЯКОВА Г. М. (колл. № 12552). Новые виды семейств *Trigoniidae* и *Ostreidae* из верхнемеловых отложений Восточной Туркмении и Западного Узбекистана. В кн.: «Фауна мезозоя и кайнозоя Европейской части СССР и Средней Азии». Тр. ВНИГНИ. Вып. XLIV, Недра, М., 1965, с. 128—136, 5 пал. табл.

Новые виды двустворок, описанные из отложений верхнего мела, имеют узкое вертикальное распространение и могут быть использованы при корреляции разрезов. Описано 5 видов, принадлежащих 2-м семействам.

Голотипы:

Korobkovitrigonia gaurdakensis Beliakova.
№ 1/12552 (451). Табл. I, фиг. 1

Megatrigonia khoresmensis Beliak.
№ 3/12552 (438). Табл. I, фиг. 6

Fatina amudariensis.
№ 5/12552 (406). Табл. II, фиг. 1

Lopha (Arctostrea) tagamense.
№ 6/12552 (471). Табл. IV, фиг. 1

Exogyra pitniakensis.
№ 8/12552 (1). Табл. V, фиг. 1

99. БЕЛЯКОВА Г. М. (колл. № 12553). Верхнемеловые *Korobkovitrigonia* центральных областей Средней Азии. В кн.: «Стратиграфия и палеонтология мезозойских и палеогеновых отложений Средней Азии». Тр. ВНИГНИ. Вып. LXIX. «Недра», Л., 1970, с. 24—40, 11 пал. табл.

Наличие представителей рода *Korobkovitrigonia* на различных стратиграфических уровнях верхнемеловых отложений при наблюдавшейся узости вертикального распространения отдельных видов делает эту группу важной в стратиграфическом отношении. Описано 9 видов этого рода, 6 из которых новые.

Голотипы:

Korobkovitrigonia bobkovae Beliakova.
№ 1/12553 (447). Табл. VII, фиг. 2

Korobkovitrigonia rugosa Beliak.
№ 4/12553 (948). Табл. V, фиг. 2

Korobkovitrigonia akkaptschigensis.
№ 9/12553 (924). Табл. IX, фиг. 1
Korobkovitrigonia mediasiatica.
№ 12/12553 (936). Табл. VII, фиг. 1
Korobkovitrigonia tagamensis.
№ 15/12553 (900). Табл. X, фиг. 1
Korobkovitrigonia gissarensis.
№ 17/12553 (835). Табл. XI, фиг. 1

100. БЕЛЯКОВА Г. М. (колл. № 12547). Новые роды и виды древних растений и беспозвоночных СССР. ВНИГРИ. Недра, Л., 1980, с. 146, 157, 158, 160, табл. 30, 34, 36.
Описано 6 видов двустворчатых моллюсков из отложений верхнего мела с территории Узбекской ССР.
В коллекции — 5.

Голотипы:

Inoceramus beschtjulensis Beliakova.
№ 1/12547 (2880/111). Табл. 23, фиг. 1
Plicatula romanowskajae Beliak.
№ 2/12547 (2887/111). Табл. 30, фиг. 19
Plicatula amudariensis.
№ 4/12547 (2675/111). Табл. 36, фиг. 4
Megatrigonia (Apiotrigonia) tagamensis.
№ 5/12547 (1133/111). Табл. 34, фиг. 2

101. БЛАНК М. Я. (колл. № 8337). Атлас верхнемеловой фауны Донбасса. Мин-во высш. и средн. спец. образования Укр. ССР, М., Недра, 1974, с. 118—157, 12 пал. табл.
В разделе «Gastropoda» описано 62 формы, из которых 3 вида новые.

Голотипы:

Sinum konoplanicum Blank.
№ 32/8337. Табл. 45, фиг. 6
Perissoptera mentchicurika.
№ 40/8337. Табл. 47, фиг. 12
Genota savtchinskalaea.
№ 78/8337. Табл. 51, фиг. 3

102. БЛАНК М. Я. (колл. № 11382). Позднемеловые брюхоногие моллюски Корякского нагорья. В сб.: «Палеонтология и стратиграфия Дальнего Востока». Владивосток, 1979, с. 50—63, 2 пал. табл.
Из описанных 20-ти таксонов, принадлежащих 13-ти семействам, автор выделяет 3 новых вида и 5 подвидов.

Голотипы:

Bathrotomaria plana atchajvajamskensis Blank.
№ 1/11382. Табл. IV, фиг. 10

Oonia kamtchatica.
№ 2/11382. Табл. IV, фиг. 1
Promathilda (Clathrobaculus) decussata.
№ 7/11382. Табл. V, фиг. 8
Goniobasis (Cassiopella) gangutica.
№ 11/11382. Табл. V, фиг. 5
Paladmete laevis korjakskensis.
№ 15/11382. Табл. V, фиг. 12
Pseudomaura lirata impenveemsis.
№ 17/11382. Табл. V, фиг. 10
Pseudomaura lirata korjakskenis.
№ 18/11382. Табл. V, фиг. 17
Aporrhais biangulata kamtchatica.
№ 97/11382. Табл. V, фиг. 15

103. БЛАНК М. Я. (колл. № 11382). Остатки брюхоногих моллюсков из верхнемеловых отложений Корякского нагорья. В сб.: «Палеонтология и стратиграфия Дальнего Востока». Владивосток, 1979, с. 115—128, 3 пал. табл.

Описаны остатки 20-ти видов и подвидов плотоядных брюхоногих моллюсков из семи семейств. 7 видов и 8 подвидов — новые.

Голотипы:

Fasciolaria gracilis Blank.
№ 183/11382. Табл. XIV, фиг. 6
Fasciolaria evoides.
№ 185/11382. Табл. XIV, фиг. 6
Fasciolaria ponderosa multistriata.
№ 190/11382. Табл. XIV, фиг. 7
Lirofusus tricostatus.
№ 253/11382. Табл. XV, фиг. 4
Fusinus (Woodsella) korjakensis.
№ 196/11382. Табл. XV, фиг. 2
Bellifusus micrus.
№ 230/11382. Табл. XV, фиг. 15
Bellifusus curvicostatus fustiformis.
№ 206/11382. Табл. XV, фиг. 7
Euthriofusus (Boltenella) convexus anaestriatus.
№ 248/11382. Табл. XV, фиг. 5
Hemifusus pagodicus.
№ 245/11382. Табл. XVI, фиг. 9
Rhombopsis orientalis tuberculatocostatus.
№ 203/11382. Табл. XV, фиг. 17
Drilluta distans elegans.
№ 263/11382. Табл. XV, фиг. 8
Cryptorhytis cheyennensis latus.
№ 265/11382. Табл. XVI, фиг. 8

Cryptorhytis cheyennensis vulgaris.
№ 266/11382. Табл. XVI, фиг. 3
Turricula (Turricula) ornata.
№ 271/11382. Табл. XVI, фиг. 2

104. БЛАНК М. Я. (колл. № 11382). О позднемеловых брюхоногих моллюсках Корякского нагорья. В кн.: «Ископаемые моллюски Дальнего Востока и их стратиграфическое значение». Владивосток, 1980, с. 81—93, 2 пал. табл.

Описано 17 форм из пяти семейств, близких видам других палеозоогеографических провинций. Выделено новых: 7 видов, 5 подвидов.

Голотипы:

Pseudogaleodea monstra Blank.
№ 172/11382. Табл. XIV, фиг. 15
Cassidaria gangutica.
№ 160/11382. Табл. XIV, фиг. 18
Cassidaria dundoensis.
№ 167/11382. Табл. XIV, фиг. 22
Dalium cretacium.
№ 170/11382. Табл. XIV, фиг. 13
Buccinopsis crassa kamtchatica.
№ 202/11382. Табл. XV, фиг. 11
Beringius senior.
№ 173/11382. Табл. XV, фиг. 12
Anomalosipho axialocostatus.
№ 176/11382. Табл. XV, фиг. 10
Odontobasis constricta korjakensis.
№ 180/11382. Табл. XIV, фиг. 14
Anomalofusus substriatus protensus.
№ 283/11382. Табл. XV, фиг. 4
Anomalofusus lemniscatus isostriatus.
№ 273/11382. Табл. XV, фиг. 6
Anomalofusus subnodosus elatus.
№ 292/11382. Табл. XV, фиг. 8
Biplica ovoides.
№ 297/11382. Табл. XV, фиг. 1

105. БОБКОВА Н. Н. (колл. № 11827). Некоторые позднемеловые рудисты Средней Азии. Ежегодн. ВПО, т. XXIV, 1981, с. 90—101, 3 пал. табл.

Приводится описание трех новых видов рудистов маастрихта Средней Азии, а также вида, ранее неизвестного на территории Советского Союза.

Голотипы:

Gyropleura vantshurovi Bobkova.
№ 2/11817. Табл. I, фиг. 2

Gyropleura khushikatensis.
№ 3/11817. Табл. II, фиг. 1
Bournonia jangikudukensis.
№ 4/11817. Табл. II, фиг. 2

106. БОБКОВА Н. Н. (колл. № 11428). Новый вид гироплевр из маастрихта Крыма и некоторые вопросы палеогеографии. Ежегодн. ВПО, т. XXIII, 1980, с. 57—64, табл.
Описанный вид рудиста характерен для отложений верхнего маастрихта Крыма.

Голотип:

Gyropleura krymica Bobkova.
№ 1/11428. Табл., фиг. 1

107. БОГДАНОВА Т. Н. (колл. № 10918). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 4, 1977, М., Наука, с. 38, табл. 12.
Описан 1 вид нукулы из апт-альбских отложений Туаркыра.

Голотип:

Nucula woodsi Bogdanova.
№ 14/10918. Табл. 12, фиг. 3

108. БОГДАНОВА Т. Н. (колл. № 11175). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 5, 1980, М., Наука, с. 17—19, табл. VII.
Два новых вида нукул из отложений нижнего мела (верхний апт) Туаркыра.

Голотипы:

Nucula rostrata Bogdanova.
№ 1/11175. Табл. VII, фиг. 1
Nucula triangulata.
№ 3/11175. Табл. VII, фиг. 3

109. БОГДАНОВА Т. Н. (колл. № 11723). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 5, 1980, М., Наука, с. 26—28, табл. IX.
Описано два вида раннемеловых (н. валанжин) устриц Мангышлака.

Голотипы:

Ceratostreon ? fragilis Bogdanova.
№ 1/11723. Табл. IX, фиг. 5
Picnodonta miranda.
№ 4/11723. Табл. IX, фиг. 8

110. БОГДАНОВА Т. Н. (колл. № 9442). Зона *Deshaysites tuarkyricus* — нижняя зона апта Туркмении. Ежегодн. ВПО, т. XXVI, 1983, с. 128—142, 3 пал. табл.
В нижних горизонтах апта выделена новая зона, содержащая оригинальный комплекс дегезитов. По стратиграфическому по-

ложению она сопоставляется с нижними зонами апта Англии. Описано 5 новых видов.

Голотипы:

Deshayesites tuarkyricus Bogdanova.
№ 1/9442. Табл. I, фиг. 1
Deshayesites weissiformis.
№ 7/9442. Табл. II, фиг. 1
Deshayesites oglanlensis.
№ 12/9442. Стр. 136.
Deshayesites antiquus.
№ 18/9442. Табл. II, фиг. 5
Deshayesites luppovi.
№ 23/9442. Табл. III, фиг. 2

111. БОГДАНОВА Т. Н. (колл. № 11928). В кн.: «Валанжин Мангышлака. (Двустворки)». М., Наука, 1983, с. 72—87, табл. IV—VI. См. № 92.

В разделе «Bivalvia» описано 11 видов, один из них новый.

Голотип:

Plagiostoma lobatschevae Bogdanova.
№ 47/11928. Табл. XVI, фиг. 2

112. БОГДАНОВА Т. Н. (колл. № 11105). В кн.: «Берриас Мангышлака». «Наука», Л., 1988, с. 134—156, 14 пал. табл. См. № 93.

В разделе «Bivalvia» описано 18 форм; 1 вид и 1 подвид являются новыми.

Голотипы:

Buchia sorbulakensis Bogdanova.
№ 44/11105. Табл. XX, фиг. 8
Liostrea germaini mangyschlakensis Bogd.
№ 57/11105. Табл. XXVIII, фиг. 5

113. БУГРОВА Э. М. (колл. № 12046). Новые спирально-плоскостные нодозариды. Палеонт. журн. № 1, 1985, с. 42—51, 1 пал. табл.

Установлен новый род *Turkmenella* для группы спирально-плоскостных нодозариид из мел-палеогеновых отложений Средней Азии. Описано 5 видов, 4 из них новые.

Голотипы:

Turkmenella vernicosa Bugrova.
№ 1/12046. Табл. II, фиг. 1
Turkmenella laticarinata Bugrova.
№ 3/12046. Табл. II, фиг. 4
Turkmenella cyclos.
№ 2/12046. Табл. II, фиг. 5

Turkmenella singularis.
№ 4/12046. Табл. II, фиг. 6

114. ВАСИЛЕВСКАЯ Н. Д. (колл. № 9859). Три новых вида папоротников из нижнемеловых отложений низовьев р. Лены. НИИГА. Сб. статей по палеонт. и биостратигр. Вып. 3, 1957, с. 69—74, 2 пал. табл.

Из трех, наиболее изученных свит угленосных отложений нижнего мела описаны три новых вида папоротников.

Голотипы:

Adiantites gracilis Vassilevskaja.
№ 1/9859 (74/1). Табл. I, фиг. 1
Asplenium rigidum Vassil.
№ 8/5350. (Принада, 1938. Табл. II, фиг. 2).
Sphenopteris petiolipinnulata.
№ 6/9859 (46/12). Табл. II, фиг. 4

115. ВАСИЛЕВСКАЯ Н. Д. (колл. № 9858). Некоторые новые представители хвойных их нижнемеловых отложений северной части Ленского угольного бассейна. НИИГА. Сб. статей по палеонт. и биостратигр. Вып. 6, 1957, с. 84—92, 1 пал. табл.

Описано 5 новых видов хвойных из комплекса ископаемой флоры нижнего мела, имеющих большое значение для стратиграфических построений, наравне с папоротниками и цикадовыми.

Голотипы:

Podozamites gracilis Vassilevskaja.
№ 1/9858 (45/9). Табл. I, фиг. 1
Podozamites olenekensis Vassil.
№ 2/9858 (569). Табл. I, фиг. 2
Podozamites ovalifolius.
№ 3/9858 (56/88). Табл. I, фиг. 3
Pityostrobus gusevi.
№ 5/9858 (108/3). Табл. I, фиг. 5
Schizolepis angustipeduncularis.
№ 8/9858 (56/93). Табл. I, фиг. 8

ВАСИЛЕВСКАЯ Н. Д. (колл. № 9498). См. № 45.

116. ВАСИЛЕВСКАЯ Н. Д. (колл. № 9499). Папоротники из угленосных отложений Сангарского района (Ленский угленосный бассейн). НИИГА. Сб. статей по палеонтол. и биостратигр. Вып. 13, 1959, с. 35—58, 12 пал. табл.

В статье описано 16 видов папоротников из меловых отложений, обнажающихся по рекам Чечума и Леписке. Три из описанных являются новыми видами, один — новой разновидностью[1]. Вид *Cladophlebis lobifolia (Phill)* Brongn впервые встречен в нижнемеловых отложениях Ленского бассейна.

Голотипы:

Cladophlebis aldanensis var. *angusta* Vassilevskaja.
№ 1/9499 (1068/1). Табл. I, фиг. 1 [1]
Cladophlebis ambiqua Vassil.
№ 6/9499 (2288/3). Табл. III, фиг. 1
Cladophlebis decipiens.
№ 17/9499 (2288/1). Табл. V, фиг. 5
Scleropteris sibirica.
№ 47/9499 (1в). Табл. XII, фиг. 3

117. ВАСИЛЕВСКАЯ Н. Д. (колл. № 9500). Кейтониевые и цикадофиты из угленосных отложений Сангарского района (Ленский угленосный бассейн). НИИГА. Сб. статей по палеонтол. и биостратигр. Вып. 14, 1959, с. 48—67, 10 пал. табл.

Коллекция из меловых отложений Сангарского района состоит из представителей кейтониевых (1) и цикадофитов (16). Выделено 5 новых видов; 4 формы даны в открытой номенклатуре. Один новый вид в коллекции отсутствует.

Голотипы:

Ctenis jacutensis Vassilevskaja.
№ 6/9500 (3/81). Табл. I, фиг. 8
Nilssonia viluensis Vassil.
№ 13/9500 (2350/4). Табл. V, фиг. 1
Tyrmia acuta.
№ 34/9500 (3/64). Табл. IX, фиг. 1
Pseudoctenis zamiophylloides.
№ 27/9500 (3/23). Табл. VII, фиг. 6

ВАСИЛЕВСКАЯ Н. Д. (колл. № 9501). См. № 46.

118. ВАСИЛЕВСКАЯ Н. Д. (колл. № 8502). Новый вид папоротника *Yacutopteris* gen. nov. из нижнемеловых отложений Якутии. НИИГА. Сб. статей по палеонтол. и биостратигр. Вып. 22, 1960, с. 63—66, 2 пал. табл.

Папоротник, описанный в работе, является представителем нового рода. Отпечатки его происходят из кюсюрской свиты — нижней части угленосных отложений, из разреза левобережья Лены ниже устья р. Тигне.

Голотип:

Yacutopteris lenaensis Vassilevskaja.
№ 6/9502 (11ж—20). Табл. I, фиг. 6

119. ВАСИЛЕВСКАЯ Н. Д. (колл. № 9533). Гинкговые из нижнемеловых отложений низовьев реки Лены (Булунский район Ленского угленосного бассейна). В сб.: «Палеонтология и биостратиграфия Советской Арктики». Тр. НИИГА. Т. III, 1960, с. 150—181, 9 пал. табл.

[1] Эта форма происходит из низов джаскойской свиты (J_2).

Гинкговые, описываемые в работе, происходят из ранее не исследовавшихся местонахождений и приурочены к трем свитам разреза, для каждой из которых характерен определенный комплекс растений. Всего описан 21 вид, 3 из которых являются новыми.

Голотипы:

Ginkgo angusticuneata Vassilevskaja.
№ 34/9533 (56/33). Табл. III, фиг. 5
Baiera tripartita Vassil.
№ 46/9533 (86). Табл. V, фиг. 2
Phoenicopsis acutifolia.
№ 66/9533 (93/3). Табл. III, фиг. 9

120. ВАСИЛЕВСКАЯ Н. Д. (колл. № 9598). Некоторые раннемеловые растения Жиганского района (Ленский угленосный бассейн). Уч. зап. НИИГА. Палеонт. и биостратигр. Вып. 15, Л., 1966, с. 49—75, 7 пал. табл.

Описано 20 форм ископаемых растений из отложений неокома и апт-альба. Ввиду отсутствия стратиграфической схемы района, более детального расчленения толщ автор не приводит. Из комплекса описываемой флоры выделено 4 новых вида.

Голотипы:

Adiantopteris minimus Vachrameev et Vassilevskaja.
№ 5/9598 (111—1). Табл. I, фиг. 5
Hausmannia undulata Vassil.
№ 7/9598 (503—86). Табл. II, фиг. 2
Taeniopteris obliquus.
№ 17/9598 (153—2). Табл. IV, фиг. 2
Taeniopteris pocrovskii.
№ 13/9598 (503—86). Табл. III, фиг. 5.

121. ВАСИЛЕВСКАЯ Н. Д., АБРАМОВИЧ Л. Н. (колл. № 9598). Материалы к познанию раннемеловой флоры Ленского бассейна. Уч. зап. НИИГА. Палеонт. и биостратигр. Вып. 16, Л., 1966, с. 73—93, 8 паал. табл.

Описано 15 видов раннемеловых растений из различных частей разрезов разных районов Ленского бассейна. Большинство растений являются новыми видами или впервые описываются из данных разрезов. Новых видов — 8.

Голотипы:

Tyrmia prynadae Vassilevskaja[1]
Ctenis tigyensis Vassil. et Abramova.
№ 30/9598 (11ж—74). Табл. III, фиг. 4

[1] Голотип см. Самылина В. А., 1963. Палеоботаника, вып. IV, табл. XXII, фиг. 5, 6.

Pseudoctenis zamiophylloides rarinervis Vassil.
№ 36/9598 (77). Табл. III, фиг. 1
Ginkgo parvula.
№ 37/9588 (39в—з). Табл. VI, фиг. 2
Sphenobaiera flabellata.
№ 40/9588 (38—1—20). Табл. V, фиг. 1
Elatocladus ketovae.
№ 45/9588 (123Н—3). Табл. VIII, фиг. 2
Pityospermum attenuatum.
№ 47/9588 (8ц—1). Табл. VIII, фиг. 5
Conites compactus.
№ 48/9588 (39б—8). Табл. VIII, фиг. 4
Ixostrobus laxus.
№ 50/9588 (118д). Табл. VIII, фиг. 6

122. ВАСИЛЕВСКАЯ Н. Д. (колл. № 9598). Раннемеловые папоротники Лено-Оленекского района Ленского бассейна. Уч. зап. НИИГА. Палеонт. и биостратигр. Вып. 17, Л., 1967, с. 58—78, 8 пал. табл.

Приведено описание восьми новых видов папоротников из нижнемеловых отложений обширной территории. Подробные сведения о стратиграфии и флоре приведены в совместной работе автора и В. В. Павлова (Тр. НИИГА. Т. 128, Л., 1963). В случае, когда голотип изображен в упомянутой работе, на нее дается ссылка с указанием таблицы и фигуры.

Голотипы:

Coniopteris compressa Vassilevskaja.
№ 54/9598 (60и). Табл. I, фиг. 1
Coniopteris vachrameevi Vassil.
№ 93/9598 (1963, табл. XXXII, фиг. 5, 6)
Arctopteris lenaensis.
№ 59/9598 (679—д). Табл. II, фиг. 1
Cladophlebis gluschinskii.
№ 65/9598 (111—е—1). Табл. V, фиг. 1
Cladophlebis monstrosus.
№ 66/9598 (41а). Табл. IV, фиг. 1
Cladophlebis tigyensis.
№ 70/9598 (11ж—72). Табл. III, фиг. 2
Scleropteris ermolaevii.
№ 74/9598 (1555—Р). Табл. VII, фиг. 3
Sphenopteris ukinensis.
№ 76/9598 (232а). Табл. VIII, фиг. 4

123. ВАСИЛЕВСКАЯ Н. Д. (колл. № 8494). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. II, часть I, М. Недра, 1968, с. 49—51.

Описан один вид вновь устанавливаемого рода из отложений нижнего мела в дельте р. Лены.

Голотип:

Adiantopteris polymorpha Vassilevskaja.
№ 1/8494 (106/0). Табл. 16, фиг. 2

124. ВАСИЛЕВСКАЯ Н. Д., ПАВЛОВ В. В. (колл. № 9534). Новый раннемеловой представитель *Eboracia* Приверхоянья. Ежегодн. ВПО, т. XVIII, 1968, с. 322—324, 1 пал. табл.

Описан новый вид рода *Eboracia* из апт-альбских отложений Ленского бассейна. Изучены не только макроостатки этого растения, но также и споры, извлеченные из спорангиев.

Голотип:

Eboracia variabile Vassilevskaja et Pavlow.
№ 1/9534 (503—51—1). Табл. I, фиг. 1

125. ВАСИЛЕВСКАЯ Н. Д. (колл. № 12042). К флористической характеристике нижнемеловых отложений бассейна реки Индигирки. Сб.: «Мезозойские отложения Северо-Востока СССР». НИИГА, Л., 1977, с. 30—42, 4 пал. табл.

Описано три новых вида из флористического комплекса в нижнемеловых отложениях (буоркюмесская и силяпская свиты).

Голотипы:

Osmunda (?) *ambigua* Vassilevskaja.
№ 2/12042 (138—2). Табл. I, фиг. 2, 3
Phoenicopsis parva Vassil.
№ 3/12042 (112—4). Табл., фиг. 1
Pseudotorellia (?) *emarginata.*
№ 20/12042 (165—9—6). Табл. V, фиг. 8б

126. ВАСИЛЕВСКАЯ Н. Д. (колл. № 12041). Раннемеловая флора острова Котельного. Сб.: «Мезозойские отложения Северо-Востока СССР». НИИГА, Л., 1977, с. 57—75, 8 пал. табл.

Описываются растительные остатки из угленосных отложений балыктахской свиты (бассейн реки Балыктах), подтвердившие раннемеловой возраст толщи. Приводится описание 6-ти видов. Устанавливается новый род и 4 новых вида.

Голотипы:

Ginkgoites volnovii Vassilevskaja.
№ 13/12041 (3149). Табл. III, фиг. 2
Pityophyllum arcticum Vassil.
№ 31/12041 (215д). Табл. VI, фиг. 2
Desmiophyllum rigidum.
№ 33/12041 (848—7). Табл. VII, фиг. 3, 4
Alatispermum malandinii.
№ 35/12041 (3308—2). Табл. VIII, фиг. 1, 4, 8

127. ВАСИЛЕВСКАЯ Н. Д. (колл. № 12043). Новые меловые папоротники Чукотки и Корякского нагорья. Палеонт. журн. № 2, 1977, с. 122—128, 1 пал. табл.

Описаны два новых вида из отложений альба Чукотки и из сенона Корякского нагорья. Установлен новый род — *Tchucotopteris*.

Голотипы:

Tchucotopteris ustinovii Vassilevskaja.
№ 1/12043 (0—А—1). Табл. XII, фиг. 1
Arctopteris rarytkinensis Vassil.
№ 3/12043 (298—2). Табл. XII, фиг. 5

128. ВАСИЛЕВСКАЯ Н. Д. (колл. № 11165). Раннемеловая флора острова Шпицберген. В кн.: «Геология осадочного чехла архипелага Свальбард. НИИГА. Л., 1980, с. 61—69, 6 пал. табл.

Приведены комплексы раннемеловой флоры, отмечено сходство с одновозрастными флорами Земли Франца-Иосифа и низовьев Лены. Описаны новые комбинации двух растений (папоротника и голосеменного).

Синтипы:

Arctopteris arcticus (Heer) Vassilevskaja.
№ 3/11165. Табл. I, фиг. 3
№ 4/11165. Табл. I, фиг. 4
Desmiophyllum acutifolium (Vassilevskaja) Vassilevsk.
№ 38/11165. Табл. VI, фиг. 1
№ 39/11165. Табл. VI, фиг. 2

129. ВАСИЛЕВСКАЯ Н. Д. (колл. № 12379). Новый раннемеловой папоротник *Hausmannia* из района кряжа Прончищева. В кн.: «Стратиграфия и палеонтология мезозойских осадочных бассейнов Севера СССР». ПГО «Севморгеология», Л., 1985, с. 108—111, 2 пал. табл.

По остаткам спороносных листьев описан новый вид папоротника. Из спорангиев выделены и изучены споры.

Голотип:

Hausmannia bobrovii Vassilevskaja et Pavlov.
№ 1/12379. Табл. I и II

130. ВЕРЕЩАГИН В. Н. и др. (колл. № 11799). Полевой атлас меловой фауны Северо-Востока СССР. Магадан, 1965.

Атлас содержит описание и изображения стратиграфически важных и наиболее распространенных в меловых отложениях Северо-Востока СССР двустворчатых (69) и головоногих (55) моллюсков. Дается схема биостратиграфии отложений мела в регионе. Из описанных форм выделено 12 новых видов двустворчатых и головоногих моллюсков, 11 из которых в коллекции отсутствуют.

Синтипы:

Aspinoceras kajgorodzevi Vereshagin.
№ 1/11799. Табл. 12, фиг. 1
№ 2/11799. Табл. 12, фиг. 2

131. ГЛАЗУНОВА А. Е. (колл. № 8195). Новая подзона в альбских отложениях Дагестана. Тр. ВСЕГЕИ. Палеонт. и стратигр. Сб. статей, 1953, с. 41—52, 2 пал. табл.

В альбских отложениях Дагестана обнаружены комплексы видов аммонитов, не встречавшиеся ранее на территории Северного Кавказа. На основе изучения этой фауны автором разработана детальная схема расчленения отложений и выделена новая подзона. Приведена корреляционная схема альбских отложений Дагестана и Копет-Дага. Описано 2 новых вида нового подрода.

Голотипы:

Anahoplites (Daghestanites) daghestanensis Glasunova.
№ 1/8195. Табл. I, фиг. 2
Anahoplites (Daghestanites) burgensis Glasun.
№ 5/8195. Табл. I, фиг. 5; табл. II, фиг. 2

132. ГЛАЗУНОВА А. Е. (колл. № 9914). О новых маастрихтских устрицах Русской платформы и Зауралья. Межведомств. республ. научн. сборник № 3, вып. 1. Львов, 1966, с. 40—43, 4 пал. табл.

Произведен критический разбор группы *Gryphaea vesicularis* Lam. На основе изучения материалов из двух регионов автор подразделяет сенонские устрицы на три группы: относящиеся к роду *Gryphaea* и отделившиеся от него два подрода — *Pycnodonta Fisch.* и *Volgaea subgen.* nov. Описано 3 новых вида.

Голотипы и синтипы:

Gryphaea (Pycnodonta) zauralica Glasunova.
№ 6/9914. Табл. II, фиг. 1
Gryphaea (Volgaea) volgo-donica Glasun.
№ 8/9914. Табл. II, фиг. 3
№ 9/9914. Табл. III, фиг. 1
Lopha (Lopha) sibirica.
№ 12/9914. Табл. IV, фиг. 3
№ 13/9914. Табл. IV, фиг. 4

133. ГЛАЗУНОВА А. Е. (колл. № 10857). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 5, М., «Наука», 1980, с. 24, табл. VIII, IX.

Описано 3 вида устриц из отложений маастрихта Восточного Приуралья.

Голотипы:

Ostrea tecticostatoides Glasunova.
№ 1/10857. Табл. IX, фиг. 1
Liostrea francliniformis Glasun.
№ 3/10857. Табл. VIII, фиг. 6
Liostrea oxianiformis.
№ 5/10857. Табл. IX, фиг. 3

134. ЕФРЕМОВА В. И. (колл. № 10123). Иноцерамы туронских отложений Усть-Енисейской впадины. В кн.: «Иноцерамы юры и мела и их стратиграфическое значение». ГИН АН, М., 1978, с. 82—98, 5 пал. табл.

Приведены описания десяти видов иноцерамов, восемь из которых являются новыми, а два — известные ранее, впервые обнаружены в Усть-Енисейской впадине.

Голотипы:

Inoceramus paralamarcki Efremova.
№ 2/10123. Табл. I, фиг. 1
Inoceramus schulginae.
№ 8/10123. Табл. II, фиг. 3
Inoceramus pogrebovi.
№ 4/10123. Табл. II, фиг. 1
Inoceramus kolokolcevae.
№ 1/10123. Табл. III, фиг. 1
Inoceramus monopterus.
№ 14/10123. Табл. IV, фиг. 1
Inoceramus magnus.
№ 15/10123. Табл. IV, фиг. 3
Inoceramus jangodaensis.
№ 16/10123. Табл. V, фиг. 1
Inoceramus ecostatus.
№ 19/10123. Табл. V, фиг. 3

135. ЗОНОВА Т. Д. (колл. № 11624). Новые представители коньякских иноцерамид Дальнего Востока и описание их связочных полосок. Ежегодн. ВПО, т. XXII, 1979, с. 11—18, 3 пал. табл.

Описан новый вид иноцерама из отложений коньякского яруса бассейна реки Пенжимы, а также установлены и описаны два новых типа связочных полосок.

Голотип:

Inoceramus perpendicularicus Zonova.
№ 1/11624. Табл. I, фиг. 1

136. ЗОНОВА Т. Д. (колл. № 10841). Новые роды и виды древних растений и беспозвоночных СССР. ВНИГРИ. Л., Недра, 1980, с. 143—147, табл. 31—35.

Из верхнемеловых отложений Сахалина описано 5 видов иноцерамид.

Голотипы:

Inoceramus pressulus Zonova.
№ 1/10841. Табл. 33, фиг. 6
Inoceramus capitatus.
№ 2/10841. Табл. 31, фиг. 3
Inoceramus schuvaevi.
№ 3/10841. Табл. 35, фиг. 2
Inoceramus latruncularius Salnikova et Zonova.
№ 4/10841. Табл. 32, фиг. 3
Inoceramus schutovae Zonova.
№ 1/10786 [1]

137. ЗОНОВА Т. Д., САЛЬНИКОВА Н. Б. (колл. № 11170). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 5. М., Наука, 1980, с. 21—22, табл. VIII.

Новый вид иноцерама описан из отложений верхнего мела острова Шикотан.

Голотип:

Inoceramus delfinensis Zonova et Salnikova.
№ 1/11170. Табл. VIII, фиг. 3

138. ЗОНОВА Т. Д. (колл. № 11655). Представители альбских иноцерамид на Дальнем Востоке и описание их связочных полосок. В кн.: «Ископаемые моллюски Дальнего Востока и их стратиграфическое значение». Владивосток, 1980, с. 10—18, 4 пал. табл.

Описаны: новый подрод и 4 новых типа связочных полосок. Рассматривается возможность использования связочных полосок для определения синхронности отложений и их корреляции.

Голотип:

Inoceramus anglicus omutnensis Zonova.
№ 1/11655. Табл. V, фиг. 1

139. ЗОНОВА Т. Д. (колл. № 11790). Меловые иноцерамиды Сихотэ-Алиня и Нижнего Приамурья. В кн.: «Новые данные по стратиграфии и палеогеографии Дальнего Востока». Владивосток, 1982.

Проведена корреляция меловых отложений северных отрогов хр. Сихотэ-Алинь и Нижнего Приамурья с их аналогами о-ва Сахалин и Корякского нагорья. Установлен их сеноманский возраст. Описано 7 видов иноцерамид. Выделены 2 новых вида и подвид.

[1] Для данной работы этот вид не является новым, т. к. был опубликован в Ежег. ВПО, т. XX, 1977 и вошел в 1-ый выпуск настоящего каталога.

Голотипы:

Inoceramus tuganinensis Vereshagin et Zonova.
№ 1/11790. Табл. I, фиг. 1
Inoceramus sichotealinensis Zonova.
№ 5/11790. Табл. III, фиг. 1
Inoceramus sichotealinensis declinatus.
№ 13/11790. Табл. IV, фиг. 2

140. ЗОНОВА Т. Д. (колл. № 11886). Связочный аппарат нового вида иноцерама из пенжинской свиты Северо-Востока. Ежегодн. ВПО, т. XXV, 1982, с. 244—248, 3 пал. табл.

Доказывается необходимость изучения связочного аппарата иноцерамид — признака, являющегося основным при разработке систематики двустворчатых моллюсков. Описывается новый вид и его связочный аппарат.

Голотип:

Inoceramus submametensis Zonova.
№ 1/11886. Табл. I, фиг. 1

141. ЗОНОВА Т. Д. и др. (колл. № 10693). В кн.: «Опорный разрез меловых отложений Сахалина (Найбинский разрез). Иноцерамиды». Наука, Л., 1987, с. 105—129, 19 пал. табл.

Найбинский разрез является наиболее полным на Дальнем Востоке как по непрерывности залегания пород, так и по богатству и разнообразию фауны. В работе, кроме стратиграфической части, даны описания 4-х групп ископаемых организмов. В разделе «Иноцерамиды» описан 41 вид, три из которых являются новыми.

Голотипы:

Sachalinoceramus subsachalinensis Zonova.
№ 353/10693. Табл. XV, фиг. 2
Sachalinoceramus subbroncus.
№ 347/10693. Табл. XV, фиг. 5
Ordinatoceramus bicentralis.
№ 326/10693. Табл. XIV, фиг. 9

142. ЗОНОВА Т. Д. (колл. № 12523). Заметка о меловых иноцерамах с оз. Удыль и из бассейна р. Анюй (Нижнее Приамурье). Ежегодн. ВПО, т. XXXII, 1989, с. 280—283, 2 пал. табл.

Описан новый вид иноцерама с оз. Удыль и два экземпляра *Inoceramus colonicus* из готеривских отложений басс. р. Анюй.

Голотип:

Inoceramus udylensis Zonova.
№ 1/12523. Табл. I, фиг. 1

143. КАЗИНЦОВА Л. И. (колл. № 12191). Новые позднемеловые насселлярии (радиолярии) Малого Кавказа. Палеонтол. сб. № 22, Львов, 1985, с. 5—10, 1 пал. табл.

Впервые на территории Советского Союза в отложениях позднего мела обнаружены крупные многокамерные губчатые скелеты насселлярий, резко отличающиеся от известных ранее форм. Описаны новый род и 6 новых видов.

Голотипы:

Dictyomitra sevanensis Kasinzova.
№ 1/12191 (8а/490). Табл., фиг. 1
Grandcapsula spongiosa.
№ 2/12191 (207/490). Табл., фиг. 2
Obesacapsula satiani.
№ 3/12191 (217е/490). Табл., фиг. 3
Obesacapsula maximusa.
№ 4/12191 (311/432). Табл., фиг. 4
Spongocapsula crassiparia.
№ 5/12191 (179/490). Табл., фиг. 5
Spongocapsula vialovi.
№ 6/12191 (816/409). Табл., фиг. 6

144. КВАХАДЗЕ Н. Н., ЛОБАЧЕВА С. В. (колл. № 11469). О новом готеривском представителе *Sellithyris* (брахиоподы). Ежегодн. ВПО, т. XXIV, с. 261—264, 2 рис.

Описан новый вид, обнаруженный в отложениях валанжин-готерива трех местонахождений Западной Грузии.

Голотип:

Sellithyris plicata Kvakhadze et Lobatscheva.
№ 1/11469. Рис. 2, фиг. а—г

145. КРИШТОФОВИЧ А. Н. (колл. № 4744). Цветок из меловых отложений Ферганы. Матер. ВСЕГЕИ. Общ. сер. Сб. 4, 1940, с. 85—86, 1 пал. табл.

Описан новый вид ископаемого растения, цветок которого был обнаружен среди других, частью неопределимых отпечатков у сел. Исфары.

Голотип:

Palacanthus roxanae Kryshtofovich.
№ 1/4744. Табл. I, фиг. 1

146. КРИШТОФОВИЧ А. Н. (колл. № 5038). Открытие верхнемеловых цагаянских отложений с растительными остатками в верховьях Буреи. Матер. ЦНИГРИ. Сб. № 3, 1938, с. 92—94, 1 пал. табл.

Небольшая коллекция растительных остатков убедительно доказывает цагаянский (верхнемеловой) возраст заключающих эти остатки отложений. Описано 5 видов, 1 из которых является новым.

Голотип:

Zizyphus (?) *fothergilloides* Kryshtofovich.
№ 4/5038. Табл. I, фиг. 4

КРИШТОФОВИЧ А. Н. (колл. № 12488). См. № 53.

147. ЛИПМАН Р. Х. (колл. № 7767). Новые виды радиолярий Северной Камчатки. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 129. Биостр. сб., вып. 3, 1967, с. 89—95, 4 пал. табл.

Описано 2 новых вида радиолярий, наиболее часто встречающихся в вочвинской свите, выделенной из толщи кремнисто-вулканогенных пород Корякско-Камчатской области. Возраст свиты окончательно не установлен, но автор склонен отнести ее к палеогену.

Голотипы:

Cromyosphaera vivenkensis Lipman.
№ 2/7767. Табл. I, фиг. 3
Cromyosphaera tschurini.
№ 9/7767. Табл. I, фиг. 10

148. ЛОБАЧЕВА С. В. (колл. № 9575). О раннемеловых морских ежах рода *Epiaster* Туркмении. Ежегодн. ВПО, т. XVIII, 1968, с. 268—281, 2 пал. табл.

Описано пять видов морских ежей указанного рода из аптальбских отложений Туркмении. Приводится таблица распространения представителей рода в нижнем мелу региона. Выделен новый вид.

Голотип:

Epiaster luppovi Lobatscheva.
№ 6/9575. Табл. I, фиг. 3

149. ЛОБАЧЕВА С. В. (колл. № 9360). Представители рода *Toxaster L.* Agassiz из неокома Копет-Дага и Большого Балхана. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 46, 1961, с. 151—167, 3 пал. табл.

Изученные морские ежи рода *Toxaster* наряду с другими палеонтологическими остатками из отложений неокома Копет-Дага позволяют обосновать возраст различных горизонтов указанных регионов. Описано 9 форм, два вида из которых являются новыми и могут также иметь стратиграфическое значение, т. к. встречаются в большом количестве и приурочены к определенным горизонтам.

Голотипы:

Toxaster turkmenicus Lobatscheva.
№ 6/9360. Табл. II, фиг. 1
Toxaster balkhanensis Lobatsch.
№ 8/9360. Табл. II, фиг. 3

150. ЛОБАЧЕВА С. В. (колл. № 11176). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 5. М., Наука, 1980, с. 68—72, табл.

Описано 3 вида брахиопод из отложений нижнего мела Мангышлака.

Голотипы:

Torquirhynchia portentosa Lobatscheva.
№ 1/11176. Табл. XIX, фиг. 5
Praecyclothyris berriasensis Lobatsch.
№ 4/11176. Табл. XIX, фиг. 6
Praecyclothyris pennata.
№ 8/11176. Табл. XIX, фиг. 8

151. ЛОБАЧЕВА С. В. (колл. №№ 11106, 11929). В кн.: «Валанжин Мангышлака (Брахиоподы)». М., Наука, 1983, с. 34—49, табл. IV—VI. См. № 92.

В разделе «Brachiopoda» описано 8 видов, один вид и один подвид из которых являются новыми.

Голотипы:

Sellithyris uniplicata mangyschlakensis Lobatscheva.
№ 12/11106. Табл. IV, фиг. 2
Sellithyris bogdanovae Lobatsch.
№ 65/11106. Табл. IV, фиг. 6

152. ЛОБАЧЕВА С. В. (колл. № 11911). Брахиоподы нижнего мела юго-западных отрогов Гиссарского хребта. Бюлл. МОИП, т. 58, вып. 5, 1983, с. 100—110, 1 пал. табл.

В статье, рассматривающей распространение брахиопод в разрезе нижнемеловых отложений района, описано 5 видов этих ископаемых. Один вид выделен как новый.

Голотип:

Oblongarcula (?) *gaurdakensis* Lobatscheva.
№ 22/11911. Табл. I, фиг. 6

153. ЛОБАЧЕВА С. В. (колл. № 12075). О берриасских брахиоподах Крыма. Ежегодн. ВПО, т. XXVI, 1983, с. 184—200, 3 пал. табл.

Монографическое изучение комплексов брахиопод с учетом имеющихся литературных данных дает возможность проследить их изменения по разрезу, выявить комплексы видов, характерных для определенных стратиграфических подразделений и идентифицировать их с берриасскими отложениями других регионов. Описано три вида, являющихся новыми.

Голотипы:

Monticlarella (?) *korlukensis* Lobatscheva.
№ 19/12075. Табл. II, фиг. 6

Belbekella mutabilis Lobatsch.
№ 10/12075. Табл. I, фиг. 10
Belbekella minor.
№ 13/12075. Табл. I, фиг. 13

154. ЛОБАЧЕВА С. В. (колл. № 11106). В кн.: «Берриас Мангышлака». «Наука», Л., 1988, с. 74—111, 7 пал. табл. См. № 93.
В разделе «Brachiopoda» описано 20 форм. Выделено 8 новых видов, один из которых принадлежит А. С. Моисееву.

Голотипы:

Septaliphoria ornata Lobatscheva.
№ 43/11106. Табл. VI, фиг. 1
Septaliphoria kekilensis Moisseev.
№ 281/4802. Табл. IV, фиг. 9
Septaliphoria luppovi Lobatsch.
№ 20/11106. Табл. V, фиг. 1
Septaliphoria orbiculata.
№ 25/11106. Табл. V, фиг. 4
Septaliphoria ovalis.
№ 33/11106. Табл. V, фиг. 8
Septaliphoria pentagonalis.
№ 405/11106. Табл. VII, фиг. 1
Septaliphoria andrussovi.
№ 510/11106. Табл. VII, фиг. 3
Tropeothyris oblongatus.
№ 71/11106. Табл. X, фиг. 1

155. ЛУППОВ Н. П. (колл. № 12047). Два новых вида тригоний из неокомских отложений Мангышлака. Тр. Геол. инст. АН СССР. Т. II, 1932, с. 187—194, 2 пал. табл.
Описаны 2 новых вида тригоний из неокома Мангышлака, отнесенные автором предположительно к отложениям готеривского яруса.

Голотипы:

Trigonia jakshy-saurensis Luppov.
№ 1/12047. Табл. II, фиг. 1—3
Trigonia mangyshlakensis.
№ 2/12047. Табл. I, фиг. 3

156. ЛУППОВ Н. П. (колл. № 6801). Атлас руководящих форм ископаемых фаун СССР. Т. X — Нижний мел. М., Госгеолиздат, 1949, с. 222, 230.
В разделе «Cephalopoda» Н. П. Лупповым описано 7 новых видов и вариететов. В коллекции имеются только два.

Голотипы:

Protacanthodiscus transcaspius Luppov.
№ 10/6801. Табл. LXIV, фиг. 4

Acanthoplites (Colombiceras) crassicostatus var. *caucasica.*
№ 16/6801. Табл. LXVII, фиг. 1

157. ЛУППОВ Н. П. (колл. № 9327). Об аммонитах из нижнемеловых отложений юго-западных отрогов Гиссарского хребта. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 46, вып. 2, 1961, с. 175—205, 6 пал. табл.

Статья посвящена описанию нижнемеловых аммонитов, обосновывающих нижнебарремский и альбский возраст отложений. Описано 16 форм, выделено 4 новых вида.

Голотипы:

Hypacanthoplites karlukensis Luppov.
№ 10/9327. Табл. II, фиг. 4
Cleoniceras kugitangense Lup.
№ 13/9327. Табл. III, фиг. 2
Anahoplites (?) *baisunensis.*
№ 18/9327. Табл. VI, фиг. 1
Epihoplites trapezoidalis.
№ 19/9327. Табл. IV, фиг. 1

158. ЛУППОВ Н. П. (колл. № 11927). В кн.: «Валанжин Мангышлака. (Аммониты)». М., Наука, 1983, с. 49—72, табл. VII—X. См. № 92.

В разделе «Cephalopoda» описано 17 видов, в том числе 4 новых.

Голотипы:

Polyptychites kugusemicus Luppov.
№ 7/11927. Табл. VIII, фиг. 2
Dichotomites (?) *toryschensis* Lup.
№ 13/11927. Табл. VII, фиг. 5
Dichotomites (?) *mangyschlakensis.*
№ 14/11927. Табл. VIII, фиг. 4
Valanginites (?) *mangyschlakensis.*
№ 17/11927. Табл. IX, фиг. 3

159. ЛУППОВ Н. П., ПРОЗОРОВСКИЙ В. А. (колл. № 11375). О нижнем готериве Большого Балхана. Ежегодн. ВПО, т. XXVI, 1983, с. 105—123, 3 пал. табл.

Изученные раннеготеривские аммониты, собранные из разреза Большого Балхана, уточнили границу валанжина и готерива Туркмении. Из четырех описанных видов один является новым.

Голотип:

Endemoceras balkhanicum Luppov.
№ 3/11375. Табл. I, фиг. 1

160. ЛУППОВ Н. П. (колл. № 11104). В кн.: Берриас Мангышлака. «Наука», Л., 1988, с. 111—134, 5 пал. табл. См. № 93.

В разделе «Cephalopoda» описано 24 формы. Четыре вида являются новыми.

Голотипы:

Subalpinites bajarunasi Luppov.
№ 9/11104. Табл. XIV, фиг. 7
Subalpinites mangyschlakensis Lupp.
№ 12/11104. Табл. XVI, фиг. 1
Jabronella (?) *karaciasensis.*
№ 13/11104. Табл. XVI, фиг. 3
Riasanites bogoslowskii.
№ 69/623 (Богословский, 1895, с. 104, табл. VI, фиг. 6)

161. МАРТИНСОН Г. Г. (колл. № 12225). Биостратиграфия и фауна меловых континентальных отложений Таджикской депрессии, Кызылкумов и Приташкентских чулей. В кн.: «Континентальные образования восточных районов Средней Азии и Казахстана». Л., Наука, 1969, с. 18—49, 5 пал. табл.

Дается обзор местонахождений пресноводной фауны в пределах региона, уточнены вопросы биостратиграфии континентальных отложений мела, приведено описание 22-х видов двустворчатых моллюсков, из них новых — 11 видов и 2 подвида.

Голотипы и синтипы:

Trigonioides hissariensis Martinson.
№ 2/12225 (122—59). Табл. I, фиг. 3
Pseudohyria rotunda Martins.
№ 3/12225 (365—64). Табл. I, фиг. 9
Pseudohyria babatagensis.
№ 5/12225 (366—64). Табл. I, фиг. 4
Pseudohyria javanica.
№ 7/12225 (65—65). Табл. I, фиг. 6
Pseudohyria kysylkumaensis.
№ 16/12225 (19—65). Табл. II, фиг. 6
Pseudohyria kysylkumaensis aralica.
№ 1/12225 (121—65). Табл. II, фиг. 8
Pseudohyria pjanovskai.
№ 19/12225 (122—65). Табл. III, фиг. 1
Pseudohyria gobiensis itemirica.
№ 24/12225 (22—65). Табл. III, фиг. 6
Limnocyrena pusilloides.
№ 34/12225 (40—65). Табл. V, фиг. 9
Limnocyrona hissarica.
№ 35/12225. Табл. V, фиг. 10
№ 36/12225. Табл. V, фиг. 11

162. МАРТИНСОН Г. Г. (колл. № 12226). Биостратиграфия и фауна континентального мела Ферганы. В кн.: «Меловые кон-

тинентальные отложения Ферганы». М.—Л., Наука, 1965, с. 101—154, 10 пал. табл.

Пресноводная фауна встречается в различных частях Ферганского разреза, что значительно облегчает уточнение стратиграфии осадочных образований. Наиболее распространены раковины пластинчатожаберных, систематический состав которых описан в работе в количестве 24-х видов, из них 12 новых видов и 3 подвида.

Голотипы и синтипы:

Trigonioides kodairaiformis Martinson.
№ 1/12226 (113—61a). Табл. I, фиг. 1
№ 2/12226 (113—61b). Табл. I, фиг. 5
№ 3/12226 (113—6d). Табл. I, фиг. 4
№ 4/12226 (113—61a). Табл. I, фиг. 3

Pseudohyria cardiiformis ferganensis Martins.
№ 6/12226 (34—62a). Табл. II, фиг. 1
№ 7/12226 (34—62b). Табл. II, фиг. 2
№ 8/12226 (34—62c). Табл. II, фиг. 3

Pseudohyria mongolensis radiatus.
№ 13/12226 (85—62). Табл. III, фиг. 2

Pseudohyria tachtamyshensis.
№ 15/12226 (341—182). Табл. III, фиг. 4
№ 16/12226 (341—182c). Табл. III, фиг. 5

Pseudohyria mujanica.
№ 17/12226 (34—63a). Табл. III, фиг. 6
№ 18/12226 (34—63). Табл. III, фиг. 7

Pseudohyria triangularis.
№ 19/12226 (40—337). Табл. I, фиг. 10

Plicatotrigonioides simakovi robustus.
№ 26/12226 (24—63). Табл. V, фиг. 2

Plicatotrigonioides kuramensis.
№ 27/12226 (21—63a). Табл. V, фиг. 1
№ 28/12226 (21—63). Табл. VI, фиг. 2
№ 29/12226 (21—63c). Табл. VI, фиг. 3

Sainshandia kansaica.
№ 31/12226 (213—a). Табл. VII, фиг. 4

Sainshandia aralica.
№ 34/12226 (445a). Табл. VII, фиг. 2
№ 35/12226 (445). Табл. VII, фиг. 3
№ 36/12226 (445c). Табл. VII, фиг. 1

Neotrigonioides gigantus.
№ 37/12226 (27—63a). Табл. VIII, фиг. 2
№ 38/12226 (27—63). Табл. VIII, фиг. 1

Plicatounio klaudziensis.
№ 42/12226 (282a). Табл. IX, фиг. 5
№ 43/12226 (282). Табл. X, фиг. 6
№ 44/12226 (282c). Табл. X, фиг. 7

Cuneopsis vjalovi.
№ 45/12226 (18—63c). Табл. X, фиг. 2
№ 46/12226 (18—63). Табл. X, фиг. 3
№ 47/12226 (18—63a). Табл. X, фиг. 4
Lanceolaria angustata.
№ 48/12226 (171—48a). Табл. IX, фиг. 2

МАРТИНСОН Г. Г. (колл. № 12227). См. № 57.

163. МЕРТИНЕНЕ Р. А., НЕСОВ Л. А. (колл. № 12178). Акулы — гибодонты мела Средней Азии. Докл. АН Тадж.ССР, т. XXVIII, № 10, 1986, с. 588—592, 1 пал. табл.

Остатки ископаемых акул из различных уровней апта-сантона могут быть использованы при расчленении широко распространенных в Средней Азии лиманных отложений мела, в которых обычно отсутствуют руководящие остатки морских беспозвоночных. Описано 3 новых вида.

Голотипы:

Hybodus hodzhakulensis Nessov et Martiniene.
№ 1/12178. Табл. I, фиг. 1
Hybodus nukusensis.
№ 26/12178. Табл. I, фиг. 4
Hybodus kansaiensis.
№ 51/12178. Табл. I, фиг. 7

МИЛОВА Л. В. (колл. № 9963). См. № 59.

164. МИРЗОЕВ Г. Г. (колл. № 12546). Новые виды *Douvilleiceras* из нижнеальбских отложений юго-западных отрогов Гиссарского хребта. Палеонт. журн. № 1, 1967, с. 57—67, 2 пал. табл.

Отложения, из которых происходят описываемые новые виды, по составу обильной фауны пелеципод, гастропод, брахиопод и аммонитов датируются ранним мелом. Описано 2 вида.

Голотипы:

Douvilleiceras charashangense Mirzoev.
№ 1/12546 (116/300). Табл. VII, фиг. 1—4
Douvilleiceras subleightonense Mirz.
№ 3/12546. Табл. VIII, фиг. 1, 2

165. МИРЗОЕВ Г. Г. (колл. № 12548). О взаимоотношении семейств *Hoplitidae* и *Placenticeratidae.* Палеонт. журн. № 4, 1967, с. 56—70, 2 пал. табл.

Сравнение онтогенеза аммонитов некоторых родов, принадлежащих указанным семействам, позволило установить между последними тесную родственную связь. Описано три новых вида, один из которых в коллекции отсутствует.

Голотипы:

Cleoniceras (*Cleoniceras*) *planum* Mirzoev.
№ 1/12548 (116—141). Табл. III, фиг. 2
Cleoniceras (*Cleoniceras*) *tenuis* Mirz.
№ 3/12548 (116/306). Табл. IV, фиг. 1

166. МИРЗОЕВ Г. Г. (колл. № 12549). Новые альбские аммониты юго-западных отрогов Гиссарского хребта. Палеонт. журн. № 1, 1969, с. 38—50, 2 пал. табл.

Описано 3 новых вида гоплитид, принадлежащих двум новым родам и 2 новых вида нового подрода.

Голотипы:

Anacleoniceras caseyi Mirzoev.
№ 1/12549 (116/347). Табл. IV, фиг. 1
Gazdaganites spinosus Mirz.
№ 3/12549 (116/355). Табл. V, фиг. 2
Pervinquieria (*Subpervinquieria*) *luppovi.*
№ 4/12549 (116/322). Табл. IV, фиг. 3
Pervinquieria (*Subpervinquieria*) *gissarensis.*
№ 5/12549 (116/320). Табл. IV, фиг. 4

167. МИРЗОЕВ Г. Г. (колл. № 12550). Новый аммонит из нижнего альба Туркмении. Палеонт. журн. № 2, 1970, с. 113—114, 1 рис.

Описываемый аммонит происходит из альбских отложений хр. Кундалянгтау (юго-западные отроги Гиссарского хребта).

Голотип:

Anacleoniceras bicostatum Mirzoev.
№ 1/12550 (116/360). Рис. 1

168. МОРДВИЛКО Т. А. (колл. № 12280). Атлас руководящих форм ископаемых фаун СССР. Том X — Нижний мел. Госгеолиздат, М., 1949, с. 153, т. XXXV.

Новый вид среднеальбского иноцерама из Мангышлакской области.

Голотип:

Inoceramus mandibula Mordvilko.
№ 1/12280. Табл. XXXV, фиг. 4

169. НЕСОВ Л. А. (колл. № 11478). О некоторых особенностях строения черепа двух позднемеловых черепах. Вестн. ЛГУ № 21. Сер. биол., 1977, с. 45—48, 1 рис.

Описаны базисфеноиды двух видов черепах из отложений турона Каракалпакии. Устанавливается новый вид нового рода надсемейства *Chelonioidea.*

Голотип:

Oxemys gutta Nessov.
№ 2/11478. Рис. в, г

170. НЕСОВ Л. А. (колл. № 11479). Архаичная позднемеловая черепаха из Западного Узбекистана. Палеонт. журн. № 4, 1978, с. 101—105, 1 пал. табл.

По пластинкам панциря, собранным в отложениях сеномана и нижнего турона Каракалпакии описывается архаичная черепаха.

Голотип:

Tienfucheloides undatus Nessov.
№ 1/11479. Табл., фиг. 3

171. НЕСОВ Л. А., ТРОФИМОВ Б. А. (колл. № 11758). Древнейшее насекомоядное мела Узбекской ССР. Докл. АН СССР, т. 247, № 4, 1979, с. 952—955, 1 рис.

Описан обломок нижней челюсти мелкого млекопитающего, по строению зубов которого авторы отнесли животное к насекомоядным, установив новый род и новый вид.

Голотип:

Daulestes kulbeckensis Trofimov et Nessov.
№ 1/11758. Рис. 1

172. НЕСОВ Л. А., ГУРЕЕВ А. А. (колл. № 11758). Находка челюсти древнейшей землеройки в верхнем мелу пустыни Кызылкум. Докл. АН СССР, т. 247, 1979, с. 1002—1004, 1 рис.

Впервые для мировой мезозойской фауны найдена и описана из отложений турона часть нижней челюсти землеройки. Устанавливается новый вид нового рода.

Голотип:

Cretasorex arkhangelskyi Nessov et Gureev.
№ 2/11758. Рис. 1

173. НЕСОВ Л. А. (колл. № 11913). Летающие ящеры позднего мела Кызылкумов. Палеонт. журн. № 4, 1981, с. 98—104, 1 рис.

Остатки птерозавров, известных ранее, в основном, в поздней юре, описаны из верхнемеловых отложений Кызылкумов. Установлены два новых вида двух новых родов.

Голотипы:

Aidachar paludalis Nessov.
№ 1/11913. Рис. 1, фиг. а—д
Sultanuvaisia antiqua.
№ 5/11913. Рис. 1, фиг. з—к

174. НЕСОВ Л. А. (колл. № 11727). Находка челюсти наземной ящерицы в верхнем мелу Узбекистана. Вестн. ЛГУ № 9. Биология. Вып. 2, 1981, с. 105—107, 1 рис.

Впервые на территории СССР были обнаружены остатки меловых наземных ящериц, выделенных автором в новый вид нового рода.

Голотип:

Ekshmer bissektensis Nessov.
№ 2/11727. Фото

175. НЕСОВ Л. А. (колл. № 11758). Древнейшие млекопитающие СССР. Ежегодн. ВПО, т. XXV, 1982, с. 228—240, 2 пал. табл.

Из верхнего мела Средней Азии впервые описываются остатки плацентарных млекопитающих совместно с другими, пока неопределимыми формами. Описано 3 новых вида 3-х новых родов.

Голотипы:

Taslestes inobservabilis Nessov.
№ 8/11758. Табл. I, фиг. 4
Oxlestes grandis.
№ 6/11758. Табл. I, фиг. 1
Sailestes quadrans.
№ 7/11758. Табл. I, фиг. 8

176. НЕСОВ Л. А., КАЗНЫШКИН М. Н. (колл. № 11914). Новые осетры мела и палеогена СССР. В кн.: «Современные проблемы палеоихтиологии». М., Наука, 1983, с. 68—76, 1 пал. табл.

Описаны остатки осетровых рыб из отложений верхнего палеоцена и коньяк-сантона Казахстана. Выделено 2 новых вида, 1 дан в открытой номенклатуре.

Голотипы:

Acipenser zhilgensis Nessov.
№ 1/11914. Табл., фиг. 6
Acipenser shilini.
№ 71/11914. Табл., фиг. 16

177. НЕСОВ Л. А. (колл. № 11915). Птерозавры и птицы позднего мела Средней Азии. Палеонт. журн. № 1, 1984, с. 47—57, 2 пал. табл.

Описаны остатки крупных летающих ящеров из турон-коньякских отложений и, впервые для территории СССР, кости мезозойских птиц. Установлено новых: семейство, подсемейство и три вида трех родов.

Голотипы:

Azhdarcho lancicollis Nessov.
№ 1/11915. Табл. VII, фиг. 2

Zhyraornis kashkarovi.
№ 42/11915. Табл. VIII, фиг. 4
Kizylkumavis cretacea.
№ 51/11915. Табл. VIII, фиг. 5

178. НЕСОВ Л. А. и др. (колл. № 12292). Новые находки остатков древних организмов в Белгородской и Курской областях. В кн.: «Комплексные исследования биогеоценозов лесостепных дубрав». Межвузовск. сб., 1986, с. 124—131, 2 рис.

Рассматриваются условия залегания слоев с остатками позвоночных конца раннего—начала позднего мела. Комплекс остатков морских позвоночных является одним из богатейших на территории Европейской части Союза. Из комплекса определены и изображены: нёбные пластинки химер 3-х видов и зубные кости черепахи.

Голотипы:

Gonodus kiprijanoffi Nessov.
№ 1/12292. Рис. 1, фиг. 1
«Chimaera» bogolubovi.
№ 3/12292. Рис. 1, фиг. 3
Ischyodus gubkini.
№ 6/12292. Рис. 1, фиг. 6
Teguliscapha rossica.
№ 18/12292. Рис. 2, фиг. 1

179. ОЛЕЙНИКОВ А. Н. (колл. № 8116). О находке фауны в эффузивно-осадочных отложениях района пос. Кути (Восточное Забайкалье). Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 81. Л., 1963, с. 105—109, 1 пал. табл.

Находка остатков рыбы, остракод и двух форм филлипод, характерных для нижнемеловых отложений Забайкалья и Монголии дала возможность датировать содержание их отложения нижним мелом. Из двух описанных филлипод один вид является новым.

Голотип:

Liograpta garda Oleynikov.
№ 3/8116. Табл., фиг. 3

ОЛЕЙНИКОВ А. Н. (колл. № 8116, 8627). См. № 63.

180. ПАВЛОВ А. (колл. № 2356). *Le crétacé inférieur de la Russie et sa fauna. Nouv. Mém. de la Soc.* Imp. des Nat. de Moscou. T. XIV, livr. 3, 1901, 87 стр., 8 пал. табл.

Основная часть работы посвящена истории изучения и классификации меловых головоногих. Во второй части рассматривается происхождение рода *Simbirskites* и положение его в меловой системе. Дано описание 11-ти видов аммонитов и 8-ми — белемнитов (в коллекции последние отсутствуют). Выделено 4 новых видов аммонитов; в коллекции представлен один.

Голотип:

Simbirskites pseudobarboti Pavlov.
№ 6/2356. Табл. VII, фиг. 1

181. ПОРЕЦКАЯ Е. С., ЛОБАЧЕВА С. В. (колл. № 11107). В кн.: «Берриас Мангышлака». «Наука», Л., 1988, с. 165—173, 3 пал. табл. См. № 93.

В разделе «Echinoidea» описано 9 форм, выделен 1 новый вид.

Голотип:

Toxaster bajarunasi Lobatscheva.
№ 27/11107. Табл. XXXVI, фиг. 2

ПЧЕЛИНЦЕВ В. Ф. (колл. № 11318). См. № 67.

182. САЗОНОВ Н. Т. (колл. № 10224). О некоторых малоизученных аммонитах нижнего мела. Бюлл. Моск. об-ва испыт. природы. Т. XXVI (5), 1951, с. 57—63, 1 пал. табл.

Описаны некоторые аммониты, являющиеся руководящими видами для точной датировки отложений. Из описанных 4-х видов 3 являются новыми. Установлено два новых рода.

Голотипы:

Surites poreckoensis N. Sasonov.
№ 1/10224. Табл. I, фиг. 1
Sarites pechorensis N. Sason.
№ 2/10224. Табл. I, фиг. 3
Chandomirovia ilekensis.
№ 3/10224. Табл. I, фиг. 5

183. САЗОНОВА И. Г. (колл. № 10223). Берриасские и нижневаланжинские аммониты Русской платформы. В кн.: Берриас Русской платформы. Тр. ВНИГНИ, вып. 110, М., 1971, с. 3—110, 25 пал. табл.

Впервые для Русской платформы выделен берриасский ярус и определена его граница с юрской системой. Выделены новые: 1 семейство, 3 подсемейства, 9 родов, 22 вида; всего описано 38 видов.

Голотипы:

Surites pervulgatus I. Sasonova.
№ 30/10223. Табл. VII, фиг. 3
Surites linguiformis I. Sason.
№ 26/10223. Табл. XVI, фиг. 4
Caseyiceras caseyi.
№ 2/10223. Табл. I, фиг. 3
Chandomirovia pechorkensis.
№ 55/10223. Табл. XIV, фиг. 3
Bogoslovskia pseudostenomphala.
№ 21/10223. Табл. VII, фиг. 2 (неотип).

Pronjaites nikitinoense.
№ 33/10223. Табл. IX, фиг. 5
Stchirowskiceras principale.
№ 32/10223. Табл. VIII, фиг. 2; табл. IX, фиг. 1
Stchirowskiceras tumefactum.
№ 35/10223. Табл. VIII, фиг. 1
Stchirowskiceras posterius.
№ 56/10223. Табл. XIII, фиг. 1
Stchirowskiceras gloriosum.
№ 58/10223. Табл. XIV, фиг. 1
Peregrinoceras bellum.
№ 11/10223. Табл. VI, фиг. 2
Peregrinoceras ramosum.
№ 41/10223. Табл. XVII, фиг. 2
Menjaites imperceptus.
№ 3/10223. Табл. II, фиг. 1
Menjaites magnus.
№ 4/10223. Табл. III, фиг. 1; табл. XVII, фиг. 1
Menjaites fidus.
№ 38/10223. Табл. XI, фиг. 1
Menjaites levis.
№ 57/10223. Табл. XIII, фиг. 2; табл. XIV, фиг. 2
Costamenjaites jucundus.
№ 64/10223. Табл. XXI, фиг. 2
Costamenjaites suraense.
№ 63/10223. Табл. XXI, фиг. 1
Subpolyptychites distinctus.
№ 17/10223. Табл. VI, фиг. 4
Subpolyptychites orbicularis.
№ 40/10223. Табл. VII, фиг. 4
Pseudogarnieria securis.
№ 27/10223. Табл. XVI, фиг. 1
Proleopoldia stchirowskyi.
№ 24/10223. Табл. XII, фиг. 2

184 САЗОНОВА И. Г. (колл. № 10223). Аммониты пограничных слоев юрской и меловой систем Русской платформы. Тр. ВНИГРИ, вып. 185, М., Недра, 1977, 96 с., 24 пал. табл.

Рассматриваются вопросы стратиграфии и палеогеографии. Описываются опорные разрезы Русской равнины, Северного Кавказа и Крыма. Излагаются основные принципы выделения таксонов аммоноидей и этапы их развития на границе юрского и мелового периодов. Приводятся описания 39-ти видов, из них 10 новых, 9 в открытой номенклатуре. Установлено 3 новых рода и 1 подрод.

Голотипы:

Surites spasskensis ruzhencevi I. Sasonova.
№ 89/10223. Табл. XI, фиг. 1
Surites rudicostatus I. Sason.
№ 82/10223. Табл. VIII, фиг. 3
Luppoviceras validum.
№ 66/10223. Табл. I, фиг. 1; табл. II, фиг. 1
Stchirowskiceras (*Suridiscus*) *subprincipale.*
№ 77/10223. Табл. VII, фиг. 1
Stchirowskiceras (*Suridiscus*) *mischukoviense.*
№ 80/10223. Табл. VIII, фиг. 1
Subpolyptychites conspicuus.
№ 149/10223. Табл. XXIII, фиг. 3
Riasanites decorus.
№ 114/10223. Табл. XIX, фиг. 4
Prorjasanites plumatus.
№ 113/10223. Табл. XIX, фиг. 3
Prorjasanites vnigni.
№ 124/10223. Табл. XX, фиг. 4

185. САЗОНОВА И. Г. (колл. № 11805). Нижнемеловые отложения центральных областей Русской платформы. В кн.: «Мезозойские и третичные отложения центральных областей Русской платформы». М., 1958, с. 31—135, 13 пал. табл.

Краткая сводка по стратиграфии, фауне и фациям нижнемеловых отложений центральных областей Русской платформы. Описано 12 видов аптских аммонитов, 1 вид лопатоногого и 1 — червя.

Голотипы:

Deshayesites volgensis I. Sasonova.
№ 1/11805. Табл. I, фиг. 1
Sinzovia luppovie.
№ 18/11805. Табл. VIII, фиг. 2
Dentalium barremicus.
№ 27/11805. Табл. XIII, фиг. 1; табл. XIV, фиг. 2; табл. XV, фиг. 2
Serpula saratoviensis.
№ 24/11805. Табл. XI, фиг. 1

САМЫЛИНА В. А., СРЕБРОДОЛЬСКАЯ И. Н. (колл. № 12393). См. № 71.

186. САПОЖНИКОВ В. Б. (колл. № 9558). Раннеаптские двустворки рода *Sphaera* Копет-Дага. Ежегодн. ВПО, т. XVIII, 1968, с. 126—132, 4 пал. табл.

Описанные в статье новые виды рода *Sphaera*, значительно отличаясь от ранее известного вида *Sph. corrugata* Sow., происходят, по мнению автора, от последнего.

Голотипы:

Sphaera kopetdaghensis Sapozhnikov.
№ 1/9558. Табл. I, фиг. 1
Sphaera sophae Sapozhn.
№ 11/9558. Табл. IV, фиг. 1

СОКОЛОВ Д. Н. (колл. № 10939). См. № 78.
СОКОЛОВ Д. Н. (колл. № 3729). См. № 79.
СРЕБРОДОЛЬСКАЯ И. Н. (колл. № 11219). См. № 33.

187. СРЕБРОДОЛЬСКАЯ И. Н. (колл. № 11926). Новые раннемеловые растения из Забайкалья. Палеонт. журн. № 4, 1983, с. 117—120, 2 рис.

Из отложений нижнего мела описаны остатки двух растений: 1) хвойного, впервые встреченного на территории Советского Союза и отличающегося от всех известных видов рода *Nageiopsis* и 2) семян растения неясного систематического положения, аналогичные которым известны из юры, но далеко не тождественны им, что позволило установить новый род — *Kutiella.*

Голотипы:

Nageiopsis transbaicalica Srebrodolskaja.
№ 1/11926. Рис. 1
Kutiella transbaicalica Srebr.
№ 4/11926. Рис. 2

188. СРЕБРОДОЛЬСКАЯ И. Н. (колл. № 12159). Два новых раннемеловых вида рода *Equisetum* (*Equisetaceae*) из Забайкалья. Ботан. журн. № 3, 1983, с. 1249—1254, 2 рис.

Два новых вида хвощей, один из которых существовал в первой половине раннего мела, имея довольно значительные распространения в Западном и Восточном Забайкалье; другой вид существовал во второй половине раннего мела и был встречен только в Центральном Забайкалье.

Голотипы:

Equisetum undense Srebrodolskaja.
№ 8/12159. Рис. 4, фиг. 1, 2
Equisetum semenense Srebr.
№ 15/12159. Рис. 4, фиг. 10, 11

189. СРЕБРОДОЛЬСКАЯ И. Н., САМЫЛИНА В. А. (колл. № 12168). Два новых раннемеловых вида гинкговых из Забайкалья. Ежегодн. ВПО, т. XXVII, 1984, с. 190—198, 3 пал. табл.

Приводится описание двух новых видов гинкговых, дается их эпидермальная характеристика.

Голотипы:

Ginkgo altanensis Srebrodolskaja et Samylina.
№ 1/12168. Табл. I, фиг. 1
Leptotoma kryshtofovichii.
№ 4/12168. Табл. III, фиг. 1

СРЕБРОДОЛЬСКАЯ И. Н., ТЕСЛЕНКО Ю. В. (колл. №№ 11219, 11651). См. № 81.

190. ТЕРЕХОВА Г. П., АВДЕЙКО Г. П., БАСОВ И. А. (колл. № 10653). Ауцеллины в меловых отложениях Северо-Востока СССР. В кн.: «Палеонтология и биостратиграфия Корякского нагорья». Магадан, 1984, с. 37—53, 14 пал. табл.

Описаны ауцеллины (13 видов) из наиболее изученных разрезов апт-альбских отложений Северо-Западной Камчатки. Выделено 4 новых вида, 6 — в открытой номенклатуре.

Голотипы:

Aucellina carinata Avdejko et Terechova.
№ 28/10653. Табл. IV, фиг. 6
Aucellina pinguis.
№ 64/10653. Табл. VII, фиг. 2
Aucellina rhomboidea.
№ 108/10653. Табл. XIV, фиг. 2
Aucellina imlayi Avdejko, Basov et Terechova.
№ 76/10653. Табл. XII, фиг. 2

191. ТИТОВА М. В. (колл. № 10445). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 5, 1980, с. 77—80, табл. XIX, XX.

Описано 3 вида нового рода брахиопод из отложений маастрихта Западного Копетдага.

Голотипы:

Parthirhynchia unguiseformis Titova.
№ 148/10445. Табл. XIX, фиг. 12
Parthirhynchia irsarensis.
№ 125/10445. Табл. XX, фиг. 1
Parthirhynchia breviscula.
№ 104/10445. Табл. XX, фиг. 3

192. ТИТОВА М. В. (колл. № 10445). Новые позднемеловые теребратулиды. Пал. журн. № 1, 1986, с. 117—124, 5 рис.

Три новых вида брахиопод из отряда *Terebratulida,* собранные в маастрихтских отложениях Средней Азии, имеют характерный облик и отличаются от ранее описанных из сенона Болгарии. Установлен новый род — *Bolgarithyris.*

Голотипы:

Bolgarithyris boncevi Titova.
№ 203/10445. Рис. 1, фиг. а—г

Bolgarithyris inopinata.
№ 217/10445. Рис. 1, фиг. л—о
Bolgarithyris inversa.
№ 220/10445. Рис. 1, фиг. у—ц

ТИХОМИРОВА Л. Б. (колл. № 12070). См. № 82.

193. ТОВБИНА С. З. (колл. № 11909). Новые представители семейства *Parahoplitidae* Туркмении. Ежегодн. ВПО, т. XXV, 1982, с. 60—77, 1 пал. табл.

Изучение филогении представителей сем. *Parahoplitidae* дает дополнительные данные для обоснования зонального стратиграфического расчленения среднего и верхнего апта юго-запада и запада Туркмении. Приведено описание 7-ми видов, 5 из которых — новые.

Голотипы:

Parahoplites luppovi Tovbina.
№ 1/11909. Табл. I, фиг. 1
Protacanthoplites submirus.
№ 2/11909. Табл. I, фиг. 2
Protacanthoplites multinodosus.
№ 4/11909. Табл. I, фиг. 4
Protacacfnthoplites allanovi.
№ 7/11909. Табл. I, фиг. 7
Protacanthoplites bogdanovae.
№ 5/11909. Табл. I, фиг. 5

194 ТОВБИНА С. З. (колл. № 12417). Общие и местные подразделения альбского яруса Западного Копетдага. Ежег. ВПО, т. XXXI, 1988, с. 277—291, 1 пал. табл.

На основе новых данных установлен объем зон. Для целей крупномасштабной съемки выделены местные био- и литостратиграфические подразделения. Описано три местных вида аммонитов, характеризующие биозоны. Все виды являются новыми.

Голотипы:

Anahoplites rosievae Tovbina.
№ 1/12417. Табл. I, фиг. 1
Lepthoplites sunbarensis Tovb.
№ 8/12417. Табл. I, фиг. 8
Hysteroceras levilatum.
№ 4/12417. Табл. I, фиг. 4

ТОЛСТИКОВА Н. В. (колл. № 11201). См. № 234.

195. ФАВОРСКАЯ Т. А. (колл. № 11149). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 5, 1980, М., наука, 1980, с. 47—49, табл. XV.

Описано два новых вида позднемеловых мшанок Туркмении.

Голотипы:

Onychocella spinata Favorskaja.
№ 1/11149. Табл. XV, фиг. 1
Beisselina bella.
№ 4/11149. Табл. XV, фиг. 4

196. ФАВОРСКАЯ Т. А. (колл. № 11756). Новый род мшанок *(Cyclostomata)* из маастрихта Восточной Туркмении. Палеонт. журн. № 4, 1981, с. 74—80, 1 пал. табл.

Рассмотрены некоторые особенности строения мшанок подотряда *Cerioporina.* Описан новый род и его типовой вид.

Голотип:

Semifungella explicata Favorskaja.
№ 1/11756. Табл. VIII, фиг. 1—7

197. ФАВОРСКАЯ Т. А. (колл. № 12048). Некоторые виды рода *Onychocella* (мшанки, *Cheilostomata*) из маастрихта Восточной Туркмении и Западного Узбекистана. Ежегодн. ВПО, т. XXVIII, 1985, с. 19—30, 2 пал. табл.

Из шести описанных выделено 5 новых видов мшанок из отложений маастрихта, изучение которых позволило установить особенности их состава и стратиграфического распределения.

Голотипы:

Onychocella amudariensis Favorskaja.
№ 1/12048. Табл. I, фиг. 1
Onychocella insueta.
№ 3/12048. Табл. I, фиг. 3
Onychocella multa.
№ 9/12048. Табл. II, фиг. 1
Onychocella pitniakensis.
№ 7/12048. Табл. I, фиг. 7
Onychocella tchingeldensis.
№ 13/12048. Табл. II, фиг. 5

198. ФАВОРСКАЯ Т. А. (колл. № 12401). Мшанки маастрихта Восточной Туркмении. Ежегодн. ВПО, т. XXX, 1987, с. 82—102, 3 пал. табл.

Описанные 19 видов мшанок происходят из отложений маастрихта Питнякских поднятий. Выделено 6 новых видов.

Голотипы:

Membranipora subcalceolus Favorskaja.
№ 2/12401. Табл. I, фиг. 2
Gargantua dentata.
№ 9/12401. Табл. I, фиг. 9
Semiescharinella bifoliata.
№ 14/12401. Табл. II, фиг. 3

Lunulites gigantea.
№ 16/12401. Табл. II, фиг. 5
Monoporella prisca.
№ 18/12401. Табл. II, фиг. 7
Stichomicropora subquadrata.
№ 20/12401. Табл. III, фиг. 1

199. ФАВОРСКАЯ Т. А. (колл. № 12407). Мшанки маастрихта Западного Узбекистана. Бюлл. МОИП, отд. геол., т. 63, вып. 1, 1988, с. 94—102, 2 пал. табл.

Статья содержит данные о распространении мшанок в маастрихте Центральных Кызылкумов. Установлен новый род, представленный новым видом и один новый вид рода, установленного Фойгтом.

Голотипы:

Dimorphocellaria voigti Favorskaja.
№ 8/12407. Табл. I, фиг. 8
Pseudobathystomella lata.
№ 16/12407. Табл. II, фиг. 6

200. VOIGT EHR. (колл. № 9757). Oberkreide—Bryozoen aus den asiatischen Gebieten der UdSSR. Mitt. Geol. Staatsinst. Heft 36, Hamburg, 1967.

Обработана большая коллекция мшанок из верхнемеловых отложений азиатской части Союза (Копет-Даг, Большой и Малый Балхан, северные области Туаркыра, Мангышлак и Западный Казахстан) в количестве 76-ти видов. Установлено новое семейство, новый род и 34 новых вида. Половина коллекции находится на хранении в Московском Госуд. Университете.

Голотипы:

«*Membranipora*» *caminoides* Voigt.
№ 14/9757. Табл. 1, фиг. 3, 4
«*Membranipora*» *titowae.*
№ 47/9757. Табл. 8, фиг. 1
«*Membranipora*» *margaritifera.*
№ 12б/9757. Табл. 5, фиг. 4, 5; табл. 6, фиг. 4
«*Membranipora*» *atabekjani.*
№ 12а/9757. Табл. 5, фиг. 3
«*Membranipora*» *evanescens.*
№ 18/9757. Табл. 9, фиг. 3—5
«*Membranipora*» *subpalpebra.*
№ 19а/9757. Табл. 10, фиг. 2—6
«*Membranipora*» *proboscinoides.*
№ 9/9757. Табл. 6, фиг. 1—3
Dysnoetocella foliacea.
№ 45/9757. Табл. 12, фиг. 1—3

Pavolunulites incrustans.
№ 11/9757. Табл. 16, фиг. 1
Hexacanthopora pediculata.
№ 27/9757. Табл. 21, фиг. 6—8
Distansescharella discreta.
№ 17c/9757. Табл. 21, фиг. 1—3
Ichnopora posterior.
№ 33/9757. Табл. 21, фиг. 5
Cryptostomella grandis.
№ 26b/9757. Табл. 29, фиг. 3—5
Reptomultella subtriangularis.
№ 10/9757. Табл. 32, фиг. 1—4

201. ЧЕРКЕСОВ О. В., БУРДЫКИНА М. Д. (колл. № 9933). Описание новых находок аммонитов с Новой Земли. В кн.: «Верхний палеозой и мезозой островов и побережья арктических морей СССР». Л., 1979, с. 43—66, 6 пал. табл.

Описано 12 видов аммонитов, впервые найденных в названном регионе. Три вида — новые.

Голотипы:

Temnoptychites (Temnoptychites) subtilis Burdykina.
№ 19/9933. Табл. V, фиг. 2
Temnoptychites (Temnoptychites) jucundus.
№ 20/9933. Табл. VI, фиг. 1
Temnoptychites (Temnoptychites) britvinensis.
№ 21/9933. Табл. V, фиг. 3

202. ШМИДТ О. И. и др. (колл. № 11569). О морских ежах из сеноманских отложений Горного Мангышлака. В сб.: «Стратиграфия нижнемеловых отложений нефтегазоносных областей СССР». Тр. ВНИГРИ, Л., 1979, с. 101—108, 1 рис.

Описанные остатки морских ежей, впервые найденные в отложениях сеномана Горного Мангышлака, расширили комплекс данной группы в отложениях яруса и уточнили ее вертикальное распространение. Описано 3 вида, один из которых новый.

Голотип:

Pseudoholaster mangyschlakensis Schmidt.
№ 3/11569. Рис. 2, фиг. 3

203. SCHMIDT F. (колл. № 11131). Resultate der Mammuthexpedition. Mem. de l'Ac. Imp. des Sc. de St.-Petersb., VII[e] Ser. T. XVIII, № 1, 1872, 165 с., 5 пал. табл.

Работа содержит разнообразные сведения о географии, геологии, климате, населении нижнего течения Енисея. Описаны местонахождения костей мамонта и другие зоологические и ботанические находки, а также ископаемые органические остатки беспозвоночных из нерасчлененных мезозойских отло-

жений в количестве 44-х видов и разновидностей (головоногие, двустворчатые, брюхоногие, лопатоногие моллюски).

Голотипы и синтипы:

Natica oblique — costata Schmidt.
№ 10/11131. Табл. IIIа, фиг. 6
Vanicoro (Narica) jenisseensis.
№ 11/11131. Табл. I, фиг. 7
№ 12/11131. Табл. III, фиг. 3
Bullinula (Beck) keyserlingii.
№ 13/11131. Табл. I, фиг. 6; табл. IIIа, фиг. 12
Cylichna lopatini.
№ 14/11131. Табл. I, фиг. 5
№ 15/11131. Табл. IIIа, фиг. 11; стр. 141, фиг. IV
Bullina (Tornatina) elegantula.
№ 16/11131. Табл. IIIа, фиг. 13
Turritella (Mesalia) splendens.
№ 17/11131. Табл. IIIа, фиг. 10
Alaria sotnikowi.
№ 20/11131. Табл. I, фиг. 11в
№ 21/11131. Табл. III, фиг. 2
№ 22/11131. Стр. 141, фиг. III
№ 23/11131. Табл. IIIа, фиг. 14с
№ 24/11131. Табл. IIIа, фиг. 14
Alaria eichwaldi.
№ 25/11131. Табл. III, фиг. 1а
№ 26/11131. Табл. III, фиг. 1в
№ 27/11131. Табл. III, фиг. 1с
Tancredia stubehdorffii.
№ 30/11131. Табл. IIIа, фиг. 20а
№ 31/11131. Табл. IIIа, фиг.20в
Cyprina eichwaldi.
№ 34/11131. Стр. 149, фиг. VIа—с[1]
Leda nitens.
№ 42/11131. Табл. II, фиг. 4
№ 43/11131. Табл. IIIа, фиг. 18

204. ШУЛЬГИНА Н. И. (колл. № 9832). Новая зона *Homolsomites bojarkensis* в неокоме Северной Сибири. В сб.: «Стратиграфия и палеонтология мезозойских отложений севера Сибири». СО АН СССР, 1965, с. 81—88, 9 пал. табл.

По присутствию своеобразных форм головоногих автор считает необходимым выделить отложения, содержащие эту фауну, в самостоятельную зону. Приводятся доказательства родственных связей родов. Описано два новых вида.

[1] Тождество имеющихся в коллекции экземпляров с изображенными в работе нуждается в уточнении.

Голотипы:

Homolsomites bojarkensis Schulgina.
№ 1/9832. Табл. I, фиг. 1
Homolsomites indistinotus Schulg.
№ 6/9832. Табл. V, фиг. 1; табл. VI, фиг. 1; табл. VII, фиг. ; табл. VIII, фиг. 3

205. ШУЛЬГИНА Н. И., БУРДЫКИНА М. Д. (колл. № 12142). Детализация опорных разрезов валанжина р. Тоярки и полуострова Пахса. В кн.: «Палеонт. обоснование расчленения палеозоя и мезозоя арктических районов». «Севморгеология», Л., 1983, с. 77—89, 4 пал. табл.

Приводится сопоставление отложений валанжина из опорных разрезов р. Боярки и п-ова Пахса. Пересмотрены границы нижнего и верхнего подъярусов валанжина. Описано 3 новых вида аммонитов.

Голотипы:

Temnoptychites (Costamenjaites) mediatus Burdykina.
№ 1/12142. Табл. II, фиг. 2
Polyptychites (Polyptychites) plenus.
№ 2/12142. Табл. I, фиг. 1
Dichotomites (Dichotomites) involutus.
№ 4/12142. Табл. III, фиг. 1

ШУЛЬГИНА Н. И. (колл. № 10118). См. № 85.

206. ЯКУШИНА А. А. (колл. № 9421). О находках раковин *Brachidontes* в меловых отложениях восточных районов СССР. Ежегодн. ВПО, т. XVIII, 1968, с. 140—145, 1 пал. табл.

Раковины двустворок из вскрытого скважинами горизонта низов завитинской свиты, являющегося маркирующим, происходят из морских отложений, развитых в Зея-Буреинском бассейне. Описано 4 вида, из них 3 новых.

Голотипы:

Brachidontes zejaburejaensis Jakuschina.
№ 1/9421. Табл. I, фиг. 1
Brachidontes zavitajaensis Jakusch.
№ 10/9421. Табл. I, фиг. 10
Brachidontes slovuthajaensis.
№ 9/9421. Табл. I, фиг. 9

207. ЯКУШИНА А. А. (колл. № 9387). Раннемеловые моллюски пресноводных бассейнов Южного Приморья. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 219, 1973, с. 239—259, 5 пал. табл.

Изучение двустворчатых моллюсков (14 видов) привело к выводу об апт-альбском возрасте верхов сучанской серии Сучанского и Шитухинского угленосных районов. Выделено новых 6 видов, 1 род.

Голотипы:

Sphaeridium retschitsaense Jakuschina.
№ 24/9387. Табл. II, фиг. 1
Sphaeridium kangauzense Jakusch.
№ 28/9387. Табл. II, фиг. 5
Sphaeridium crassatellatum.
№ 30/9387. Табл. II, фиг. 7
Unio paletsensis.
№ 52/9387. Табл. III, фиг. 5
Unio hangenensis.
№ 58/9387. Табл. IV, фиг. 1
Unio tsentahozensis.
№ 64/9387. Табл. IV, фиг. 7

208. ЯКУШИНА А. А. (колл. № 11709). Апт-альбские двустворчатые моллюски южной части Анадырско-Корякского нагорья. Ежегодн. ВПО, т. XXIII, 1980, с. 28—41, 4 пал. табл.

Монографически изучены и описаны 9 новых видов и 1 подвид, принадлежащие 9-ти семействам. Рассмотрено стратиграфическое значение этого комплекса.

Голотипы:

Acila (Truncacila) ainhinica Jakuschina.
№ 4/11709. Табл. I, фиг. 4
Lopatinia tschachmatensis.
№ 6/11709. Табл. I, фиг. 6
Grammatodon securis kamtschaticus.
№ 5/11709. Табл. I, фиг. 5
Pinna mametensis.
№ 13/11709. Табл. II, фиг. 1
Lima subparallela.
№ 16/11709. Табл. II, фиг. 3
Modiolus kinhinensis.
№ 11/11709. Табл. I, фиг. 12
Teredo subgaultina.
№ 28/11709. Табл. IV, фиг. 4
Tracia pacifica.
№ 31/11709. Табл. IV, фиг. 7
Aphrodina (Larma) ghithikensis.
№ 24/11709. Табл. III, фиг. 8
Aphrodina (Larma) pontonensis.
№ 22/11709. Табл. III, фиг. 6

209. ЯКУШИНА А. А. (колл. № 10931). Новые роды и виды древних растений и беспозвоночных СССР. ВНИГРИ, Л., Недра, 1980, с. 161, 163, табл. 36, 38.

Описано три вида двустворок из меловых отложений Сахалина, Сихотэ-Алиня и Северо-Востока Союза (бассейн р. Пенжины).

Голотипы:

Myrtea okanoensis Jakuschina.
№ 1/10931. Табл. 36, фиг. 5
Arctica udomiensis Jakusch.
№ 5/10931. Табл. 38, фиг. 1
Epicyprina penzhiniana.
№ 4/10931. Табл. 38, фиг. 3

210. ЯКУШИНА А. А. (колл. № 12036). Раннемеловые моллюски Момо-Зырянской впадины (Северо-Восток СССР). Ежегодн. ВПО, т. XXVI, 1983, с. 165—177, 3 пал. табл.

Пресноводные двустворчатые моллюски характеризуют три стратиграфических уровня, соответствующих трем свитам нижнего мела. Описано 13 видов пяти родов. 1 род и 8 видов новые.

Голотипы:

Zyrjanoconcha sullakkanensis Jakuschina.
№ 1/12036. Табл. I, фиг. 1
Zyrjanoconcha ožoginensis Jakusch.
№ 4/12036. Табл. I, фиг. 4
Zyrjanoconcha zyrjanica.
№ 7/12036. Табл. I, фиг. 7
Protelliptio jakuticum.
№ 27/12036. Табл. III, фиг. 3
Limnocyrena subcyclica.
№ 14/12036. Табл. II, фиг. 1
Limnocyrena grosnaensis.
№ 9/12036. Табл. I, фиг. 9
Limnocyrena subaltiformis.
№ 10/12036. Табл. I, фиг. 10
Limnocyrena mjatissensis.
№ 19/12036. Табл. II, фиг. 7

211. ЯКУШИНА А. А. (колл. № 12208). Позднемеловые двустворчатые моллюски Северо-Востока СССР *(Nuculoida* и *Arcoida).* Ежегодн. ВПО, т. XXIX, 1986, с. 105—116, 3 пал. табл.

Приводится описание 14-ти форм двустворчатых моллюсков из верхнемеловых отложений Корякского нагорья, из них 8 видов новые, 6 определены до рода.

Голотипы:

Acila (Truncacila) subdemessa Jakuschina.
№ 2/12208. Табл. I, фиг. 2
Acila (Truncacila) korjakensis Jakusch.
№ 5/12208. Табл. I, фиг. 4
Yoldia subcuprussensis.
№ 15/12208. Табл. II, фиг. 1

Grammatodon korjakensis.
№ 17/12208. Табл. II, фиг. 4
Grammatodon abbreviatus.
№ 23/12208. Табл. II, фиг. 8
Grammatodon reticulatus.
№ 23/12208. Табл. II, фиг. 9
Grammatodon pacificus.
№ 29/12208. Табл. III, фиг. 6
Cucullaea berigensis.
№ 26/12208. Табл. III, фиг. 3

212. ЯКУШИНА А. А. (колл. № 12208). Позднемеловые двустворчатые моллюски Корякского нагорья (Северо-Восток СССР). Ежегодн. ВПО, т. XXX, 1987, с. 145—155, 3 пал. табл.

Анализ фауны, описанной в статье, а также ранее опубликованной (1986) показал, что изученный комплекс близок позднемеловым двустворкам Тихоокеанской биогеографической области. В статье описано 12 форм, из которых 5 являются новыми видами, а 7 определены до рода.

Голотипы:

Anomia gibbosa Jakuschina.
№ 46/12208. Табл. II, фиг. 9
Anomia guttiformis Jakusch.
№ 49/12208. Табл. II, фиг. 12
Modiolus cuneatus.
№ 52/12208. Табл. III, фиг. 3
Pholadomya kuimweemensis.
№ 55/12208. Табл. III, фиг. 6
Goniomya pekulweemensis.
№ 56/12208. Табл. III, фиг. 7

213. ЯНИН Б. Т. (колл. № 12089). Рудисты *Matheronia* из валанжина Крыма. Палеонт. сб. № 22, Львов, 1985, с. 25—30, 2 пал. табл.

Впервые описаны представители рода *Matheronia* из нижнемеловых отложений Крыма. Изученный материал дает представление о строении замочного аппарата и мускульных отпечатков, о большой изменчивости раковин. Высказываются соображения по палеоэкологии и тафономии валанжинских матероний. Выделен новый вид.

Голотип:

Matheronia taurica Yanin.
№ 1/12089. Табл. I, фиг. 1

214. ЯНИН Б. Т. (колл. № 12253). *Parapachytraga* — новый род рудистов из баррема Малого Кавказа. Палеонт. журн. № 1, 1986, с. 113—115, 1 пал. табл.

Детальное изучение рудистов, собранных в бассейне р. Базарчай (Азерб. ССР) дает право отнести их к меловому сем. *Caprotinidae* и выделить в новый род и новый вид.

Голотип:

Parapachytraga gigantea Yanin.
№ 1/12253. Табл., фиг. 1а—в

215. ЯНИН Б. Т. (колл. № 11956). К палеоэкологии рудистов *Requienia*. Палеонт. журн. № 3, 1983, с. 104—106, 1 пал. табл.

В статье рассматриваются типы развития раковин рудистов на примере нового вида из отложений нижнего валанжина Северного Кавказа.

Голотип:

Requienia baksanensis Yanin.
№ 1/11956. Рис., фиг. а—в

ЯНИН Б. Т. (колл. № 12658). См. № 87.

ПАЛЕОГЕН

216. БАЛАХМАТОВА В. Т. (колл. № 9077). Новые палеогеновые фораминиферы из Северной Туркмении. Тр. ВСЕГЕИ, т. 115, 1965, с. 126—134, 3 пал. табл.

Среди комплекса изученных палеогеновых фораминифер встречены новые виды (4) и подвиды (2), стратиграфическое положение которых недостаточно ясно.

Голотипы и синтипы:

Textularia baudouiniana sengibabensis Balakhmatova.
№ 143/9077. Табл. I, фиг. 1

Textularia acarinata Balakhm.
№ 144/9077. Табл. I, фиг. 4

Vulvulina kerestinskiensis.
№ 147/9077. Табл. I, фиг. 7[1]

Lenticulina (Marginulinopsis) crispus.
№ 165/9077. Табл. II, фиг. 4

Robulus darwazaensis.
№ 166/9077. Табл. III, фиг. 1

Neogyroidina memoranda inornata.
№ 177/9077. Табл. II, фиг. 5

217. БУГРОВА Э. М. (колл. № 11686). *Pseudogaudryina externa* — руководящий вид фораминифер нижнего эоцена Средней Азии и Казахстана. Палеонт. журн. № 2, 1978, с. 136—139, 4 рис.

[1] Данный экземпляр является лектотипом, выделенным Э. М. Бугровой.

Изучение последовательных срезов раковин годриин рассматриваемого вида из нижнеэоценовых отложений юга СССР доказало, что треугольное сечение раковин является устойчивым морфологическим признаком вида, что позволило выделить его как новый — руководящий для нижнего эоцена юга СССР.

Голотип:

Pseudogaudryina externa Bugrova.
№ 1/11686. Рис. 2а—в

218. БУГРОВА Э. М. (колл. № 11713). Использование многомерного анализа при изучении некоторых роталоидных фораминифер. Палеонт. журн. № 4, 1978, с. 32—41, 2 рис.

Приводятся результаты использования биометрических методов при разделении морфологически близких форм. Описано 3 формы, из которых один вид и один подвид являются новыми.

Голотипы:

Cibicidoides hadjibulakensis secunda Bugrova.
№ 1/11713. Рис. 10
Brotzenella turkmenica.
№ 4/11713. Рис. 11

219. БУГРОВА Э. М. (колл. № 11043). Новы роды и виды древних растений и беспозвоночных СССР. ВНИГРИ, Л., Недра, 1980, с. 31, 44, 59, 96, табл.

Описано 4 вида палеогеновых фораминифер из Юго-Восточной Туркмении.

Голотипы:

Budashevaella callosa Bugrova.
№ 1/11043. Табл. 6, фиг. 7
Cyclammina crassa.
№ 3/11043. Табл. 11, фиг. 3
Pseudogaudryina concava.
№ 5/11043. Стр. 60, рис. 4
Robulus curvicameratus.
№ 7/11043. Табл. 22, фиг. 6

220. БУГРОВА Э. М. (колл. № 12045). Находка тинтиннид (инфузории) в эоцене юга СССР. Палеонт. журн. № 4, 1983, с. 82—85, 3 рис.

Впервые для Советского Союза описаны тинтинниды (3 вида) с территории Туркмении, Узбекистана и Крыма, где они были встречены в отложениях эоцена. Морфологические отличия от уже известных форм позволили рассматривать найденные виды как новые.

Голотипы:

Conicarcella capidulum Bugrova.
№ 1/12045. Рис. 1
Conicarcella dentifera.
№ 2/12045. Рис. 2
Bignotella bulbaulus.
№ 3/12045. Рис. 3

БУГРОВА Э. М. (колл. № 12046). См. № 113.

221. БУГРОВА Э. М. (колл. № 12298). Палеогеновые инфузории (состав, распространение, фациальная приуроченность). Палеонт. журн. № 4, 1986, с. 16—26, 1 пал. табл.

Рассматриваются морфология, видовой и родовой состав палеогеновых инфузорий, их географическое и стратиграфическое распространение и фациальная приуроченность. Описано 6 новых видов и 1 известный ранее.

Голотипы:

Conicarcella scabra Bugrova.
№ 1/12298. Табл. I, фиг. 1
Conicarcella meridiana.
№ 3/12298. Табл. I, фиг. 3
Conicarcella gyrifera.
№ 9/12298. Табл. I, фиг. 4
Aubertianella taurica.
№ 5/12298. Табл. I, фиг. 6
Bignotella maxima.
№ 6/12298. Табл. I, фиг. 7
Bignotella? obscura.
№ 7/12298. Табл. I, фиг. 8

222. БУГРОВА Э. М. (колл. № 12385). Характерные виды фораминифер из эоценовых отложений южных районов СССР. ВИНИТИ, деп. В—216, 1986, 32 с., 2 пал. табл.

Описанные в работе фораминиферы (21 вид) имеют существенное значение для разработки дробной стратиграфии юга СССР. Выделено 16 новых видов и 1 подвид.

Голотипы:

Reophax acutatus Bugrova.
№ 2/12385. Табл. I, фиг. 2
Trochammina bella.
№ 3/12385. Табл. I, фиг. 3
Gaudryina dauciformis.
№ 4/12385. Табл. I, фиг. 5
Pseudogaudryina corpulenta.
№ 5/12385. Табл. I, фиг. 6
Schenkiella gracilis.
№ 6/12385. Табл. I, фиг. 4

Robulus evidens.
№ 8/12385. Табл. I, фиг. 8
Robulus memorabilis.
№ 9/12385. Табл. I, фиг. 7
Turkmenella ninikae.
№ 10/12385. Табл. I, фиг. 10
Baggina tumida.
№ 11/12385. Табл. II, фиг. 1
Gyroidina depressaeformis eocenica.
№ 12/12385. Табл. II, фиг. 2
Oridorsalis posterus.
№ 13/12385. Табл. II, фиг. 3
Hanzawaia? balakhmatovae.
№ 14/12385. Табл. II, фиг. 4
Florilus mirus.
№ 16/12385. Табл. II, фиг. 6
Florilus triangulis.
№ 17/12385. Табл. II, фиг. 7
Asterigerina subprimaria.
№ 18/12385. Табл. II, фиг. 8
Bulimina orientalis.
№ 20/12385. Табл. II, фиг. 10
Truncorotaloides areanus.
№ 21/12385. Табл. II, фиг. 11

223. БУГРОВА Э. М. (колл. № 12422). Мелкие бентосные фораминиферы зональных комплексов эоцена юга СССР. Ежегодн. ВПО, т. XXXII, 1989, с. 13—29, 2 пал. табл.

Охарактеризованы комплексы шести зон эоцена, выделенных по бентосным фораминиферам. Приведены сведения о распространении видов, впервые найденных на территории Союза. Описаны новые таксоны: семейство, 2 рода, 6 видов.

Голотипы:

Siphotextularia plana Bugrova.
№ 1/12422. Табл. I, фиг. 1
Vsegeina nana.
№ 6/12422. Табл. I, фиг. 6
Epistominella impexa.
№ 8/12422. Табл. I, фиг. 8
Sphaerogypsina antiqua.
№ 9/12422. Табл. I, фиг. 9
Coleites unicus.
№ 10/12422. Табл. I, фиг. 10
Asterigerina kraevae.
№ 12/12422. Табл. II, фиг. 1

224. ВАСИЛЬЕВ И. В. (колл. № 11206). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Растения. Тр. ВСЕГЕИ, нов. сер., т. 204, Л., 1980, с. 71, 75—78, табл. XVII.

Описано 4 вида ископаемых растений из отложений нижнего олигоцена Тургайского прогиба.

Голотипы:

Salix enbekshiensis Ig. Vassiljev.
№ 1/11206. Табл. XVII, фиг. 7
Lomatia dubia Ig. Vassil.
№ 2/11206. Табл. XVII, фиг. 10
Banksia mugodsharica.
№ 3/11206. Табл. XVII, фиг. 8
Clematis tridentata.
№ 4/11206. Табл. XVII, фиг. 9

225. ВОЛОБУЕВА В. И. (колл. № 11297). Атлас фауны палеогена и неогена Северо-Востока СССР. М., Недра, 1981, 138 с., 55 пал. табл.

Из описанных в Атласе 340 видов и подвидов двустворчатых и брюхоногих моллюсков, распространенных в Пенжинско-Анадырском регионе и в восточной части Корякского нагорья автором описано 37 видов и подвидов, из которых 9 таксонов описываются впервые. Установлены новый род и подрод.

Голотипы:

Malletia (Carinata) ornata Volobueva.
№ 9/11297. Табл. XX, фиг. 15
Glycymeris (Glycymeris) amaamensis.
№ 16/11297. Табл. I, фиг. 1
Eucrassatella stillwaterensis emimica.
№ 27/11297. Табл. VI, фиг. 6
Eucrassatella rarytkensis.
№ 29/11297. Табл. XIV, фиг. 5
Clinocardium ornatocistatum.
№ 37/11297. Табл. XXVIII, фиг. 6
Clinocardium chikagawaense eteretica.
№ 38/11297. Табл. XXVII, фиг. 7
Corbicula (Corbicula) triangula.
№ 42/11297. Табл. I, фиг. 10
Bathybembix (Ginebis) sakhalinensis karjakensis.
№ 52/11297. Табл. XXXI, фиг. 5
Scaphella lautenschlageri.
№ 55/11297. Табл. XXXIII, фиг. 4

226. ГОРБАЧ Л. П. (колл. № 9496). О некоторых двустворках из эоцена Крыма. Палеонт. сб. № 22. Львов, 1985, с. 30—34, 1 пал. табл.

Описано 2 новых вида, принадлежащие двум новым родам из нижнеэоценовых отложений Крыма.

Голотипы:

Unica costatoplumata Gorbach.
№ 1/9496. Табл., фиг. 1
Xenium tersum.
№ 4/9496. Табл., фиг. 3

ЛИПМАН Р. Х. (колл. № 7767). См. № 147.

227. ЛИПМАН Р. Х. (колл. № 10970). Новые роды и виды древних растений и беспозвоночных СССР. ВНИГРИ, Л., Недра, 1980, с. 122—126.

Описаны дискоидеи *(Radiolaria)* из палеогеновых отложений Арало-Тургайской низменности и Причерноморской впадины в количестве шести видов.

Голотипы:

Phacodiscus licharevi Lipman.
№ 7/10970. Табл. 27, фиг. 1
Stylodictya circularia.
№ 20/10970. Табл. 27, фиг. 5
Amphibrachium planum.
№ 22/10970. Табл. 17, фиг. 3
Amphymenium romboideum.
№ 25/10970. Табл. 27, фиг. 9
Histiastrum paleogenicum.
№ 27/10970. Табл. 27, фиг. 6
Spongodiscus aralensis.
№ 34/10970. Табл. 27, фиг. 8

228. МОДЕРНИ У. Н., МАРТИНСОН Г. Г. (колл. № 11258). О новых палеогеновых пресноводных моллюсках Тургайского прогиба. В кн.: «Континент. образов. восточных районов Средней Азии и Казахстана». Л., «Наука», 1969, с. 119—131, 2 пал. табл.

Изучение континентальных нижне- среднеолигоценовых отложений Тургайского прогиба установило 2 разновозрастных комплекса пресноводных моллюсков, из которых описано 4 новых вида, 2 формы даны в открытой номенклатуре. Выделен новый подрод — *Turgaja.*

Голотипы:

Cipangopuladina (Turgaja) litvinica Martinson et Maderny.
№ 1/11258 (1211—б/55). Табл. I, фиг. 1
Cipangopuladina (Turgaja) tobolica.
№ 5/11258 (2818—а/63). Табл. I, фиг. 6
Margaria hydrobiaeformis.
№ 8/11258 (1211—а/55). Табл. I, фиг. 8

Cuneopsis kustanaica.
№ 14/11258 (2818—б/63). Табл. II, фиг. 7

НЕСОВ Л. А., КАЗНЫШКИН М. Н. (колл. № 11914). См. № 176.

229. НЕСОВ Л. А., УДОВИЧЕНКО Н. И. (колл. № 12173). Морские змеи и хрящевые рыбы палеогена Южного Казахстана. Палеонт. сб. № 1. Респ. межвед. научн. сб. Львов, 1984, с. 69—74, 1 пал. табл.

Описаны позвонки крупных змей и зубы скатов из отложений палеогена, обитавших совместно с другими животными и водными растениями. Установлено новых: подсемейство, род, 2 вида.

Голотипы:

Vialovophis zhylan Nessov.
№ 18/12173. Табл., фиг. 18
Hypolophus ovalis Udovitschenko.
№ 1/12173. Табл., фиг. 1

230. НЕСОВ Л. А., ЧХИКВАДЗЕ В. М. (колл. № 12088). Новые материалы по палеоценовым черепахам Южного Казахстана. Сообщ. АН Груз. ССР, т. 125, № 1, 1987, с. 177—180, 3 рис.

Описаны остатки черепахи из позднепалеоценовых отложений. Приводится сравнение со среднеолигоценовым и раннемиоценовым видами. Описываемый вид является новым.

Голотип:

Planiplastron gureevi Nessov et Ckhikvadze.
№ 1/12088. Рис. 1

231. НИКОЛАЕВА И. А. (колл. №№ 8485, 10655). Палеогеновые и неогеновые остракоды Тургайского прогиба и Северного Приаралья. ВСЕГЕИ. Л., 1978 (3532—78 Деп.), 179 с., 26 пал. табл.

Изучены морские и континентальные остракоды палеогена и нижнего миоцена Арало-Тургайского региона. Предлагается расчленение указанных отложений на слои с характерными комплексами остракод. Отмечено отсутствие генетических связей между континентальными и морскими формами рассматриваемого отрезка времени. Описано 115 видов из 48-ми родов. Выделено 8 новых видов.

Голотипы:

Cypris sajakensis Nikolaeva.
№ 2/10655. Табл. IV, фиг. 12
Eucypris (?) *adulta.*
№ 4/10655. Табл. VI, фиг. 2
Mediocypris hirta.
№ 1/10655. Табл. X, фиг. 4

Virgatocypris striata.
№ 3/10655. Табл. XII, фиг. 4
Cytheretta michailovi.
№ 320/8485. Табл. XIV, фиг. 12
Krithe pertusa.
№ 225/8485. Табл. XVII, фиг. 7
Cytheropteron applanatum.
№ 112/8485. Табл. XVII, фиг. 18
Schizocythere jugata.
№ 213/8485. Табл. XX, фиг. 17

232. НИКОЛАЕВА И. А. (колл. № 12019). Новые виды остракод из палеогена Крыма и Северного Предкавказья. ВСЕГЕИ, Л., 1981 (3992—81 Деп.), 27 с., 4 пал. табл.

1. Пять видов из отложений Крыма. Четко выраженная стратиграфическая приуроченность позволяет использовать их как виды-индексы, а широкое географическое распространение поможет при корреляции палеогеновых отложений; 2. Восемь видов из нижнего и среднего палеогена Кубанского разреза, где они представлены наиболее полно.

Голотипы:

Bairdia longula Nikolaeva.
№ 1/12019. Табл. I, фиг. 1
Bythocypris tcherkessensis.
№ 2/12019. Табл. I, фиг. 4
Argilloecia corniculata.
№ 12/12019. Табл. IV, фиг. 1
Australoecia (?) *polita.*
№ 3/12019. Табл. II, фиг. 1
Krithe retroflexa.
№ 4/12019. Табл. II, фиг. 5
Krithe faceta.
№ 5/12019. Табл. II, фиг. 8
Cyamocytheridea (?) *mera.*
№ 6/12019. Табл. II, фиг. 10
Cushmanidea (?) *barbarica.*
№ 7/12019. Табл. II, фиг. 11
Echinocythereis katschiana katschiana.
№ 13/12019. Табл. IV, фиг. 3
Echinocythereis katschiana isabenanaeformis.
№ 15/12019. Табл. IV, фиг. 5
Diebelina pilosa.
№ 8/12019. Табл. III, фиг. 1
Stigmatocythere (?) *clivosa.*
№ 9/12019. Табл. III, фиг. 3
Curfsina serotina.
№ 10/12019. Табл. III, фиг. 7

Goleocythere posteggeri.
№ 11/12019. Табл. III, фиг. 11

233. ОВЕЧКИН Н. К. (колл. № 7053). Отложения среднего палеогена Тургайской впадины и Северного Приаралья. Тр. ВСЕГЕИ, 1954, 139 с., 14 пал. табл.

Обобщены результаты изучения морских осадков среднего палеогена Тургайской впадины и основных разрезов Северного Приаралья, изучены коллекции, собранные в этих районах другими исследователями. Сделана первая попытка стратиграфического расчленения среднего палеогена. Даны краткие описания 126-ти видов брюхоногих и двустворчатых моллюсков. Выделено 5 новых видов и 1 вариетет.

Голотип и синтипы:

Isocardia (Aralocardia) eichwaldiana var. *mica* Ovetschkin.
№ 13/7053. Табл. I, фиг. 14, 15
№ 14/7053. Табл. I, фиг. 16
№ 15/7053. Табл. II, фиг. 4
Isocardia (Aralocardia) gigantaea Ovetsch.
№ 17/7053. Табл. I, фиг. 17
№ 18/7053. Табл. II, фиг. 2
№ 19/7053. Табл. II, фиг. 3
Cyprina alexeievi.
№ 47/7053. Табл. V, фиг. 6
Pholadomya korobkovi.
№ 56/7053. Табл. VII, фиг. 1 *

234. ТОЛСТИКОВА Н. В. (колл. № 11201). Моллюски древних озер Зайсанской впадины (Юго-Восточный Казахстан, мел, палеоген, миоцен). В кн.: «Ископаемые пресноводные моллюски и их значение для палеолимнологии». Л., «Наука», 1976, с. 51—220, 20 пал. табл.

Приводится стратиграфическая характеристика отложений позднего мела, палеогена и миоцена, описание пресноводных моллюсков, а также тафономическая и палеоэкологическая их характеристика. Описано 79 видов двустворчатых и брюхоногих моллюсков, 17 из них являются новыми.

Голотипы:

Ctenodesma subfoliacea Tolstikova.
№ 2/11201. Табл. I, фиг. 3
Margaritanopsis infans Tolst.
№ 10/11201. Табл. I, фиг. 11
Margaritifera argillaceus.
№ 12/11201. Табл. I, фиг. 13
Palindonaia illita.
№ 24/11201. Табл. II, фиг. 12

Nannonaia nuda.
№ 47/11201. Табл. IV, фиг. 2
Oxynaia lapedosa.
№ 59/11201. Табл. V, фиг. 4
Oxynaia ferrata.
№ 66/11201. Табл. V, фиг. 11
Elongaria plena.
№ 54/11201. Табл. IV, фиг. 17
Ensidens celsus.
№ 82/11201. Табл. VII, фиг. 9
Unionetta singularis.
№ 84/11201. Табл. VII, фиг. 13
Crassiana irinae.
№ 139/11201. Табл. XII, фиг. 15
Crassiana nurensis.
№ 148/11201. Табл. XIII, фиг. 6
Physunio laeviusculus.
№ 157/11201. Табл. XV, фиг. 7
Pilsbryoconcha praeexilis.
№ 160/11201. Табл. XV, фиг. 10
Bradybaena slavai.
№ 181/11201. Табл. XVIII, фиг. 1 [1)]
Bradybaena ninae.
№ 195/11201. Табл. XVIII, фиг. 4 [1)]

235. УДОВИЧЕНКО Н. И., НЕСОВ Л. А. (колл. № 12087). Сравнение комплексов хрящевых рыб и других позвоночных палеогена Приташкентских Чулей (Майск) и Украины (Пирогово). В кн.: «Биострат., палеонтология осадочного чехла Украины». Киев, 1987, с. 167—174, 1 пал. табл.

Из обширного комплекса ископаемых остатков хрящевых и костистых рыб, морских и сухопутных черепах, крокодилов, птиц, млекопитающих из палеогена описаны зубы ската и ростральные шипы костистой рыбы. Приводится сравнение данного комплекса с обнаруженным на Украине.

Голотипы:

Rhinoptera maja Udovitschenko.
№ 80/12087. Табл., фиг. 16
Cylindracanthus ianuaris Nessov.
№ 90/12087. Табл., фиг. 8

Голотип не сдан.

236. ФАВОРСКАЯ Т. А. (колл. № 11679). Позднепалеоценовые мшанки *Cheilostomata* Мангышлака. Ежегодн. ВПО, т. XXIII, 1980, с. 112—138, 3 пал. табл.

[1)] Виды, происходящие из отложений верхнего мела (маастрихт).

Описано 12 видов (из них 6 новых) позднепалеоценовых мшанок, произведен анализ их возрастного распространения в отложениях палеоцена.

Голотипы:

Floridina atypica Favorskaja.
№ 5/11679. Табл. I, фиг. 5
Floridina subgothica.
№ 7/11679. Табл. I, фиг. 7
Semiescharinella plana.
№ 8/11679. Табл. I, фиг. 8
Puncturiella cava.
№ 11/11679. Табл. II, фиг. 3
Porina trabeculifera.
№ 14/11679. Табл. II, фиг. 6
Cryptostomella sullucapiensis.
№ 22/11679. Табл. III, фиг. 2

237. ФЕДОТОВ В. В. (колл. № 11948). О некоторых теплолюбивых представителях эоценовой флоры Райчихи Амурской области. В кн.: «Матер. по палеобот. и стратигр. континент. отлож. советск. Дальнего Востока», 1975, с. 36—48, 4 пал. табл.

Приводится описание 12-ти представителей флоры Райчихи, рассматриваемых как теплолюбивые. Современные их аналоги распространены, главным образом, в тропиках и субтропиках. Выделено 4 новых вида.

Голотипы:

Myrtophyllum amurense Fedotov.
№ 343/11948. Табл. IX, фиг. 13
Zizyphus raitschichensis.
№ 416/11948. Табл. X, фиг. 1
Dodonaea burejensis.
№ 685/11948. Табл. IX, фиг. 12

238. ФЕДОТОВ В. В. (колл. № 11948). Новые виды эоценовой флоры Райчихи Амурской области. Ботан. журн., т. 62, № 7, 1977, с. 961—969, 2 пал. табл.

Описано три новых вида ископаемых растений, обнаруживающих близкое сходство с современными видами тех же родов из Восточной Азии.

Голотипы:

Aralia amurensis Fedotov.
№ 398/11948. Табл. I, фиг. 5
Gouania grubovii.
№ 431а/11948. Табл. II, фиг. 1, 6
Weigela raitschichensis.
№ 466/11948. Табл. I, фиг. 1

239. ФЕДОТОВ В. В. (колл. № 11948). Папоротники позднеэоценовой флоры Райчихи (Амурская область). Ботан. журн., т. 64, № 7, 1979, с. 975—983, 2 пал. табл.

Из комплекса позднеэоценовой флоры Райчихи определено 10 видов папоротников. Описание приводится для пяти. Два вида — новые.

Голотипы:

Dryopteris rajczichensis Fedotov.
№ 25/11948. Рис. 3, фиг. 7
Sphenopteris rajczichensis.
№ 53/11948. Рис. 3, фиг. 9, 10

240. ФЕДОТОВ В. В. (колл. № 11948). Род *Dioncophyllites* в эоценовой флоре Райчихи Амурской области. Ботан. журн., т. 67, № 7, 1982, с. 985—987, 2 пал. табл.

Новый род установлен по остаткам семян из эоценовой флоры Райчихи. Систематическое положение его пока неясно.

Голотип:

Dioncophyllites amurensis Fedotov.
№ 546/11948. Рис. 2, фиг. 3

241. ФЕДОТОВ В. В. (колл. № 11948). Новые виды двудольных растений эоценовой флоры Райчихи (Амурская область). Ежегодн. ВПО, т. XXIX, 1986, с. 188—200, 3 пал. табл.

Приведено описание 10-ти новых видов ископаемой флоры из эоценовых отложений Амурской области.

Голотипы:

Neolitsea rajczichensis Fedotov.
№ 101/11948. Табл. I, фиг. 2
Lindera rajczichensis.
№ 112/11948. Табл. I, фиг. 5
Hibiscus rajczichensis.
№ 283/11948. Табл. II, фиг. 3
Mallotus rajczichensis.
№ 281/11948. Табл. II, фиг. 2
Dicotylophyllum amurense.
№ 355/11948. Табл. III, фиг. 4, 5
Delavaya fraxinifolia.
№ 394/11948. Табл. II, фиг. 1; табл. III, фиг. 2, 7
Meliosma rajczichensis.
№ 395/11948. Табл. I, фиг. 3, 4
Viburnum rajczichense.
№ 468/11948. Табл. I, фиг. 1
Clerodendrum rajczichensis.
№ 495/11948. Табл. III, фиг. 8

ВОЛОБУЕВА В. И. (колл. № 11297). См. № 225.

242. ИЛЬИНА А. П. (колл. № 6819). Моллюски неогеновых отложений Южного Сахалина. В кн.: «Моллюски третичных отложений Южного Сахалина». Тр. ВНИГРИ. Спец. сер. Вып. 10, 1954, с. 188—253, 30 пал. табл.

Третичные отложения Южного Сахалина по литологическим признакам расчленены на 8 свит. В работе описывается фауна из отложений трех верхних (углегорская, курасийская, маруямская), датированных нижним—верхним миоценом. Приведены описания 104-х форм двустворчатых и брюхоногих моллюсков. Выделено 15 новых видов, 33 формы даны в открытой номенклатуре.

Голотипы и синтипы:[1]

Acila (Truncacila) marujamensis Iljina.
№ 4/6819 (16/6819). Табл. I, фиг. 4
№ 5/6819. Табл. I, фиг. 5
№ 6/6819. Табл. I, фиг. 6
№ 7/6819. Табл. I, фиг. 7
№ 8/6819. Табл. I, фиг. 8

Nuculana (Sacella) chinaensis.
№ 9/6819 (1/6819). Табл. I, фиг. 9
№ 10/6819. Табл. I, фиг. 10
№ 11/6819. Табл. I, фиг. 11

Nuculana (Sacella) chinaensis.
№ 12/6819. Табл. I, фиг. 12
№ 13/6819. Табл. I, фиг. 13

Ostrea oitensis.
№ 37/6819. Табл. III, фиг. 1; табл. IV, фиг. 1
№ 38/6819. Табл. III, фиг. 2
№ 42/6819. Табл. V, фиг. 1; табл. VI, фиг. 1

Pecten (Patinopecten ?) sachalinensis.
№ 55/6819 (4/6819). Табл. XII, фиг. 1 *

Modiolus ausiensis.
№ 60/6819 (5/6819). Табл. XIII, фиг. 5 *

Laternula (Aelga) borensis.
№ 65/6819 (6/6819). Табл. XIII, фиг. 10 *

Dosinia ausiensis.
№ 88/6819 (7/6819). Табл. XIII, фиг. 7
№ 89/6819. Табл. XIII, фиг. 8

Mactra (Mulinia ?) evalensis.
№ 117/6819. Табл. XXIII, фиг. 1

[1] В связи с тем, что номера голотипов в работе не соответствуют номерам музейного хранения, а также из-за отсутствия ссылок на изображения голотипов — приводятся номера синтипов.

№ 118/6819. Табл. XXIII, фиг. 2

Mactra (Mulinia?) oitensis.

№ 119/6819. Табл. XXIII, фиг. 3

№ 120/6819. Табл. XXIII, фиг. 4

№ 121/6819. Табл. XXIII, фиг. 5

Mya rudakensis.

№ 134/6819. Табл. XXIV, фиг. 6

№ 135/6819. Табл. XXIV, фиг. 7

Retusa ausiensis.

№ 142/6819 (11/6819). Табл. XXVI, фиг. 1 *

Cylichna ausiensis.

№ 143/6819 (12/6819). Табл. XXVI, фиг. 2 *

Genota kotoniensis.

№ 144/6819 (13/6819). Табл. XXVI, фиг. 3 *

Buccinum marujamaensis.

№ 155/6819 (16/6819). Табл. XXVII, фиг. 4 *

Nassarius ausiensis.

№ 158/6819 (16/6819). Табл. XXVIII, фиг. 1 *

243. КРИШТОФОВИЧ Л. В. (колл. № 10285). Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Тр. ВНИГРИ. Вып. 318, Л., Недра, 1973, с. 61, 62, 77, табл. 19, 22.

Описано 7 видов двустворчатых и брюхоногих моллюсков из отложений миоцена Юго-Западной Камчатки и Северо-Востока СССР. Три голотипа в коллекции отсутствуют.

Голотипы:

Nuculana napanica L. Krishtofovich.

№ 1/10285. Табл. 19, фиг. 1

Yoldia (Yoldia) posneri L. Krisht.

№ 7/10285. Табл. 19, фиг. 10

Solariella? ochotensis.

№ 17/10285. Табл. 22, фиг. 7

Miopleiona olutorskiensis.

№ 21/10285. Табл. 22, фиг. 8

НИКОЛАЕВА И. А. (колл. №№ 8485, 10655). См. № 231.

244. ТОЛСТИКОВА Н. В. (колл. № 11715). Новые виды пресноводных гастропод миоцена Казахстана. Ежегодн. ВПО, т. XXIII, 1980, с. 65—76, 2 пал. табл.

Описано 6 видов пресноводных гастропод из аральского горизонта (миоцен) Северного, Центрального и Юго-Восточного Казахстана. Установлен новый род — *Madernia.*

Голотипы:

Viviparus conobasis Tolstikova.

№ 1/11715. Табл. I, фиг. 4

Bithynia crassianula Tolst.

№ 15/11715. Табл. II, фиг. 3

Bithynia adornata.
№ 17/11715. Табл. II, фиг. 7 [1)]
Galba spironana.
№ 8/11715. Табл. I, фиг. 10 [1)]
Pseudocarinogyraulus bicarinatus.
№ 5/11715. Табл. I, фиг. 7 [1)]
Madernia singularis.
№ 12/11715. Табл. II, фиг. 1

245. ШМИДТ О. И., СИНЕЛЬНИКОВА В. Н. (колл. № 10255). О морских ежах кавранской серии (Западная Камчатка). Докл. АН СССР, т. 199, № 4, 1971, с. 909—912, 1 пал. табл.

Присутствие в кавранской фауне некоторых родов морских ежей связывает их с неогеновыми фаунами Северной Америки и Калифорнии, отсутствие же родов и видов, характерных для плиоценовых отложений, говорит о миоценовом времени отложения указанных толщ. Описано 4 новых вида и установлено 2 новых рода — *Mennerella* и *Faassia.*

Голотипы:

Mennerella ovata Schmidt.
№ 1/10255 (5). Рис. 1, фиг. 2
Faassia globosa.
№ 2/10255 (6). Рис. 1, фиг. 1
Kewia etolonica.
№ 3/10255. Рис. 1, фиг. 4
Astrodapsis ilyinensis.
№ 5/10255 (28). Рис. 1, фиг. 3

[1)] Номера голотипов в тексте не соответствуют их номерам в объяснениях к таблице.

УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ КОЛЛЕКЦИЙ

Абрамова Л. Н. — 88—91, 121.
Авдейко Г. П. — 190.
Акопян В. Т. — 92, 93.
Атабекян А. А. — 94—97.
Балахматова В. Т. — 216.
Басов И. А. — 190.
Белякова Г. М. — 98—100.
Бланк М. Я. — 101—104.
Бобкова Н. Н. — 105,106.
Богданова Л. А. — 38.
Богданова Т. Н. — 107—112.
Бугрова Э. М. — 113, 217—223.
Буракова А. Т. — 39—44.
Бурдыкина М. Д. — 201, 205.
Бурий И. В. — 1.
Василевская Н. Д. — 2, 45—48, 114—129.
Васильев И. В. — 224.
Верещагин В. Н. — 130.
Владимирович В. П. — 3—8, 49.
Волобуева В. И. — 225.
Вукс В. Я. — 50—52.
Гаврилова В. А. — 10.
Глазунова А. Е. — 131—133.
Горбач Л. П. — 226.
Гуреев А. А. — 172.
Джалилов М. Р. — 92, 93.
Ефремова В. И. — 134.
Жарникова Н. К. — 1, 11, 12.
Зонова Т. Д. — 135—142.
Ильина А. П. — 242.
Казинцова Л. И. — 143.
Казнышкин М. Н. — 60, 176.
Калачева Е. Д. — 75, 76.
Квахадзе — 144.
Кейзерлинг А. — 13.
Кипарисова Л. Д. — 14.
Коротков В. А. — 92, 93.
Корчинская М. В. — 15—19.
Коцур Г. — 20.
Криштофович А. Н. — 53, 145, 146.
Криштофович Л. В. — 243.
Кянсеп Н. П. — 54.
Липман Р. Х. — 147, 227.
Лобачева С. В. — 148—154, 181.
Луппов Н. П. — 155—160.
Мадерни У. Н. — 228.
Маркович — 21, 55.
Мартинсон Г. Г. — 56—58, 161, 162, 228.
Мертинене Р. А. — 163.
Милова Л. В. — 59.
Мирзоев Г. Г. — 164—167.
Мордвилко Т. А. — 168.
Несов Л. А. — 60, 163, 169—178, 229, 235.
Николаева И. А. — 231, 232.
Овечкин Н. К. — 233.
Окунева Т. М. — 22—24, 62.
Олейников А. Н. — 25, 63, 179.
Павлов В. В. — 47.
Паевская Е. Б. — 25.
Полуботко И. В. — 1, 26, 64.
Попов Ю. Н. — 27—29.
Порецкая Е. С. — 181.
Принада В. Д. — 30.
Прозоровская Е. Л. — 65, 66.
Прозоровский В. А. — 159.
Пчелинцев В. Ф. — 67.
Пчелинцева Г. Т. — 68.
Ретовский О. — 69.
Ростовцев К. О. — 70.
Сазонов Н. Т. — 182.
Сазонова И. Г. — 183—185.
Самылина В. А. — 71, 189.
Сапожников В. Б. — 186.
Сей И. И. — 72—76.
Сибирякова Л. В. — 77.
Соколов Д. Н. — 78, 79.
Сребродольская И. Н. — 31—33, 37, 71, 80, 81, 187—189.
Терехова Г. П. — 190.
Тесленко Ю. В. — 81.
Титова М. В. — 191, 192.
Тихомирова Л. Б. — 82.
Товбина С. З. — 193, 194.
Толстикова Н. В. — 234, 244.
Трофимов Б. А. — 171.
Турутанова-Кетова А. И. — 30.
Удовиченко Н. И. — 235.
Фаворская Т. А. — 195—199, 236.
Фойгт Е. — 200.

Худолей К. М. — 64.
Черкесов О. В. — 201.
Чернышев Б. И. — 83.
Шведов Н. А. — 34, 35.
Шмидт О. И. — 202, 245.
Шмидт Ф. — 203.
Шорохова С. А. — 36, 37.
Шульгина Н. И. — 85, 86, 204, 205.
Якушина А. А. — 206—212.
Янин Б. Т. — 87, 213—215.

УКАЗАТЕЛЬ ГОЛОТИПОВ НОВЫХ ВИДОВ ПО ГРУППАМ

Растительные остатки

Тип СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ

Usmunia corzhenevskae, 34

Тип МОХООБРАЗНЫЕ

Muscites samchakianus, 81

Тип ЧЛЕНИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ

Equisetites costatus, 49
  ishinae, 21
  nerjungrensis, *55*
  tschetschumensis, *45*
Equisetum minutissimum, 81
  semenense, 188
  takschense, 80
  undense, 188
Neocalamites primoris, 7
Paracalamites taradanicus, 7
Phyllotheca oligophylla, 7

Тип ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ

Acrostichopteris (?) rara, 37
Adiantites gracilis, 114
Adiantopteris minimus, 120
  polymorpha, 123
Anemia rarinervis, 89
Arctopteris arcticus, 128
  lenaensis, 122
  rarytkinensis, 127
Asplenium rigidum, 114
Baiera tripartita, 119
Cladophlebis aldanensis var. angusta, 116
  ambiqua, 116
  decipiens, 116
  gluschinskii, 122
  kryshtofovichii, *55*
  macrophylla, 37
  monstrosus, 122
  pseudoargutula, *55*
  sherzhantus, 41
  tigyensis, 122
  ussuriensis, 37
  yanschini, 30
  zwltkoviensis, 34
  (Cladophlebis) densinervis, 6
  platyphylla, 6
  pusilla, 6
  tomiensis, 6
  (Diversifolia) mutnaensis, 6
Clathropteris mongugaica, 32
Coniopteris compressa, 122
  ketovae, 45
  talanguica, 80
  tchulmanensis, *55*
  vachrameevi, 122
Danaeopsis bukovaica, *5*
Dictyophyllum kryshtofovichi, 32
  mongugaicum, 32
Dryopteris rajczichensis, 239
Eboracia variabile, 124
Gonatosorus lobifolia, 40
Hausmannia bobrovii, 129
  undulata, 120
Jacutopteris lenaensis, 118
Katasiopteris stenophylla, 8
Kedroviella corsakii, 8
Osmunda (?) ambigua, 125
  (?) chudogensis, 81
Osmundiella vachrameevi, 47
Osmundopsis acutipinnula, *45*
  (?) bojakovae, 3
Pecopteris angustipinnula, 8
Protoblechnum tuzhykovae, *5*
Prynadaeopteris schwedovii, 6
Pterophyllum innae, 36
Scleropteris ermolaevii, 122
  sibirica, 116
Sphenopteris lepiskensis, *45*
  petiolepinnulata, 114
  rajczichensis, 239
  ukinensis, 122
Taeniopteris obliquus, 121
  pocrovskii, 121
Tchucotopteris ustinovii, 127
Thinnfeldia irregularis, 4
  karpinskii, 4
Tuarella lobifolia, 40

Класс Голосеменные

Alatispermum malandini, 126
Anabarella kryshtofovichii, 90
Anomozamites bifurcatus, 39
turkmenicus, 39
Araucarites migayi, 34
Carpolithus mongugaicus, 33
Cephalotaxopsis sangarensis, 46
Conites ambabiraensis, 33
compactus, 121
Ctenis jacutensis, 117
tigyensis, 121
Desmiophyllum acutifolium, 128
rigidum, 126
Drepanolepis squamulosa, 33
Elatocladus ketovae, 121
Ginkgo altanensis, 189
angusticuneata, 119
papilionaceus, 46
parvula, 121
Ginkgoites volnovii, 126
Gleichenia jacutica, 45
Heilungia angustisegmenta, 48
iczetuensis, 81
Ixostrobus laxus, 121
Jacutiella dentata, 39
Khonomakidium srebrodolskae, 35
Leptotoma kryshtofovichii, 189
Macrotaeniopteris vlassovii, 55
Nageiopsis transbaicalica, 187
Nilssonia viluensis, 117
Paratatarina korchinskae, 2
Pheonicopsis acutifolia, 119
parva, 125
suluktensis, 71
urtujensis, 71
Pityocladua afrikanii, 44
Pitaophyllum arcticum, 126
Pityospermum attenuatum, 121
Pityostrobus burejensis, 53
gusevi, 115
Podozamites gracilis, 115
kiparisovkensis, 37
olenekensis, 115
ovalifolius, 115
zwetkovii, 34
Pseudoctenis zamiophylloides, 117
zamiophylloides rarinervis, 121
Pseudotorellia (?) emarginata, 125
Sagenopteris verzilini, 43
Sciadopitys arctica, 90
brevifolia, 90
Schizolepis angustipeduncularis, 115
arcticus, 91
komarovii, 81
kozubovae, 81
neosibiricus, 91
tergenica, 80
Sphenpbaiera flabellata, 121
polylobata, 21
Strobilites takschensis, 80
Taxocladus mucronulatus, 55
tschetschumensis, 45
Tersiella jurakchensis, 35
serrata, 31
Tyrmia acuta, 117
prynadae, 121
Ulangangia martinsonii, 33
Weltrichia tergenica, 80
Yavorskya arctica, 35
radczenkovii, 35

Класс Покрытосеменные

Aralia amurensis, 238
Banksia mugodsharica, 202
Clematis tridentata, 202
Clerodendrum rajczichensis, 241
Delavaya frakinifolia, 241
Dictylophyllum amurense, 241
Dodonaea bureyensis, 237
Gouania grubovii, 238
Hibiscus rajczichensis, 241
Lindera rajchichensis, 241
Lomatia dubia, 224
Mallotus rajczichensis, 241
Meliosma rajczichensis, 241
Myrtophyllum amurense, 237
Neolitsea rajczichensis, 241
Palaeanthus roxanae, 145
Pistia marginata, 89
Pseudoprotophyllum (?) hatangaensis, 89
Quercus tchucotica, 88
Salix enbekshiensis, 224
Sogdiania abdita, 42
Viburnum rajczichense, 241
Weigela raitschichensis, 238
Zizyphus (?) forthergilloides, 146
raitschichensis, 241

Растения неопределенного систематического положения

Dioncophyllites amurensis, 240
Ketovia furcata, 5
Kutiella transbaicalica, 187
Tomia radczenkoi, 31
Tuzhykoviella elegans, 5

Фауна

Тип ПРОСТЕЙШИЕ

Класс Фораминиферы

Asterigerina kraevae, 223
subprimaria, 222
Aubertianella taurica, 221

Baggina tumida, 222
Bignotella bulbaulus, 220
maxima, 221
? obscura, 221
Brotzenella turkmenica, 218
Budashevaella callosa, 219
Bulimina orientalis, 222
Ceratolamarckina (?) uncata, 50
Cibicidoides hadjibulakensis, 218
Coleites unicus, 223
Conicarcella capidulum, 220
dentifera, 220
gyrifera, 221
meridiana, 221
scabra, 221
Cyclammina crassa, 219
Epistominella impexa, 223
Falsopalmula ogbinensis, 52
Florilus mirus, 222
triangulis, 222
Gaudryina dauciformis, 222
Gyroidina depressaeformis eocenica, 222
Hanzawaia ? balakhmatovae, 222
Lenticulina (Marginulinopsis) crispus, 216
Lingulina dzhagriensis, 52
Marginulina ? azariani, 52
Neogyroidina memoranda inornata, 216
Nodosaria subuzdagensis, 51
Oridorsalis posterus, 222
Pseudogaudryina concava, 219
corpulenta, 222
Pseudonodosaria araxensis, 51
externa, 217
Reophax acutatus, 222
Robulus curvicameratus, 219
darwazaensis, 216
evidens, 222
memorabilis, 222
Schenkiella gracilis, 222
Siphotextularia plana, 223
Sphaerogypsina antiqua, 223
Textularia acarinata, 216
baudouiniana sengibabensis, 216
Trochammina bella, 222
Truncorotaloides arcanus, 222
Turkmenella cyclos, 113
laticarinata, 113
ninikae, 222
singularis, 113
vernicosa, 113
Vsegeina nana, 223
Vulvulina kerestinskiensis, 216

Класс Радиолярии

Acutacapsula gassanovi, 82
geisuensis, 82
porrecta, 82
Amphibrachium planum, 227
Amphymenium romboideum, 227
Bullacapsula aspera, 82
cephalotribula, 82
nuciformis, 82
propria, 82
torosa, 82
Cornucapsula robusta, 82
Gromyosphaera tschurini, 147
vivenkensis, 147
Dictyomitra sevanensis, 143
Grandcapsula spongiosa, 143
Histiastrum paleogenicum, 227
Obesacapsula demersa, 82
maximusa, 143
nodulosa, 82
satiani, 143
Phacodiscus licharevi, 227
Spongocapsula crassiparia, 143
vialovi, 143
Spongodiscus aralensis, 227
Stalodictya circularia, 227
Thecacapsula armenica, 82

Тип КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ

Serpula saratoviensis, 185

Тип ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

Класс Ракообразные

Argilloecia corniculata, 232
Australoecia (?) polita, 232
Bairdestheria abbreviata, 63
aequialta, 63
andachudukensis, 63
duroica, 63
lutosa, 63
oblonga, 63
planata, 63
turgaensis, 63
zazaica, 63
Bairdia longula, 232
Bisulcocypris rubachae, 20
Blomella transita, 20
Brachygrapta borsiaensis, 63
Bythocypris tcherlessensis, 232
Curfsina serotina, 232
Cushmanidea (?) barbarica, 232
Cyamocytheridea (?) mera, 232
Cypris sajakensis, 231
Cytheretta michailovi, 231
Cytheropteron applanatum, 231
Diebelina pilosa, 232
Echinocythereis katschiana isabenanaeformis, 232
katschiana katschiana, 232
Estheria daja, 83
Eucypris (?) adulta, 231

Gemmanella (Gemmanella) densistriata, 20
grammi, 20
magna, 20
minuta, 20
mocki, 20
(Neogemmanella) abuschiki, 20
oertlii, 20
parva, 20
(Praegemmanella) movschovitschi, 20
schleiferae, 20
Golcocythere posteggeri, 232
Itiella spinosa, 83
Ketmenia gusevi, 83
rotundata, 83
schultzi, 83
Krithe faceta, 232
pertusa, 231
retroflexa, 232
Liograpta garda, 179
lana, 63
Lutkevichinella (Cytherissinella) okrajantzi trammeri, 20
ventronodosa, 20
(Lutkevichinella) pseudopusilla, 20
Lynceus (Limnetis) stchukini, 83
Mediocypris hirta, 231
Nestoria kutiensis, 63
limnetica, 63
orbicularis, 63
Opsipolygrapta strojevi, 63
Pajanites ? ladinicus, 20
Paleoleptestheria favosa, 63
savinaensis, 63
submaleevi, 63
Paleolynceus brevulus, 63
matakensis, 63
oblongatus, 63
tschernyshevi, 63
zergunicus, 63
Prolepidurus daja, 83
kuenga, 83
schewija, 83
Pseudestheria halgataica, 63
mailoensis, 63
Pulviella minima, 20
? stykae, 20
Schizocythere jugata, 231
Stigmatocythere (?) clivosa, 232
Telocythere fischeri praefischeri, 20
mostleri, 20
Triops shilkaensis, 63
Virgatocypris striata, 231

Тип МОЛЛЮСКИ

Класс Брюхоногие

Ampullina koinautensis, 67
subautharis, 67
Ampullospira subfournaeti, 67
upensis, 67
Anomalofusus lemnicastus isostriatus, 104
subnodosus elatus, 104
substriatus protensis, 104
Anomalosipho axialocostatus, 104
Aporrhais biangulata kamtchatica, 102
Auroraella kugusemensis, 92
Bathrotomaria plana atchajvajamskensis, 102
Bathybembix (Ginebis) sakhalinensis karjakensis, 225
Bellifusus curvicostatus fustiformis, 103
micrus, 103
Beringuis senior, 104
Biplica ovoides, 104
Bithynia adornata, 244
crassianula, 244
jurassica, 57
Bradybaena ninae, 234
slavai, 234
Buccinopsis crassa kamtschatica, 104
Buccinum marujamaensis, 242
Bullina (Tornatina) elegantula, 203
Bullinula (Beck) keyserlingii, 203
Campeloma melampoides, 57
Cassidaria dundoensis, 104
gangutica, 104
Cernina angusta, 67
Choanomphalus (?) parvus, 57
Cipangopuladina (Turgaja) litvinica, 228
tobolica, 228
Cryptorhytis cheyenensis latus, 103
vulgaris, 103
Cylichna ausiensis, 242
lopatini, 203
Cylindrobullina angusta, 67
karabijailensis, 67
lata, 67
Dalium cretacium, 104
Drilluta distans elegans, 103
Eucyclus arginensis, 67
Eustoma multituberculatum, 67
Eutriofusus (Boltenella) convexus anaestriatus, 103
Fasciolaria gracilis, 103
ovoides, 103
ponderosa multistriata, 103
Funiptyxis luppovi, 91
Fusinus (Woodsella) korjakensis, 103
Galba spironana, 244
Genota kotoniensis, 242
savtchinskajaea, 101
Goniobasis (Cassiopella) gigantica, 102
Hemifusus pagodicus, 103
Hydrobia rectoides, 57
Leviathania crimica, 67
sulcata, 67
Lioplax conica, 57
Lirofusus tricostatus, 103

Madernia singularis, 244
Margaria hydrobiaeformis, 228
Megaptyxis (?) hacobjani, 92
Micromelania bicarinata, 57
Miopleionia olutorskiensis, 243
Nassarius ausiensis, 242
Natica oblique-costata, 203
(Amauropsis) euxina, 69
Naticella (?) tithonia, 69
Nerinea mangyschlakensis, 93
Neritopsis taurica, 67
Odontobasis constricta korjakensis, 104
Oncochilus sub-ovulus, 67
Oonia kamtchatica, 102
Paladmete laevis korjakskensis, 102
Palaeobaicalia pumila, 57
turroformis, 57
Physa mongolica, 57
Perissoptera mentchucurica, 101
Pictavia barabanovensis, 67
nikitensis, 67
Promathilda (Clathrobaculus) decussata, 102
Pseudocarinogyraulus bicarinatus, 244
Pseudogaleodea monstra, 104
Pseudomaura lirata impenveemsis, 102
korjakskensis, 102
Pseudomelania arginensis, 67
mirabilis, 67
taurica, 67
Retusa ausiensis, 242
taurica, 67
Rhombopsis orientalis tuberculatocostatus, 103
Scaphella lautenschlegeri, 225
Sinum konoplanicum, 101
Solariella napanica, 243
Spinigera inexpecta, 67
zitteli, 69
Tectus submoralinus, 67
Trochonatica fridentalis, 67
komarensis, 67
Turricula (Turricula) ornata, 103
Turritella (Mesalia) splendens, 203
Valvata (Megalovalvata) protopiligera, 57
(Tropidina) pusilla, 57
Vanicoro (Narica) jenisseensis, 203
Viviparus conobasis, 244

Класс Лопатоногие

Dentalium barremicus, 185

Класс Двустворчатые

Acila (Truncacila) ainchinica, 208
korjakensis, 211
marujamensis, 213
subdemessa, 211
Aequipecten (?) anjuensis, 59
Alaria eichwaldi, 203
sotnikowi, 203
Anaucella elgaensis, 68
fischeri, 68
gerbicanensis, 68
minima, 68
ochotica, 68
subbronni, 68
toromensis, 68
Anomia gibbosa, 212
guttiformis, 212
Aphrodina (Larma) ghithikensis, 208
pontonensis, 208
Arca alata, 69
gracillima, 69
Arcomytilus emeljanovi, 77
Arctica udomiensis, 209
Astarte talanguensis, 62
Aucellina carinata, 190
imbayi, 190
pinguis, 190
renngarteni, 79
rhomboidea, 190
Bournonia bobkovae, 94
jangikudukensis, 105
Brachidontes slovutnajaensis, 206
zavitajaensis, 206
zejaburejaensis, 206
Buchia sorbulakensis, 112
Bureiamya irensis, 68
suborientalis, 68
toromensis, 68
tylomensis, 68
Calvaentolium udensis, 24
Camptonectes (Boreionectes) umaltensis, 73
Cardinia primorensis, 22
Ceratostreon ? fragilis, 109
Chlamys (Chlamys) filiformis, 59
vurguveemensis, 59
Chlamys (Ochotochlamys ?) bureiensis, 74
Clinocardium chikagawaensis eteretica, 225
ornatocostatum, 225
Corbicula tringularis, 57
(Corbicula) triangula, 225
Crassiana irinae, 234
nurensis, 234
Ctenodesma subfoliacea, 234
Cucullaea berigensis, 211
Cuneopsis hajanensis, 58
kustanaica, 228
lanceolata, 58
vjalovi, 162
Cyprina alexeievi, 233
eichwaldi, 203
Daonella parva, 19
Dosinia ausiensis, 213
Elongaria plena, 234
Ensidens celsus, 234
Epicyprina penzhiniana, 209

Eucrassatella rarytkensis, 225
stillwaterensis emimica, 225
Exogyra pitniakensis, 98
Fatina amudariensis, 98
Glycymeris (Glycymeris) amaamensis, 225
Goniomya pekulweemensis, 212
Grammatodon abbreviatus, 211
korjakensis, 211
pacificus, 211
reticulatus, 211
securis kamtschaticus, 208
Gryphaea (Pycnodonta) zauralica, 132
(Vogaea) volgo-donica, 132
Cyropleura khushikatensis, 105
krymica, 106
vantshurovi, 105
Hacobjanella armenica, 95
Halobia graem-belliensis, 19
petrenkoi, 16
popowi, 26
seimkanensis, 26
talajaensis, 26
talajaensis primorica, 1
Heterodiceras crimicus, 87
Homomya (Bureiamya) atopczensis, 62
undensis, 62
Inoceramus anglicus, 138
beschtjulensis, 100
capitatus, 136
delfinensis, 137
ecostatus, 134
jangodaensis, 134
kolokolcevae, 134
latruncularis, 136
magnus, 134
mandibula, 168
monopterus, 134
paralamarcki, 134
perpendicularicus, 135
pogrebovi, 134
pressulus, 136
retrosus, 13
schulginae, 134
schutovae, 136
schuvaevi, 136
sichotealinensis, 139
sichotealinensis declinatus, 139
subambiguus, 68
subdepressus, 68
submametensis, 140
tuganinensis, 139
udylensis, 142
Isocardia (Aralocardia) eichwaldiana var.
mica, 233
gigantea, 233
Isognomon freidini, 77
Korobkovitrigonia akkartschigensis, 99
bobkovae, 99
gaurdakensis, 98
gissarensis, 99
mediasiatica, 99
rugosa, 99
tagamensis, 99
Lamproscapha elliptica, 57
lacustris, 57
murtoica, 57
tugrigensis, 57
Lanceolaria angustata, 162
Laternula (Aelga) borensis, 242
Leda nitens, 203
Leptochondria plana, 14
Lima paupera, 13
subparallela, 208
(Plagiostoma) bilibini, 59
elongata, 59
Limnocyrena compacta, 57
hissarica, 161
grosnaensis, 210
mjatissensis, 210
obtusale, 57
pusilloides, 161
rotunda, 57
subaltiformis, 210
subcyclica, 210
tignensis, 57
Liostrea francliniformis, 133
germaini mangyschlakensis, 112
oxianiformis, 133
Lopatinia tschachmatensis, 208
Lopha (Arctistrea) tagamense, 98
(Lopha) sibirica, 132
Mactra (Mulinia ?) evalensis, 242
oitensis, 242
Malletia (Carinata) ornata, 225
Margaritanopsis infans, 234
Margaritifera argillaceus, 234
Matheronia taurica, 213
Megatrigonia khoresmensis, 98
(Apiotrigonia) tagamensis, 100
Meleagrinella boehmi, 16
Modiola urmiensis, 68
zebrikowi, 69
Modiolus ainhinensis, 208
ausiensis, 242
bolscheneverensis, 77
cuneatus, 212
portnjagini, 77
reinovensis, 77
schiviensis, 62
Monotis notabilis, 25
Mya rudakensis, 242
Myrtea okanoensis, 209
Mytiloceramus bureiensis, 73
subporrectus, 73
Mytilus heisaensis, 19
Nannonaia nuda, 234
Neaera boehmi, 69
(?) elongata, 69
glabra, 69
theodosiana, 69

Neotrigonioides gigantus, 162
Nucula ononica, 62
rostrata, 108
triangulata, 108
woodsi, 107
Nuculana napanica, 243
(Sacella) chinaensis, 242
Ordinatoceramus bicentralis, 141
Ornithopecten temirbabensis, 14
Ostrea oitensis, 242
tecticostatoides, 133
Otapiria tugurensis, 23
zeensis, 23
Oxynaia ferrata, 234
lapedosa, 234
Palindoinaia illita, 234
Parapachytraga gigantea, 214
Pecten (Amusium) pawlowi, 69
sokolowi, 69
(Entolium) theodosianus, 69
(Patinopecten) sachalinensis, 242
Pectinula (?) solonensis, 75
Pholadomya korobkovi, 233
kuimweemensis, 212
Pholas tithonia, 69
Physunio laeviusculus, 234
Picnodonta miranda, 109
Pilsbryoconcha praeexilis, 234
Pinna mametensis, 208
Plagiostoma lobatschevae, 111
Pleuromya voronetzae, 77
Plicatotrigonioides kuramensis, 162
simakovi robustus, 162
Plicatounio klaudziensis, 162
Plicatula amudariensis, 100
romanovskajae, 100
Protelliptio jakuticum, 210
Pseudocardinia carinata, 66
elongata, 56
ovalis, 56
sibirensis, 57
submahna, 56
turfanensis, 56
Pseudohyria babatagensis, 161
cardiiformis ferganensis, 162
gobiensis itemirica, 161
javanica, 161
kysylkumaensis, 161
kysylkumaensis aralica, 161
mongolensis radiatus, 162
mujanica, 162
pjanovskai, 161
rotunda, 161
tachtamyshensis, 162
triangularis, 162
Requienia baksanensis, 215
Retroceramus priscus, 72
subtilis, 72
Sachalinoceramus subbroncus, 141
subsachalinensis, 141
Sainshandia aralica, 162
kansaica, 162
Sphaera kopetdaghensis, 186
sophae, 186
Sphaeridium crassatellatum, 207
kangauzense, 207
retschitsaense, 207
Sphenoceramus papulovi, 96
Tancredia amurensis, 77
ochurcovensis, 77
stubendorfii, 203
Teredo subgaultina, 208
Thracia pacifica, 208
Trigonia jakshy-saurensis, 155
mangyshlakensis, 155
Trigonioides hissariensis, 161
kodairaiformis, 162
Unica costatoplumata, 226
Unio bainzarchensis, 58
collensis, 57
elongatus, 57
hangenensis, 207
martynovae, 58
paletsensis, 207
transbaicalensis, 57
tsentahozensis, 207
Unionetta singularis, 234
Xenium tersum, 226
Yoldia subcuprussensis, 211
Yoldia (Yoldia) posneri, 243
Zyrjanoconcha ozoginensis, 210
sullakkanensis, 210
zyrjanica, 210

Класс Головоногие

Acanthoplites (Columbiceras) crassicostatus caucasica, 156
Acrochordiceras (Acrochordiceras) kiparisovae, 11
orientale, 11
(Epacrochordiceras) korobkovi, 11
(Paracrochordiceras) pacificum, 11
Anacleoniceras bicostatum, 167
caseyi, 166
Anahoplites (?) baisunensis, 157
rosievae, 194
(Daghestanites) burgensis, 131
daghestanensis, 131
Anasibirites raricostatus, 27
Arctoptychites popowi, 17
Aspinoceras kajgorodzevi, 130
Aulacosphinctes tripartitus, 84
Belemnococeras darcense, 28
Berriasella (?) borealis, 84
Bittnerites pacificus, 12
Bogoslovskia pseudostenomphala, 183
Bojarkia bodylevskii, 85
Calliphylloceras subdisputabile, 70

Caseyiceras caseyi, 183
Ceratites eichwaldi, 13
euomphalus, 13
hedenströmi, 13
middendorffii, 13
Chandomirovia ilekensis, 182
pechorkensis, 183
Cleoniceras kugitangense, 157
(Cleoniceras) planum, 165
tenuis, 165
Costamenjaites jucundus, 183
suraense, 183
Danubites tozeri, 17
Deshayesites antiquus, 110
luppovi, 110
oglanlensis, 110
tuarkyricus, 110
volgensis, 185
weissiformis, 110
Dichotomites (?) mangyschlakensis, 158
(?) toryschensis, 158
(Dichotomites) involutus, 205
Dieneroceras nikabitensis, 27
Dinarites (Dinarites) astachovae, 10
(Plococeras) subdalmatinus, 12
Douvilleiceras charshangense, 164
subleightonense, 164
Endemoceras balkhanicum, 159
Epihoplites trapezoidalis, 157
Eukashmirites karashekensis, 9
Gazdaganites spinosus, 166
Hemiprionites costatus, 27
Holcostephanus mirus, 69
obliquenodosus, 69
(?) proetus, 69
Homolsomites bojarkensis, 204
indistinctus, 204
Hoplites consanguineus, 69
incompositus, 69
incompositus var. discrepans, 69
janus, 69
obtusenodosus, 69
perornatus, 69
subchaperi, 69
Hypacanthoplites karlukensis, 157
Hypaturrilites intersignus, 97
primus, 97
tuberculatus laevidormis, 97
Hysteroceras levilatum, 194
Jabronella (?) karaciasensis, 160
Karangatites evolutus, 29
Kazakhstanites zakharovi, 12
Keyserlingites wichensis, 17
Lepthoplites sumbarensis, 194
Leptosphinctes ? pomosus, 70
Luppoviceras validum, 184
Lytoceras liebigi var. ponticum, 69
Meekoceras contrarius, 27
Mentjaites fidus, 183
imperceptus, 183
levis, 183
magnus, 183
Nathorstites strongulatus, 15
Nautilus sub-aratus, 13
Neopolyptychites arcticus, 86
asiaticus, 86
bassovi, 86
fissuratoides, 86
klimovae, 86
pachsensis, 86
Neotollia klimovskiana, 85
maimetschensis, 85
Nordophiceras (?) costatus, 17
Olcostephanus bjegitschevi, 78
diptichus ver. sibirica, 78
Ochetoceras elgense, 76
Parahoplites luppovi, 193
Parkinsonia quenstedti, 70
Pearylandites walbergensis, 17
Peregrinoceras bellum, 183
ramosum, 183
Perisphinctes andrussowi, 69
euxinus, 69
ponticus, 69
subrichteri, 69
Pervinqueria (Subpervinqueria) gissarensis, 166
luppovi, 166
Phylloceras mediterraneum var. tauricum, 69
Polyptychites kugusemicus, 158
(Polyptychites) plenus, 205
Proacrochordiceras kiparisovae, 18
negriense, 18
Proleopoldia stchirowskyi, 183
Pronjaites nikitoense, 183
Prorjasanites plumatus, 184
vnigni, 184
Prosphingites karagantiensis, 29
Protacanthodiscus transcaspius, 156
Protacanthoplites allanovi, 193
bogdanovae, 193
multinodosus, 193
submirus, 193
Pseudogarnieria securis, 183
Pseudotirolites menensis, 27
Psiloceras suberugatum, 64
viligensis, 64
Pteroceras (?) svalbardense, 16
Riasanites bogoslowskii, 160
decorus, 184
Simbirskites psedubarboti, 180
Sinzovia luppovi, 185
Spiroceras azariani, 70
Stchirowskiceras gloriosum, 183
posterius, 183
principale, 183
tumefactum, 183
(Suridiscus) mischukoviense, 184
subprincipale, 184

Stenopopanoceras primulum, 29
Subalpinites bajarunasi, 160
mangyschlakensis, 160
Subcraspedites (Subcraspedites) anglicus, 85
(Ronkinites) rossicus, 85
Subpolyptychites conspicuus, 184
distinctus, 183
orbicularis, 183
Surites linguiformis, 183
pechorensis, 182
pervulgatus, 183
poreckoensis, 182
rudicostatus, 184
spasskensis ruzhencevi, 184
(Surites) subanalogus, 85
Temnoptychites (Costamenjaites) mediatus, 205
(Temnoptychites) britvinensis, 201
jucundus, 201
subtilis, 201
Tirolites ussuriensis, 12
Tithonoceras zitteli, 69
Valanginites (?) mangyschlakensis, 158
Virgatoptychites (?) trifurcatus, 85
Virgatosphinctes bicostatus, 84
exoticus, 84
rudicostatus, 84
tenuicostatus, 84

Тип МШАНКИ

Beisselina bella, 195
Gryptostomella grandis, 200
sullucapiensis, 236
Dimorphocellaria voigti, 199
Distansescharella discreta, 200
Dysnoetocella foliacea, 200
Floridina atypica, 236
subgothica, 236
Gargantua dentata, 198
Hexaconthopora pediculata, 200
Ichnopora posterior, 200
Lunulites gigantea, 198
Membranipora subcalceolus, 198
«Membranipora» atabekjani, 200
caminoides, 200
evanescens, 200
margaritifera, 200
proboscinoides, 200
subpalpebra, 200
titowae, 200
Monoporella prisca, 198
Onychocella amudariensis, 197
insueta, 197
multa, 197
pitniakensis, 197
spinata, 195
tchingeldensis, 197
Pavolunulites incrustans, 200
Porina trabeculifera, 236
Pseudobathystomella lata, 199
Puncturiella cava, 236
Reptomultella subtriangularis, 200
Semifungella explicata, 196
Semiescharinella bifoliata, 198
plana, 236
Stichomicropora subquadrata, 198

Тип БРАХИОПОДЫ

Belbekella minor, 153
mutabilis, 153
Bolgarithyris boncevi, 175
inopinata, 175
inversa, 175
Cubanirhynchia bilavaensis, 66
Gusarella nana, 66
Juralina babugani, 54
carus, 54
graciosa, 54
nalivkini, 54
procerus, 54
Lingula tithonia, 69
Lobothyris crimica, 54
Monticlarella (?) costata, 66
korlukensis, 153
Negramithyris negramensis, 66
Neocirpa armenica, 66
nachitschevanica, 66
Neumayrithyris demicapuensis, 54
Oblongarcula (?) gaurdakense, 152
Parthirhynchia breviscula, 191
insarensis, 191
unguiseformis, 191
Postepithyris campestriensis, 54
subvalfinensis, 54
tipica, 54
Praecyclothyris berriasensis, 150
pennata, 150
Sellithyris bogdanovae, 151
plicata, 144
uniplicata mangyschlakensis, 151
Septaliphoria andrussovi, 154
kekilensis, 154
luppovi, 154
orbiculata, 154
ornata, 154
ovalis, 154
pentagonalis, 154
Taurothyris avundaensis, 54
Torquirhynchia portenosa, 150
Terebrataliopsis lammaburunica, 65
Tropeothyris oblongatus, 154
pseudofarcinata, 65
vialovi, 65
Zeillerina lorioli, 54
quenstedti, 54

roemeri, 54
taurica, 54
tithonica, 65

Тип ИГЛОКОЖИЕ

Класс Криноидеи

Phyllocrinus verrucosus, 69

Класс Эхиноидеи

Astrodaspis ilyinensis, 245
Epiaster luppovi, 148
Faassia globosa, 245
Kewia etolonica, 245
Mennerella ovata, 245
Pseudoholaster mangyschlakensis, 202
Toxaster bajarunasi, 181
balkhanensis, 149
turkmenicus, 149

Тип ХОРДОВЫЕ

Класс Хрящевые рыбы

«Chimaera» bogolubovi, 178
Gonodus kiprijanoffi, 178
Hybodus nodzhakulensis, 163
kansaiensis, 163
nukusensis, 163
Hypolophus ovalis, 229
Ischyodus gubkini, 178
Palaeobates verzilini, 61
Polyacrodus balabansaiensis, 61
prodigialis, 61
Rhinoptera maja, 235

Класс Костные рыбы

Acipenser shilini, 176
zhilgensis, 176
Cylindrocanthus iaruaris, 235
Ferganoceratodus jurassicus, 60

Класс Пресмыкающиеся

Aidachar paludalis, 173
Azhdarcho lanicollis, 177
Ekshmer bissektensis, 174
Kizylkumavis cretacea, 177
Oxemys gutta, 169
Planiplastron gureevi, 230
Sultanuvaisia antiqua, 173
Teguliscapha rossica, 178
Tienfucheloides undatus, 170
Toxocheloides narynensis, 60
Zhyraornis kashkarovi, 177

Класс Млекопитающие

Cretasorex arkhangelskyi, 172
Daulestes kulbekensis, 171
Oxlestes grandis, 175
Sailestes quadrans, 175
Taslestes inobservatis, 175
Vialovophis zhylan, 229

Примечание. В выпуске II «Каталога голотипов» (1985, ч. 2, с. 251) следует читать: «Тип хордовые», вместо «Тип позвоночные».

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 5

Часть I. Палеозой

Кембрий 9
Ордовик 28
Силур 87
Девон 127
Карбон 161
Пермь 186
Указатель авторов коллекций 216
Указатель голотипов новых видов по группам 218
Растительные остатки 218
Простейшие 219
Губки 221
Строматопораты 221
Кишечнополостные 225
Кольчатые черви 228
Членистоногие 228
Моллюски 233
Мшанки 235
Брахиоподы 237
Иглокожие 241
Гемихордовые 243
Хордовые 243
Проблематика 244
Конодонты 244

Часть II. Мезозой, Кайнозой

Триас 245
Юра 257
Мел 280
Палеоген 325
Неоген 337
Указатель авторов коллекций 340
Указатель голотипов новых видов по группам 342
Растительные остатки 342
Простейшие 343
Кольчатые черви 344
Членистоногие 344
Моллюски 345
Мшанки 350
Брахиоподы 350
Иглокожие 351
Хордовые 351

CONTENTS

Foreword 5

Part I. Paleozoic

Cambrian . . . 9
Ordovician . . . 28
Silurian . . . 87
Devonian . . . 127
Carboniferous . . . 161
Permian . . . 186
Index of the authors of collections . . . 216
Index of the holotypes of new species on the groups . . . 218
Plant remains . . . 218
Protozoans . . . 219
Sponges . . . 221
Stromatoporoides . . . 221
Coelenterates . . . 225
Annelides . . . 228
Arthropods . . . 228
Mollusks . . . 233
Bryozoans . . . 235
Brachiopods . . . 237
Echinoderms . . . 241
Hemichordates . . . 243
Chordates . . . 243
Problematics . . . 244
Konodonta . . . 244

Part II. Mezozoic, Cenozoic

Triassic . . . 245
Yurassic . . . 257
Cretaceous . . . 280
Paleogene . . . 325
Neogene . . . 337
Index of the authors of collections . . . 340
Index of the holotypes of new species on the groups . . . 342
Plant remains . . . 342
Protozoans . . . 343
Annelides . . . 344
Arthropods . . . 344
Mollusks . . . 345
Bryozoans . . . 350
Brachiopods . . . 350
Hemichordates . . . 351
Chordates . . . 351

Каталог голотипов видов фауны и флоры, хранящихся в ЦНИГР музее

Вып. 3

Сдано в набор 24.05.96. Под. к печати 30.09.96. Гарнитура таймс. Печать офсетная. Формат 60×90 1/16. Тираж 1000. Зак. 1149.

Санкт-Петербургская картографическая фабрика ВСЕГЕИ
199178, Санкт-Петербург, Средний пр., 72

Coates Lorilleux

При изготовлении книги использованы печатные краски
"Торжокского завода полиграфических красок"