ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР

СЕРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ

3

МАЙ - ИЮНЬ
1953

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Таким образом, мы видим, что В. П. Ренгартен в своей последней работе привел новые научные данные, полученные в результате сборов и обработки палеонтологических материалов не сотрудниками Академии наук СССР, где работает В. П. Ренгартен, и не им самим, без надлежащих на это указаний.

Эту новую схему расчленения альбских отложений Дагестана В. П. Ренгартен распространяет на весь Большой Кавказ и выдвигает ее как созданную им, а не заимствованную из работ сотрудников ВСЕГЕИ.

А. Е. Глазунова

ПО ПОВОДУ КРИТИЧЕСКОЙ ЗАМЕТКИ А. Е. ГЛАЗУНОВОЙ

В сборнике «Памяти академика А. Д. Архангельского» (Изд-во АН СССР, 1951) мной была опубликована статья «Палеонтологическое обоснование стратиграфии нижнего мела Большого Кавказа». Так как одно место в этой статье вызвало в известной мере справедливые нарекания (см. критическую заметку А. Е. Глазуновой), то я считаю своим долгом дать здесь соответствующие разъяснения.

Моя статья по стратиграфии нижнего мела Кавказа является изложением заключительной главы из более обстоятельной моей сводной работы на эту тему. В последней излагается история исследований и фактический материал по районам и опорным разрезам нижнемеловых отложений Кавказа со ссылками на всех исследователей. В опубликованной мной статье, ввиду сжатости ее изложения (30 стр.), сделаны ссылки только на некоторые важнейшие печатные работы. При рассмотрении схемы зонального расчленения альбских отложений мной допущена ошибка и по недосмотру не повторено, что в последние годы в Дагестане были проведены ВСЕГЕИ важные работы по стратиграфии меловых отложений под общим руководством В. Д. Голубятникова сотрудниками ВСЕГЕИ Т. А. Мордвилко, И. К. Никифоровой и И. Ф. Пустоваловым и что в палеонтологической обработке собранных материалов принимали участие А. Е. Глазунова и Н. П. Луппов. По сообщенным мне данным этих исследователей, в общую схему зонального расчленения отложений альбского яруса в моей статье, где перечислено 8 аммонитовых зон, установленных в разных районах Северного Кавказа, вошли две зоны, впервые отмеченные А. Е. Глазуновой по коллекциям, хорошо и послойно собранным названными исследователями Дагестана — зоны Anhoplites daghestanensis Glasun. и Hysteroceras orbignyi Spath. Кроме того, в дополнение к руководящим видам для разных зон, приведены еще некоторые определения А. Е. Глазуновой.

Здесь следует отметить, что в зональном расчленении альбских отложений Дагестана особенно детальная стратиграфическая схема альба Копет-дага, выработанная А. Е. Глазуновой и опубликованная в 1949 г., сыграла большую роль.

Я не останавливаюсь здесь на некоторых неуместных выражениях А. Е. Глазуновой, обвиняющей меня в стремлении приписать себе установление новой детальной стратиграфии нижнего мела Большого Кавказа, или по крайней мере некоторых зон. В действительности, моя статья является обобщением всех материалов, собранных к 1949 г. всеми исследователями Кавказа.

В. П. Ренгартен