ЕЖЕГОДНИК
ВСЕСОЮЗНОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

ТОМ XVII

1957—1964

с 32 таблицами

Редактор тома
Е. А. Модзалевская

Издательство «Н Е Д Р А»
Ленинградское отделение
Ленинград · 1965

Е. А. Троицкая

О НАХОДКЕ РАКОВИНЫ НАУТИЛУСА В НИЖНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА

В коллекции А. А. Корженевского, доцента кафедры общей геологии Саратовского госуниверситета, собранной в 1956 г. в районе р. Гижгит (бассейн р. Баксан), находится раковина аммонита (по определению оказавшаяся *Cenoceras* (*Nautilus*) *semistriatus* (O r b.). Раковины этого вида характерны для верхней зоны среднего тоара — зоны *Hildoceras bifrons*. Совместно с раковинами двустворчаток *Pleuromya unioides* R o e m. и *P.* aff. *goldfussi* R o l l. найден он в железорудном слое. Эти двустворчатки типичны для тоарского времени Северного Кавказа и ааленского — Швейцарии.

Находка раковины наутилуса в районе Центрального Кавказа весьма интересна. Как известно, остатков представителей семейства Nautiloidea из нижнеюрских отложений до настоящего времени в Советском Союзе не встречалось. Причиной этого обстоятельства, повидимому, являлось расселение наутилид в указанную эпоху только в морях среднеевропейской провинции.

СЕМЕЙСТВО NAUTILIDAE O W E N EMEND. S P A T H

Род *CENOCERAS* H y a t t

Cenoceras semistriatus (O r b.)

Рис. 1

1840. *Nautilus semistriatus* O r b i g n y. Pal. Francaise. Terr. jur. т. I, стр. 1 5.

Раковина крупная, по[illegible]ечное сечение о[illegible]ое овальное. Вентральная сторона слегк[illegible]уплощ[illegible]ая, плавн[illegible]одящая в боковые стороны. Бока сла[illegible]о выпуклые. У[illegible]бонн[illegible]перегиб нерезкий. Пупок узкий, глубо[illegible]ий, почти п[illegible]тый. Пупковая стенка крутая. Положение сифона це[illegible]ое. Скульптура раковины представлена довольно тонкими [illegible]ногочисленными продольными ребрами. Перегородочная линия с[illegible]бо изогнутая, но с ясно различимыми боковым и наружным седла[illegible]и лопастью в центральной зоне.



Рис. 1 *Celoceras* (*Nautilus*) *aistriatus* (Orb.).

Сравнение. От изображения наутилуса *C. semistriatus* данного Орбиньи, рассматриваемый экземпляр отличается ясно выраженным умбональным перегибом и формой сечения оборота несколько сильнее вдавленного в верхней части.

Измерения*, *мм*.

D_1	100
D_2	122
h	70
h_1	57
w	70
Инволютность раковины	0,8
Показатель ширины	1,0

Местонахождение и возраст. Р. Гижгит, железорудный слой. Поздний лейас.

---

* Измерения сделаны по правилам измерения наутилид, принятым в работе В. Н. Шиманского «Современный наутилус и его значение для изучения ископаемых головоногих». Уч. зап. МГПИ, каф. геологии, т. LII, в. 3, 1948.